

2017 年全国卫生专业技术资格考试护理学(中级)
考前压轴密卷

妇科护理学参考答案

金英杰国家医学考试研究中心 编



 北京金英杰图书有限公司

模拟试卷(一)

基础知识

1.答案:B

2.答案:B

3.答案:C

4.答案:E

5.答案:B

6.答案:C

7.答案:E

8.答案:D

9.答案:C

10.答案:A

11.答案:C

12.答案:A

13.答案:E

14.答案:E

15.答案:B

16.答案:C

17.答案:B

18.答案:B

19.答案:C

20.答案:E

21.答案:E

解析:破伤风属于特异性感染。

22.答案:D

解析:在新生儿卵巢内约有 200 万个卵泡,但在女性一生中仅有 400~500 个卵泡发育成熟。

23.答案:C

解析:复苏后最容易出现脑水肿。

24.答案:B

解析:胸腔穿刺有气体说明有气胸,有血液说明有损伤引起的出血。

25.答案:B

26.答案:B

27.答案:B

解析:梗阻以后消化道分泌液体不能被吸收,积存在肠道。

28.答案:B

解析:凡是肝功能受损的疾病,其他 4 项检验项目均可升高,只有甲胎蛋白对肝癌具有较强的特异性。

29.答案:C

解析:部分卵巢恶性肿瘤如上皮性卵巢癌、无性细胞瘤、含睾丸细胞瘤中的 1/4 病人有家族史;约 20% 的卵巢癌病人有家族史,其中主要是上皮性卵巢癌。

30.答案:D

解析:浆液性囊腺瘤约占卵巢良性肿瘤的 25%。

31.答案:D

32.答案:B

解析:动脉狭窄属心脏后负荷增高,当心脏后负荷增高时,常以心肌肥厚作为主要的代偿机制。

33.答案:D

解析:高血压可引起心脏后负荷增加,即外周血管阻力增加。

34.答案:C

解析:急性胃炎是急性胃黏膜的炎症,包括急性单纯性胃炎、糜烂性胃炎、腐蚀性胃炎,以急性单纯型胃炎最为多见。

35.答案:D

解析:病毒、细菌和支原体感染是慢性支气管炎发生及加重的重要因素之一。

36.答案:C

37.答案:B

解析:上呼吸道感染的病原体90%以上是病毒。

38.答案:E

解析:慢性胃体胃炎病人血清促胃液素水平常明显升高,可有抗壁细胞抗体和抗内因子抗体。

39.答案:D

解析:劳累、情绪激动、饱食、受寒、急性循环衰竭是心绞痛发生的诱因。

40.答案:B

解析:子痫前期轻度诊断标准:血压 $>140/90$ mmHg (18.7/12 kPa),尿蛋白 >0.3 g/24 h或随机尿蛋白(+);伴上腹不适、轻度水肿、头痛、视力模糊等。

41.答案:D

解析:主要考查先天性巨结肠的发病机制,备选答案是对发病机制的描述,根据我们已掌握的知识,先天性巨结肠可能是在胚胎发育过程中,受到病毒、感染、药物、遗传等因素的作用,使形成肠壁神经丛的神经节细胞发育停滞,致局部肠壁间神经丛和黏膜下神经丛缺乏神经节细胞。

42.答案:D

43.答案:A

44.答案:B

解析:黄体功能不足为排卵性功血,月经周期中有卵泡发育及排卵,但黄体期孕激素分泌不足或黄体过早衰退。因此,表现为基础体温呈双相型,但上升缓慢,高温相短。

45.答案:B

46.答案:A

47.答案:A

48.答案:A

49.答案:C

50.答案:E

51.答案:C

52.答案:D

53.答案:D

54.答案:E

55.答案:C

56.答案:C

57.答案:B

58.答案:A

59.答案:E

60.答案:C

61.答案:B

62.答案:D

63.答案:D

64.答案:B

65.答案:A

66.答案:C

67.答案:A

68.答案:C

69.答案:C

70.答案:B

71.答案:C

72.答案:B

73.答案:E

74.答案:C

75.答案:D

76.答案:B

77.答案:E

78.答案:C

79.答案:C

80.答案:A

81.答案:B

82.答案:A

解析:腹膜刺激征(压痛、肌紧张、反跳痛)是腹膜炎的标志性体征。

83.答案:C

84.答案:C

85.答案:B

86.答案:E

87.答案:B

88.答案:A

89.答案:C

90.答案:D

解析:游离移植:移植物从供体取下时,完全断绝与供体的各种联系,移植至受体后重新建立血液循环,如游离皮片移植。带蒂移植:是自体移植的一种方法,移植物从供体取下后,并没有完全脱离,尚有一部分相连,主要包括血管和神经,使移植物的存活率提高。等移植物在受体上完全建立血液循环时,再将蒂切断。如带蒂皮瓣、带蒂肌瓣、带蒂大网膜移植等。吻合移植:利用血管吻合技术,将移植物中的血管与受体的血管吻合,使移植器官即刻得到血液供应,如断肢再植、肾移植和肝移植等。输注移植:将具有活力的细胞输注到受体的血管、体腔或组织器官内的方法,如输血、骨髓移植、干细胞移植、胰岛移植等。

91.答案:C

92.答案:D

93.答案:B

94.答案:A

95.答案:E

96.答案:E

97.答案:C

98.答案:B

99.答案:D

100.答案:C

解析:子宫借助于4对韧带以及骨盆底肌肉和筋膜的支托作用来维持正常的位置。圆韧带具有维持子宫前倾位的作用;阔韧带使子宫在腔的正中位置;主韧带又称宫颈横韧带,是固定宫颈正常位置的重要组织;宫骶韧带间接保持子宫于前倾位置。

相关专业知识

1.答案:C

2.答案:E

解析:在医院中严重的是移位菌群失调,即正常菌群由原籍生境转移到外籍生境或本来无菌的部位定植或定居,如大肠中的大肠埃希菌、铜绿假单胞菌转移到呼吸道或泌尿道定居。其原因多为不适当地使用抗生素,即该部位的正常菌群被抗生素抑制或消灭,从而为外来菌或过路菌提供了生存的空间和定植的条件。

3.答案:D

4.答案:C

解析:快速压力蒸汽灭菌物品在干燥的情况下可保存7~14天。如果潮湿则认为被污染,应重新灭菌。

5.答案:E

6.答案:C

解析:设置隔离室最主要的目的是切断感染链中的传播途径,保护易感者。将感染源与传播的途径分开是防止感染性疾病传

播的重要措施。

7.答案:A

8.答案:A

解析:高度危险性物品是穿过皮肤或黏膜而进入无菌的组织或器官内部的器材,或与破损的组织、皮肤黏膜密切接触的器材和用品,如手术器械和用品、穿刺针、输血器材、输液器材、注射的药物和液体、透析器、血液和血液制品、导尿管、膀胱镜、腹腔镜、脏器移植物和活体组织检查钳等。

9.答案:A

10.答案:A

解析:管理与政策诊断的核心内容是组织评估和资源评估。

11.答案:C

12.答案:A

解析:对不耐热、不耐湿物品进行消毒时可选用环氧乙烷气体灭菌。

13.答案:E

14.答案:E

解析:终末质量评价是评价护理活动的最终效果,指每个病人最后的护理结果或成批病人的护理结果质量评价。

15.答案:C

16.答案:A

解析:为防止使用后的污染利器(针、刀、其他利器)刺伤,小心处理用过的尖锐物品(针及手术刀等),如使用后针头不覆帽且不复用,不用手去除针头,若要人为去除针头时,应使用其他技术和可用器械设备除去针头。用后的针头及尖锐物品应弃于耐刺硬壳防水容器内。

17.答案:C

18.答案:C

解析:连续使用的氧气湿化瓶、雾化器、早产儿暖箱应每日消毒,用后终末消毒,干燥保存。湿化液应用灭菌水。

19.答案:E

20.答案:C

解析:各种微生物(细菌)经常从不同环境落到人体,并能在一定部位定居和不断生长、繁殖后代,送种现象通常称为“细菌定植”。

21.答案:E

22.答案:A

解析:科学管理理论的基本出发点是提高劳动生产效率,其主要内容是:①使工作方法、劳动工具、工作环境标准化;②确定合理的工作量;③挑选和培训工人,使其掌握标准工作方法;④实行差别工资制;⑤实行职能工长制。

23.答案:C

24.答案:A

解析:用过的医疗器材和物品,应先除污物、清洗,再消毒或灭菌;其中感染病人用过的医疗器械和物品,应先消毒、清洗,再消毒或灭菌。

25.答案:A

26.答案:D

解析:危害健康行为的类型:①日常危害健康行为;②致病性行为模式;③不良疾病行为;④违规行为。

27.答案:D

28.答案:C

解析:高水平消毒剂是过氧化氢;中水平消毒剂是聚维酮碘、乙醇;低水平消毒剂是苯扎溴铵、氯己定。

29.答案:D

30.答案:D

解析:近年来,真菌引起的院内感染呈现进一步增长的趋势,常见的真菌感染是白色念珠菌、热带念珠菌和曲霉菌。念珠菌感染多发生在长期应用广谱抗生素或免疫力低下病人身上,常导致深部感染。

31.答案:A

32.答案:C

解析:环节质量评价常用的评价指标:①护理技术操作合格率;②基础护理合格率;③特护、一级护理合格率;④各种护理表格书写合格率;⑤一人一针一管执行率;⑥常规器械消毒灭菌合格率。

33.答案:D

34.答案:D

解析:经粪-口途径传播的肝炎病毒为甲型肝炎病毒、戊型肝炎病毒。乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、丁型肝炎病毒均主要经血液传播(输血、使用血制品、静脉吸毒、通过诊疗器械等),亦可经日常生活中的密切接触传播。

35.答案:D

36.答案:A

解析:术前预防性应用抗生素的指征:①污染手术,如复杂外伤、战伤、开放性骨关节伤、严重烧伤、伴溃疡坏疽的截肢术、感染性病灶(如脑脓肿)等手术和各种咬伤等;连通口咽部的颈部手术;回肠远端及结肠手术;腹部空腔脏器破裂或穿通伤;高危胆道手术;经阴道子宫切除术。②发生感染将引

起严重后果者,如心脏瓣膜病或已置入人造心脏瓣膜者因病需行其他手术者、脑脊液鼻漏者以及器官移植术等。③各种人造物修补、置换或留置手术,如人工心脏瓣膜置换手术、人造关节置换术、人造血管移植术、脑室心房分流管放置术等。④手术范围大、时间长的清洁手术。

37.答案:D

解析:一级医院的医护比为1:1,二级和三级医院的医护比为1:2。

38.答案:B

解析:科学管理理论的创始人是泰勒,他首次提出了科学管理的概念,1911年出版《科学管理原理》一书,被公认为“科学管理之父”。

39.答案:B

解析:医用物品对人体的危险性是指物品污染后造成危害的程度,根据其危害程度将其分为3类。

40.答案:B

解析:主动发展阶段在3~12岁,此阶段的行为有明显的主动性,其主要表现为爱探究、易激惹、喜欢自我表现等。

41.答案:E

42.答案:D

解析:随着计算机技术的日益成熟和广为应用,有关组织结构管理幅度与管理层级的理论也发生着革命性的变化,最突出的体现就是组织中的中层功能正逐渐由计算机来处理完成,使得管理幅度变宽和管理层级变少,组织也日益由高耸型走向扁平化。组织扁平化是未来管理向领导者、从事人力资源管理工作者提出的挑战。

43.答案:C

解析:从组织图可以了解纵向的各部门或各职位之间的指导、指挥、管辖等关系;也可以了解横向的各部门或各职位的分工和任务,人、财、物的流向;还可以了解组织的规模、集中与分散状况及管理的功能与

范围。

44.答案:D

45.答案:B

解析:“条条大路通罗马”是指达成目标有多种途径。面对不同的沟通对象,面对不同的情形,应该采取不同的沟通方式以达到事半功倍的效果。因此,其对应的是“使用恰当的沟通方式”的策略。

46.答案:D

解析:协调的基本要求包括及时协调与连续协调相结合、从根本上解决问题、调动当事者的积极性、公平合理和相互尊重。

47.答案:E

48.答案:C

49.答案:B

50.答案:A

解析:健康教育的研究领域非常广泛,主要分为两大类。按目标人群或场所分为学校健康教育、职业人群健康教育、医院健康教育、社区健康教育。按教育目的或内容分为防治疾病健康教育、营养健康教育、环境保护健康教育、生殖健康教育等。

51.答案:E

52.答案:C

53.答案:D

54.答案:B

55.答案:E

56.答案:D

57.答案:C

解析:紫外线灯照射强度监测应每半年一次。

58.答案:C

解析:可能接触患者的血液、体液、分泌物、排泄物、污染的器械后应立即洗手。脱去手套后也应及时洗手。在两个患者之间,当手可能传播微生物污染环境时;同一患者,接触身体的不同部位时应洗手。

59.答案:C

60.答案:C

解析:乙型肝炎主要传播途径为血液传播,血液中 HBV 含量很高,共用牙刷和剃刀可使微量污染血液进入人体造成感染。

61.答案:D

62.答案:B

解析:护理仪器设备的维护是针对组织内部具体工作问题,在较小范围内和较短时间内实施的计划,是战术性计划。

63.答案:A

解析:目标管理的基本精神是以自我管理为中心。目标的实施,由目标责任者自我进行,通过自身监督与衡量,不断修正自己的行为,以达到目标的实现。

64.答案:D

解析:沟通障碍中接受者的障碍包括:过度加工,导致信息的模糊或失真;知觉偏差,导致对信息理解的偏差(心理障碍,导致信息的阻隔或中断;思想观念上的差异,导致对信息的误解)。

65.答案:A

解析:有效沟通的策略包括:使用恰当的沟通方式;考虑接受接受者的观点和立场;充分利用反馈机制;以行动强化语言;避免一味说教。

66.答案:C

解析:谈话的技巧包括:做好谈话计划;善于激发下级的谈话愿望;善于启发下属讲真情实话;掌握发问技巧,善于抓住重要问题;善于运用倾听的技巧。

67.答案:A

解析:所谓作业,是指从劳动力、原材料等物质资源到最终产品和服务等转化过程,护理工作中常用的作业控制有:护理技术控制、护理质量控制、医疗护理所用材料及药品购买控制、库存控制等。

68.答案:E

解析:护理管理控制的关键点有:关键制度、高危护士、高危患者、高危设备和药品、高危科室、高危时间和高危环节。

69.答案:D

70.答案:E

71.答案:B

解析:健康促进的领域包括制定促进健康的公共政策、创造支持环境、发展个人技能、加强社区行动和调整卫生服务方向。

72.答案:E

73.答案:D

74.答案:E

75.答案:C

76.答案:A

77.答案:D

78.答案:B

79.答案:B

80.答案:D

81.答案:A

82.答案:A

83.答案:B

解析:当医务人员接触血液、体液、排泄物、分泌物及污染物品时,应戴清洁手套;进行手术等无菌操作,接触患者皮肤黏膜时应戴手套。

84.答案:B

85.答案:D

86.答案:E

87.答案:C

88.答案:B

89.答案:A

90.答案:A

91.答案:D

92.答案:A

93.答案:C

94.答案:E

95.答案:A

96.答案:C

97.答案:B

98.答案:C

99.答案:D

100.答案:E

解析:手术器械包、硬式容器应平放;盆、盘、碗类物品应斜放,包内容器开口朝向一致;玻璃瓶等底部无孔的器皿类物品应倒

立或侧放;纸袋、纸塑包装应侧放;利于蒸汽进入和冷空气排出。

专业知识

1.答案:E

2.答案:B

3.答案:E

4.答案:E

解析:在新生儿出生后最初几天,由于受母体激素的影响可使新生儿乳房肿大并分泌出类似乳汁的物质,女婴有时会有假月经及阴唇肥大现象。出生后4~5天,因尿液、粪便的排出,摄入量少,体重会下降5%~10%,称生理性体重下降。大部分新生儿会出现生理性黄疸,5天后血清中胆红素快速下降。

5.答案:B

解析:胎心率是了解胎儿是否正常的重要标志,胎心率的改变是急性胎儿窘迫最明显的临床表现。

6.答案:E

7.答案:B

8.答案:B

9.答案:C

解析:胎膜早破可引起的并发症包括早产、感染、脐带脱垂。脐带脱垂有可能出现胎儿宫内窘迫。

10.答案:D

解析:胎盘因素导致的大出血,若疑胎盘植入者,应及时作好子宫切除的准备。

11.答案:B

解析:产褥感染是分娩时及产褥期生殖道受病原体感染,引起局部和全身的炎性变化,包括:急性外阴、阴道、宫颈炎;急性子宫内膜炎、子宫肌炎;急性盆腔结缔组织炎、急性输卵管炎;急性盆腔腹膜炎及弥漫性腹膜炎;血栓性静脉炎;脓毒血症及败血症。

12.答案:C

解析:抗生素不做常规使用。

13.答案:D

解析:X连锁显性遗传病,母亲为患者,父亲正常,子代中子女患病风险各为1/2。

14.答案:E

解析:月经初潮是青春期开始的重要标志,由于青春期中枢系统的调节机制尚不健全,因此月经周期多不规律,经过2~4年建立周期性排卵后月经逐渐正常。

15.答案:B

16.答案:E

解析:髂棘间径:测量两髂前上棘外缘的距离,正常值为23~26cm,髂嵴间径:测量两髂嵴外缘最宽的距离,正常值为25~28cm。骶耻外径:孕妇取左侧卧位,右腿伸直,左腿屈曲,测第5腰椎棘突下(相当于米氏菱形窝上角)至耻骨联合上缘中点的距离,正常值为18~20cm。坐骨结节间径:孕妇取仰卧位,两腿弯曲,双手紧抱双膝,使髋关节和膝关节屈曲,测量两坐骨结节内侧缘间的距离,正常值为8.5~9.5cm。出口后矢状径:坐骨结节间径中点至骶骨尖端的距离,正常值为8~9cm。

17.答案:C

18.答案:A

19.答案:E

解析:双胎妊娠分娩时,第一胎儿娩出后,应立即断脐,助手扶正第二胎儿胎位,保持纵产式,等待15~20分钟后,第二胎儿自然娩出。如等待15分钟仍无宫缩,则可人工破膜或静脉滴注缩宫素促进宫缩。第二胎儿娩出后应立即肌注或静脉滴注缩宫素,腹部放置沙袋,预防产后出血。

20. 答案:A

解析:胎盘早剥的临床表现是孕晚期突发的腹部持续性疼痛,伴或不伴阴道流血,而且胎盘早剥的病因之一就是血管病变,孕妇患妊娠期高血压疾病时,胎盘早剥发生率增高。而其他几种疾病与血管病变关系不大。

21. 答案:E

解析:铁通过胎盘从母亲运至胎儿是单向运输,不能逆向转运。孕妇骨髓和胎儿在竞争摄取母体血清铁的过程中,一般以胎儿组织占优势,故一般情况下胎儿缺铁程度不会太严重。

22. 答案:C

23. 答案:B

24. 答案:D

解析:先兆子宫破裂的主要表现是病理性缩复环形成、下腹部压痛、胎心率改变和血尿出现。

25. 答案:A

解析:一旦出现羊水栓塞应立即给予紧急处理,包括:①最初阶段先是纠正缺氧;解除肺动脉高压;防止心衰;抗过敏;抗休克。②阶段应早期抗凝,补充凝血因子,应用肝素;晚期抗纤溶同时也补充凝血因子,防止大出血。③少尿或无尿阶段要及时应用利尿剂,预防与治疗肾衰竭。在第一产程发作者,应立即考虑行剖宫产结束分娩以去除病因。

26. 答案:D

27. 答案:E

28. 答案:D

解析:心排出量的增加是妊娠期循环系统最重要的改变。心排出量自妊娠 8~10 周逐渐增加,妊娠 32~34 周达高峰,心脏每搏输出量平均约为 80 mL,故妊娠 32~34 周心脏负荷较重,易发生心力衰竭。

29. 答案:D

30. 答案:B

解析:胎头两顶骨间为矢状缝,顶骨与额骨间为冠状缝,枕骨与顶骨间为人字缝,两额骨间为额缝。胎头前部呈菱形的称为前凶,胎头后部呈三角形的称为后凶。肛查或阴道检查时可触及矢状缝和前后凶门,根据检查结果,再结合胎方位的概念,可确诊胎方位。

31. 答案:A

32. 答案:C

33. 答案:E

34. 答案:A

解析:双胎妊娠分娩时,第一胎儿娩出后,应立即断脐,助手扶正第二胎儿胎位,保持纵产式,等待 15~20 分钟后,第二胎儿自然娩出,如等待 15 分钟仍无宫缩,则可人工破膜或静脉滴注缩宫素促进宫缩。第二个胎儿娩出后应立即肌注或静脉滴注缩宫素,腹部放置沙袋,预防产后出血。

35. 答案:D

36. 答案:B

37. 答案:D

解析:为预防分娩前 1 周肌内注射维生素 K。

38. 答案:C

39. 答案:D

40. 答案:D

解析:排卵多发生于下次月经来潮前 14 天左右,卵子可由两侧卵巢轮流排出,也可由一侧卵巢连续排出。

41. 答案:B

解析:妊娠后期因子宫增大膈肌升高,心脏向左、向上、向前移位,更贴近胸壁,心尖搏动向左移约 1 cm;孕妇血容量自妊娠 6~8 周开始增加,妊娠 32~34 周达高峰,约增加 45%,平均约 1 500 mL;因下肢、外阴及直肠静脉压的升高,加之静脉壁扩张,孕妇易发生下肢、外阴静脉曲张和痔;妊娠期血液处于高凝状态,凝血因子增加;因血液稀释,血浆蛋白减少,主要是白蛋白,可减少为

约 35 g/L。

42.答案:E

解析:本例诊断为羊水过少,无明显胎儿畸形,孕妇处于孕中期,应该增加羊水量,期待治疗,延长孕周。

43.答案:A

44.答案:B

解析:前庭大腺炎症急性发作时,需卧床休息,保持局部清洁,并给予抗生素治疗;脓肿形成后,可行切开引流和造口术;前庭大腺囊肿则考虑囊肿造口术。

45.答案:D

解析:继发性痛经,进行性加重,子宫直肠陷凹散在多个痛性结节,上述症状、体征为子宫内膜异位症的常见临床表现。

46.答案:D

47.答案:C

解析:患者停经 8 周,若考虑怀孕,则处于孕早期,常见的临床表现有停经、早孕反应、尿频、乳房轻度胀痛、乳头刺痛、子宫增大变软等。

48.答案:D

49.答案:C

50.答案:A

解析:前置胎盘的典型症状是孕晚期的无诱因、无痛性反复阴道流血。其中,完全性前置胎盘初次出血时间早,多在 28 周左右,称为“警戒性出血”,量较多。边缘性前置胎盘初次出血时间晚,量较少。部分性前置胎盘介于两者之间。

51.答案:A

解析:子宫内膜炎:轻者表现为恶露量多,浑浊有臭味,下腹痛,宫底压痛、质软伴低热;重者表现为高热、头疼、寒战、白细胞增多,下腹压痛,恶露量多有臭味。

52.答案:A

解析:判断患者属于青春期无排卵性功血,轻度贫血,宜使用大量雌激素,促进内膜创面血管凝血和刺激内膜再生修复,而达到

止血的作用。

53.答案:A

54.答案:C

55.答案:B

56.答案:A

57.答案:E

58.答案:A

解析:育龄期女性短暫停经后阴道流血,尿 hCG(+),腹部有移动性浊音,有失血体征,推测患者可能为异位妊娠破裂大出血,血液集中在子宫直肠陷凹。通过阴道后穹隆穿刺进入子宫直肠陷凹,若抽出暗红色不凝血,结合症状体征,即可明确诊断。

59.答案:C

60.答案:E

61.答案:A

62.答案:C

63.答案:D

64.答案:E

解析:心功能 II 级患者产后可母乳喂养。

65.答案:D

解析:妊娠合并心脏病患者产后 3 天内,尤其 24 小时内,仍是心力衰竭发生的危险期,产妇应充分休息且需严密监护,严格控制静脉输液量和速度,防止心衰发生。

66.答案:E

解析:患者有妊娠史,无痛经史,说明无盆腔结核和子宫内膜异位症;另外患者无急性腹痛,无异位妊娠表现。人工流产后反复下腹疼痛一年多,排除急性盆腔炎,应该是在人流术后继发感染,转为慢性盆腔炎。

67.答案:D

解析:手术对慢性盆腔炎治疗无特殊疗效,主要为支持治疗,即综合疗法。

68.答案:B

解析:慢性盆腔炎可致继发不孕和输卵管妊娠;慢性盆腔炎可以反复急性发作,并形成输卵管卵巢炎性包块。子宫腺肌病与

慢性盆腔炎无关。

69.答案:D

解析:妊娠满 28 周后至 37 周前出现有明显的规律宫缩伴宫颈管缩短,可诊断为先兆早产。

70.答案:E

解析:此患者孕 33 周,胎膜未破,可通过休息和药物治疗控制宫缩,尽量维持妊娠至足月。

71.答案:C

解析:早产不可避免,应尽早决定合理分娩方式。如臀位、横位,估计胎儿成熟度低,产程较长者可选剖宫产。经阴道分娩者,应考虑使用产钳和会阴切开术尽可能缩短产程。临产后停用抑制宫缩药物。新生儿出生后,立即结扎脐带,防止过多母血进入胎儿体内。

72.答案:A

73.答案:B

74.答案:D

75.答案:E

解析:患者葡萄胎刮宫术后 3 个月(葡萄胎史),阴道流血 20 余日,阴道左侧壁 1.5 cm 紫蓝色结节,双侧附件有 6~8 cm 直径囊性包块,可诊断为侵蚀性葡萄胎患者突然下腹剧痛、出冷汗、昏倒,腹部移动性浊音(+),子宫大小不清,下腹部胀痛及反跳痛,怀疑子宫穿孔。

76.答案:B

解析:化疗应是在抢救生命后进行的规范治疗。

77.答案:E

解析:按照患者的临床表现可诊断为葡萄胎,葡萄胎患者滋养细胞异常增生,产生大量绒毛膜促性腺激素,由于大量 hCG 的刺激,双侧或一侧卵巢往往呈多发性囊肿改变,为卵巢黄素化囊肿。

78.答案:A

解析:卵巢黄素化囊肿一般情况下不需

要处理,在葡萄胎清除后,随着 hCG 水平下降,于 2~4 个月内自然消失。

79.答案:B

解析:宫颈菜花样物,有接触性出血,可能是宫颈癌患者,但需要确诊。

80.答案:B

解析:宫颈活组织检查是确诊宫颈癌的依据。

81.答案:D

解析:卵巢畸胎瘤早期无症状但可恶变,一经诊断须进行手术。

82.答案:C

83.答案:D

解析:卵巢恶性生殖细胞肿瘤,患者仍未生育,年龄较轻,一般宜行保留生育功能的手术,切除患侧附件。卵巢生殖细胞肿瘤对化疗敏感,术后可采取化疗。

84.答案:A

85.答案:B

86.答案:E

87.答案:E

88.答案:B

89.答案:A

解析:滋养细胞肿瘤的治疗原则是:以化疗为主,手术为辅,但手术在控制出血、感染等并发症及切除残存病灶或耐药方面仍起重要作用。病变在子宫或肺、化疗疗程较多但效果差者,可考虑手术治疗。肺转移可行肺叶切除术,病变在子宫者可行次广泛子宫切除及卵巢动、静脉高位结扎术。

90.答案:A

91.答案:B

92.答案:C

93.答案:E

94.答案:C

95.答案:A

96.答案:C

97.答案:A

98.答案:B

99. 答案:A

100. 答案:D

解析:子宫下段前壁外突肌瘤可压迫膀

胱,引起泌尿道症状,如尿频、尿急、排尿困难等。浆膜下肌瘤易发生扭转。

专业实践能力

1. 答案:E

2. 答案:C

3. 答案:B

4. 答案:C

解析:早期减速是与子宫收缩几乎同时开始发生,子宫收缩后即恢复正常,正常减速幅度 <50 次/分,这是宫缩时胎头受压,脑血流量一时性减少的表现,不受体位或吸氧而改变。

5. 答案:C

6. 答案:C

解析:胎儿娩出后,为预防腹压骤降使回心血量急剧波动而诱发心力衰竭,应立即在产妇腹部放置沙袋,持续24小时。

7. 答案:D

8. 答案:B

9. 答案:E

10. 答案:B

解析:产后泌尿系统感染,多出现在产后2~3天,引起感染的绝大多数病原体为革兰氏阴性杆菌,感染途径以上行感染为主,膀胱炎表现为尿频、尿急、尿痛,排尿时有烧灼感或排尿困难;肾盂肾炎表现为腰部疼痛,寒战高热、恶心呕吐等,同时伴有膀胱刺激症状。给予敏感抗生素治疗,直至尿培养阴性。鼓励产妇多饮水,每日饮水量在3 000~4 000 mL,以达到冲洗膀胱的目的。

11. 答案:B

12. 答案:A

解析:梅毒是一种侵犯全身多系统的慢性性传播疾病,病原体是苍白密螺旋体,在体外干燥条件下不宜生存,一般消毒剂及肥

皂水均可杀灭。主要为性传播,少数通过污染的衣物间接传播,孕妇可通过胎盘传给胎儿,若孕妇软产道有梅毒病灶,也可发生产道感染。

13. 答案:E

解析:侵蚀性葡萄胎的病理表现为增生的滋养细胞有明显的出血及坏死,但仍可见变性的或完好的绒毛结构。绒毛膜癌显微镜下检查典型的病变为滋养细胞极度不规则增生,增生与分化不良的滋养细胞,排列成片状,侵入子宫内膜和肌层,并伴有大量出血和坏死,绒毛结构消失。

14. 答案:D

15. 答案:D

解析:妊娠早期,由于增大的子宫压迫膀胱,引起尿频。

16. 答案:A

解析:维生素A有助于胎儿正常生长发育,预防孕妇阴道上皮细胞角化,能预防孕妇皮肤过分干燥和乳头皲裂;维生素C能促进造血系统的健全,对胎儿机体抵抗力有促进作用;维生素D对胎儿骨、牙齿的正常发育有促进作用。

17. 答案:A

解析:缩复作用是指每次宫缩时,子宫肌纤维缩短变宽,宫缩后肌纤维虽又重新松弛,但不能完全恢复到原来长度,经过反复收缩,肌纤维越来越短的现象。

18. 答案:C

19. 答案:E

20. 答案:D

21. 答案:A

22. 答案:D

23.答案:C

24.答案:B

解析:产褥感染患者宜采取半卧位或抬高床头,以促进恶露引流,局限炎症,防止感染扩散;严格执行消毒隔离措施;39℃以上者予以物理降温;高热患者暂停母乳喂养。

25.答案:E

解析:产后7~10天宫颈口闭合方可坐浴,但血性恶露量多者应禁止坐浴。

26.答案:C

解析:为防治外阴炎,应保持外阴清洁、干燥,尤其在经期、孕期、产褥期要每天清洗外阴,需注意清洗时勿使用刺激性肥皂;着棉织内衣裤,每天更换内裤;不要搔抓局部皮肤,避免破溃或合并细菌感染;需注意积极治疗原发病。

27.答案:C

解析:梅毒最主要的传播途径是通过性交经黏膜擦伤处传播,以皮肤黏膜损害为主,晚期侵犯心血管和神经系统。患早期梅毒的孕妇可通过胎盘传给胎儿,若孕妇软产道有梅毒病灶,也可发生产道感染。此外还有间接传播如接吻、哺乳、输血、衣裤、被褥、浴具等,但机会极少。

28.答案:E

29.答案:C

30.答案:C

31.答案:D

32.答案:C

33.答案:C

34.答案:A

35.答案:B

解析:缩短第二产程,减少产妇体力消耗。

36.答案:B

37.答案:D

38.答案:E

39.答案:B

解析:假丝酵母菌不耐热,加热至60℃持续1小时即死亡;碱性环境不利于其生

长,2%碳酸氢钠坐浴后阴道用药效果更好;外阴阴道假丝酵母菌病不是剖宫产的指征,因此孕妇患有此病要积极治疗,否则阴道分娩时新生儿易被传染患鹅口疮。外阴阴道假丝酵母菌病常在月经前复发,治疗后应在月经前复查阴道分泌物。对有症状的性伴侣应同时进行治疗,无症状者无需治疗。

40.答案:B

41.答案:A

42.答案:D

解析:月经改变是子宫肌瘤患者常见症状,多表现为周期缩短、经期延长、经量增多。

43.答案:B

解析:青春期初具生育能力,但生殖系统发育仍不完善。由于卵巢功能尚不完善,所以初潮后月经周期多不规律,经过2~4年建立周期性排卵后月经逐渐正常。该患者初潮后2年,月经周期无规律,可能是雌激素水平低,不足以引起LH陡直高峰的出现,需要药物治疗,调整月经周期。

44.答案:D

解析:经产妇宫口开大4cm,且宫缩规律有力时,应送入产房,准备接生。

45.答案:E

解析:此患者考虑为前置胎盘,产科检查可见子宫软,无压痛,子宫大小与停经月份相符,胎方位清楚,胎先露高浮,胎心可正常或异常或消失。

46.答案:D

47.答案:E

解析:正常阴道液呈酸性为4.5~5.5;羊水的pH为7.0~7.5。用pH试纸检查,若阴道流出液pH>6.5时,视为阳性,胎膜早破的可能性极大。

48.答案:E

49.答案:D

解析:对于晚期产后出血的患者,应首先考虑胎盘或胎膜残留。若持续少量或中

等量流血,且发生在产后2周,可由胎盘附着面感染或复旧不全所致,可给予子宫收缩剂和抗生素,促进子宫收缩,控制感染。

50.答案:D

解析:考虑该病例是外阴阴道假丝酵母菌病,由长期服用抗生素所致可通过阴道分泌物检查确诊,用抗真菌药物治疗,同时停用抗生素,注意治疗期间禁止性生活。

51.答案:A

52.答案:E

53.答案:B

54.答案:C

55.答案:A

56.答案:A

解析:妊娠不足36周或估计胎儿体重小于2300g,阴道流血量少,孕妇全身情况好,胎儿存活者,可以采用期待疗法。接受期待疗法孕妇的护理措施包括:①保证休息,减少刺激,有出血者绝对卧床,定时间断吸氧;②纠正贫血;③监测病情变化;④预防产后出血和感染;⑤加强管理和宣教。

57.答案:A

解析:先心病患者产后立即放置沙袋,防止腹压骤减,回心血量增多,增加心脏负荷。

58.答案:E

59.答案:B

60.答案:C

解析:根据患者的临床表现考虑为子宫内膜炎,可使用宫缩剂加强宫缩,促进恶露排出,避免炎症扩散。

61.答案:D

解析:产后6周复查,生殖器官复原可恢复性生活。排卵可在月经未复潮前即先恢复,故应采取避孕措施,可选用工具法、口服避孕药,如哺乳的母亲不宜口服避孕药,因药物可通过乳汁而影响婴儿,应选用工具避孕。

62.答案:A

63.答案:C

64.答案:C

65.答案:D

66.答案:D

67.答案:C

68.答案:C

69.答案:E

解析:初产妇宫口开全时可指导产妇屏气用力,运用腹压,加速产程进展。宫口未开全运用腹压易造成宫颈水肿,影响产程进展。

70.答案:C

71.答案:C

解析:在新生儿出生后最初几天,由于受母体激素的影响可使新生儿乳房肿大并分泌出类似乳汁的物质,女婴有时会有假月经及阴唇肥大现象,属正常现象,无需特殊处理。

72.答案:D

解析:给该患者人工破膜后,羊水有可能进入子宫蜕膜或子宫颈破损的小血管而发生羊水栓塞,患者出现了羊水栓塞的典型临床表现。

73.答案:B

解析:选项A、C、D和E都是羊水栓塞的病理生理变化,选项B是妊娠期高血压疾病的病理生理变。

74.答案:C

75.答案:C

76.答案:D

77.答案:B

78.答案:C

79.答案:C

80.答案:D

解析:围绝经期患者卵巢功能衰退,雌激素水平下降,对下丘脑与垂体的负反馈作用减弱,因此FSH和LH水平均升高。雌激素缺乏,尿道和膀胱黏膜变薄,骨密度降低。围绝经期卵巢排卵能力下降,孕激素水平应下降。

81. 答案: B

解析: 诊断性刮宫可以起到快速止血的作用。

82. 答案: B

解析: 围绝经期功血患者采取措施止血后, 应继续用激素调整周期, 以期达到减少出血、阻止雌激素对子宫内膜持续作用, 预防子宫内膜癌发生的目的。

83. 答案: E

解析: 先兆子宫破裂的主要表现是病理性缩复环形成、下腹部压痛、胎心率改变和血尿出现。子宫破裂的主要表现是: ①症状: 产妇突然感觉到下腹部发生一阵撕裂样的剧痛之后腹部疼痛缓解, 子宫收缩停止; 稍感舒适后即出现面色苍白等休克征象; ②体征: 全腹压痛、反跳痛, 可叩及移动性浊音; 腹壁下可清楚扪及胎体, 子宫缩小位于胎儿侧边, 胎心、胎动消失; 阴道可能有鲜血流出, 量可多可少; 阴道检查发现宫颈口较前缩小, 先露部上升, 可扪及宫壁裂口。

84. 答案: D

解析: 子宫破裂在抢救休克的同时, 无论胎儿是否存活, 均应尽快作好剖宫产术前准备。手术方式应根据产妇的全身情况、破裂的部位及程度、发生破裂时间以及有无严重感染而决定。术中、术后应给大剂量抗生素控制感染。

85. 答案: C

解析: 预防子宫破裂的措施包括: ①建立健全三级保健网, 认真作好计划生育及围生

期保健工作, 加强产前检查, 有异常分娩史者提前住院待产; ②密切观察产程, 及时识别异常, 出现先兆子宫破裂征象, 及时报告医师, 作好剖宫产准备; ③严格掌握宫缩剂的使用指征和方法。无禁忌证的产妇, 应用缩宫素引产宜稀释后静脉滴注, 专人负责产程, 调整滴速, 禁止在胎儿娩出前肌内注射缩宫素; ④严格各种阴道手术指征, 遵守操作规程; ⑤严格剖宫产指征, 有过剖宫产史的产妇试产时间一般不应超过 12 小时。

86. 答案: A

87. 答案: C

88. 答案: D

89. 答案: A

90. 答案: C

91. 答案: C

92. 答案: D

93. 答案: A

94. 答案: D

95. 答案: E

96. 答案: D

97. 答案: C

解析: B 型超声检查是诊断胎儿畸形的方法之一, 检查胎儿结构畸形的时间一般是妊娠 18~24 周; 为排除胎儿心脏畸形需行胎儿超声心动检查时, 一般选择在妊娠 20~22 周进行。

98. 答案: B

99. 答案: A

100. 答案: A

模拟试卷(二)

基础知识

1.答案:B

2.答案:C

3.答案:A

解析:肛裂常发生在肛管后正中部位,当病人处于膝胸位,肛裂部位在正上方。

4.答案:C

解析:痰细胞检查简单易行。

5.答案:E

解析:病因目前尚不十分清楚,可能与以下因素有关:血管病变、妊娠高血压综合征、慢性高血压和肾炎病人常并发胎盘早剥;机械性因素如腹部受撞击、挤压,摔伤或行外倒转术纠正胎位;子宫静脉压突然升高。

6.答案:A

7.答案:B

解析:股骨下1/3和胫骨上1/3骨折易引起腘动脉损伤。

8.答案:D

解析:滴虫适宜生长的温度为25~40℃,pH 5.2~6.6的潮湿环境最适宜其生长繁殖。

9.答案:E

解析:子宫缩乏力是产后出血的最主要原因,占产后出血总数的70%~80%。

10.答案:E

11.答案:B

12.答案:D

解析:中心静脉压反映心脏前负荷,而肺动脉楔压反映后负荷。

13.答案:C

解析:肺气肿的病理改变按累及肺小叶的部位分为三种类型:小叶中央型、全小叶

型和混合型。

14.答案:A

解析:病毒性脑炎的80%属肠道病毒感染。

15.答案:A

解析:窒息、产伤是新生儿颅内出血的最主要病因,输注高渗液体、脑血管先天畸形亦是原因之一。

16.答案:B

解析:前囟早闭或过小均属病理情况,如小头畸形。

17.答案:D

18.答案:E

19.答案:D

20.答案:B

21.答案:D

22.答案:E

解析:凡血培养阳性的全身感染称为菌血症。

23.答案:D

24.答案:B

25.答案:A

26.答案:B

解析:小儿出生平均体重为3kg,前6个月生长最快,故3~5个月时是出生体重2倍,即6kg;1岁时约3倍;2岁时约4倍。

27.答案:C

解析:禁忌证包括生殖器官急性炎症、慢性盆腔炎急性或亚急性发作者;月经期或有不规则阴道出血者;有严重的心、肺疾病者。

28.答案:E

解析:脑膜炎双球菌是暴发性脑膜炎的致病菌。

29.答案:A

30.答案:D

解析:目前认为慢性胃炎约 90% 由幽门螺杆菌感染所引起。

31.答案:A

32.答案:A

33.答案:E

34.答案:B

35.答案:B

解析:前列腺增生的原因不清,目前主要认为与体内雌激素和雄激素水平失调有关。

36.答案:B

37.答案:C

解析:循环血容量于妊娠 6 周起开始增加,至妊娠 32~34 周达高峰,约增加 35%,平均约增加 1 500 mL,维持此水平直至分娩。

38.答案:D

解析:习惯性流产指自然流产连续发生 3 次或 3 次以上者。

39.答案:E

解析:CO 中毒时,脑、心对缺氧最敏感,常最先受损。

40.答案:A

解析:病毒性心肌炎是由嗜心肌性病毒感染引起的。

41.答案:E

42.答案:B

解析:肝硬化腹水一般为漏出液,并发自发性细菌性腹膜炎、结核性腹膜炎或癌变。

43.答案:B

44.答案:A

解析:胆道系统是细菌最主要的人侵途径和最常见的病因。胆道结石等原因并发急性化脓性胆管炎累及胆总管时,因胆囊管和肝总管汇合成胆总管,因此细菌沿胆管上行,可进入肝脏,感染肝形成肝脓肿。

45.答案:C

46.答案:C

47.答案:B

48.答案:A

49.答案:C

50.答案:B

解析:凡是早产胎儿或新生儿血氧浓度降低的任何因素都可引起新生儿窒息。包括孕母因素,如母亲患糖尿病、心肾等全身性疾病,妊高征等产科疾病,孕母吸毒、吸烟等,母亲年龄>35 岁或<16 岁,多胎妊娠等;分娩因素如脐带绕颈、受压、打结,手术产,产程中使用麻醉、催产药物不当;胎儿因素如早产儿、小于胎龄儿、巨大儿等,呼吸道、心脏等先天畸形,羊水或胎粪吸入导致的呼吸道阻塞,宫内感染导致的神经系统受损等。

51.答案:A

52.答案:A

53.答案:D

解析:产妇于分娩后 2~3 周血容量恢复至未孕状态,产褥早期血液仍处于高凝状态,红细胞、白细胞、血小板数量明显增加。

54.答案:E

55.答案:E

56.答案:B

57.答案:A

58.答案:D

59.答案:A

解析:闭合性单处肋骨骨折的治疗原则是止痛、固定胸廓和防止并发症。

60.答案:E

61.答案:A

解析:流行病学研究表明,我国属幽门螺杆菌高感染率国家。幽门螺杆菌感染无例外地引起胃黏膜炎症,感染后机体难以清除而变成慢性感染。此菌是慢性浅表性胃炎的最主要病因。

62.答案:C

63.答案:B

64. 答案: B

65. 答案: C

66. 答案: C

解析: 虫药的主要毒性是抑制胆碱酯酶, 一般胆碱酯酶活性降至正常人的 70% 以下。

67. 答案: B

解析: 微生态失衡是指在外在环境影响下, 正常微生物之间及正常微生物与宿主之间平衡状态改变, 由生理型组合转变成病理组合的状态。微生物失衡会引起菌群失调和移位。

68. 答案: D

解析: 内脏性疼痛的特点是: ①痛觉迟钝, 刺、割、灼等刺激不敏感, 但对较强的张力(如牵拉、膨胀、痉挛)及缺血、炎症等刺激较敏感; ②痛感弥散, 定位不准确; ③疼痛过程缓慢、持续, 常伴有焦虑、不安、恐怖等情绪反应。

69. 答案: C

70. 答案: B

解析: 前列腺大致可分为外周区、移行区、中央区和纤维区四个部分, 前列腺癌好发于外周区, 而良性前列腺增生好发于移行区。

71. 答案: D

解析: 畸形愈合属于骨折晚期并发症。

72. 答案: C

73. 答案: E

74. 答案: B

75. 答案: A

76. 答案: C

77. 答案: C

78. 答案: C

79. 答案: A

80. 答案: D

解析: 青春期少女功血多属无排卵性功血, 因其下丘脑-垂体-卵巢轴间的调节功能尚未成熟, 垂体分泌的 FSH 相对不足, 无正

常月经周期中 LH 的高峰, 因此卵巢中的卵泡不能发育成熟而排卵。

81. 答案: D

82. 答案: B

83. 答案: A

84. 答案: C

85. 答案: C

86. 答案: E

87. 答案: D

88. 答案: A

解析: 特发性血小板减少性紫癜实验室检查, 血象: 血小板 $< 100 \times 10^9 / L$, 有贫血, 白细胞正常; 骨髓象: 巨核细胞数正常或增多, 以小型巨核细胞为主。

89. 答案: C

90. 答案: E

91. 答案: E

92. 答案: C

93. 答案: B

94. 答案: A

解析: 军团菌肺炎 X 线显示肺炎早期为斑片状浸润阴影, 继而肺实变, 下叶较多见, 单侧或双侧。严重者可伴有空洞、胸腔积液或肺脓肿。肺炎支原体肺炎 X 线呈多种形态的浸润影, 呈节段性分布, 以肺下野多见, 有的从门附近向外伸展。肺炎克雷伯杆菌肺炎 X 线表现为两肺多发的、小叶斑片状病灶, 可融合呈大片状阴影, 病变区可见小脓肿或空洞。肺炎链球菌肺炎 X 线可见肺病变部呈大片均匀、致密阴影, 局限于一叶或一肺段。双肺弥漫性结节性浸润见于病毒性肺炎 X 线片。

95. 答案: D

96. 答案: C

97. 答案: B

98. 答案: E

99. 答案: A

100. 答案: C

相关专业知识

1.答案:D

2.答案:B

解析:崇拜、羡慕的行为,如演员的举止等;通过强迫模仿获得规定行为,如队列训练等。

3.答案:D

4.答案:A

5.答案:A

6.答案:D

解析:授权步骤的内容:确定什么工作需要授权;选择授权对象、明确授权内容、为被授权者排除工作障碍、形成沟通渠道、评价授权效果。

7.答案:E

8.答案:C

解析:职能型组织结构又称多线型组织结构。其特点是:①管理工作分工较细;②由于吸收专家参与管理,可减轻上层管理者的负担;③多头领导,不利于组织的集中领导和统一指挥;④各职能机构往往不能很好配合;⑤过分强调专业化。

9.答案:B

10.答案:E

解析:空气消毒采用的方法中应除外过氧化氢喷雾消毒。过氧化氢属高效消毒剂,具有广谱、高效、速效、无毒,对金属及织物有腐蚀性,受有机物影响很大,纯品稳定性好,稀释液不稳定等特点,常用消毒方法有浸泡、擦拭等。

11.答案:E

12.答案:D

解析:健康教育与健康促进的核心是促使人们建立健康的行为和生活方式,制定一系列使行为和生活方式向有益于健康方向发展的策略,从而降低危险因素,预防各种因不良行为或生活方式所导致的健康问题或疾病。

13.答案:E

14.答案:B

解析:三度失调:原正常菌群大部被抑制,只有少数菌种占决定性优势。发生三度失调的原因常为广谱抗菌药物的大量应用使大部分正常菌群消失,而代之以过路菌或外袭菌,并大量繁殖而成为该部位的优势菌。

15.答案:E

16.答案:C

解析:过程评价起始于健康教育计划实施开始之时,贯穿于计划执行的全过程。

17.答案:C

18.答案:E

解析:洗手指征:①接触病人前后,特别是在接触有破损的皮肤、黏膜和侵入性操作前后;②进行无菌技术操作前后,进入和离开隔离病房、ICU、母婴室、新生儿病房、烧伤病房、感染性疾病病房等重点部门时,戴口罩和穿脱隔离衣前后;③接触血液、体液和被污染的物品后。

19.答案:D

20.答案:A

解析:消化道隔离用于防止经粪-口传播的感染。用于伤寒、甲型肝炎、脊髓灰质炎、感染性腹泻、细菌性痢疾等。

21.答案:A

22.答案:E

解析:开放型肺结核的病原菌是结核杆菌,属于抗酸杆菌,应采取抗酸杆菌隔离。

23.答案:C

24.答案:C

解析:临床上抗感染药物主要对病原微生物具有较高的“选择性毒性作用”,对病人不造成危害。其作用机制主要包括:干扰细菌细胞壁合成;损伤细胞膜;影响细菌蛋白质的合成;抑制细菌核酸的合成。

25. 答案: E

26. 答案: E

解析: 术前应用抗生素方法: ①有明确指征; ②在术前 0.5~1 小时通过静脉给予一次足量抗生素, 总的预防用药时间一般不超过 24 小时; ③择期的结、直肠手术前, 还需通过导泻或灌肠剂进行肠道准备; ④高危剖宫产术, 应在脐带钳夹后立即预防性应用; ⑤万古霉素不作为常规药物。

27. 答案: C

28. 答案: C

解析: 炭疽的传染源是病畜(羊、牛、马、骡、猪等)和病人。人与带有炭疽杆菌的物品接触后, 通过皮肤上的破损处或伤口感染可以形成皮肤炭疽; 通过消化道感染可以形成肠炭疽; 通过呼吸道感染可以形成肺炭疽。对炭疽病人用过的治疗废弃物和有机垃圾应全部焚烧。

29. 答案: A

30. 答案: E

31. 答案: C

32. 答案: E

解析: 为完成战略决策所规定的目标而制定的组织在未来一段较短的时间内的具体的行动方案为战术决策。

33. 答案: A

34. 答案: E

解析: 组织图也称组织树, 指用图形表示组织的整体结构、职权关系及主要职能。组织图一般描述下列几种组织结构及管理关系方面的信息: 权力结构、沟通关系、管理范围及分工情况、角色结构和组织资源流向等。

35. 答案: A

36. 答案: D

解析: 有效训导的方法: ①以平等、客观、严肃的态度面对下属; ②具体指明问题所在; ③批评对事不对人, 不要损害下属的尊严和人格; ④允许下属表达自己对问题的看法和理解; ⑤控制讨论; ⑥对今后如何防

范错误提出建议, 达成共识; ⑦对于反复发生的错误, 逐步加重处罚。

37. 答案: B

38. 答案: C

解析: 环节质量评价常用的评价指标:

①护理技术操作合格率; ②基础护理合格率; ③特护、一级护理合格率; ④各种护理表格书写合格率; ⑤一人一针一管执行率; ⑥常规器械消毒灭菌合格率。

39. 答案: C

40. 答案: E

41. 答案: C

42. 答案: A

43. 答案: A

44. 答案: B

45. 答案: A

46. 答案: E

47. 答案: D

48. 答案: D

解析: 科室轮转是院内培训方法。

49. 答案: E

解析: 沟通的过程包括以下 5 个步骤: 信息源、编码、传递信息、解码和反馈。信息源是指发出信息的人; 编码是发送者将这些信息译成接受者能够理解的一系列符号; 传递信息是通过某种通道将信息传递给接受者; 解码是接受者将通道中加载的信息翻译成他能够理解的形式, 解码的过程包括: 接收、译码和理解三个环节; 反馈是接受者将其理解的信息再返回发送者, 反馈过程是信息沟通的逆过程, 包括了信息沟通过程的几个环节。

50. 答案: E

51. 答案: D

52. 答案: E

53. 答案: C

54. 答案: D

55. 答案: C

56. 答案: B

57. 答案: D

58. 答案: E
 59. 答案: E
 60. 答案: D
 61. 答案: B
 62. 答案: B
 63. 答案: D
 64. 答案: A
 65. 答案: E
 66. 答案: A
 67. 答案: A
 68. 答案: E
 69. 答案: D
 70. 答案: C
 71. 答案: C
 72. 答案: E
 73. 答案: E
 74. 答案: D
 75. 答案: E
 76. 答案: C
 77. 答案: A
 78. 答案: C
 79. 答案: D

80. 答案: B
 81. 答案: D
 82. 答案: B
 83. 答案: C
 84. 答案: A
 85. 答案: C
 86. 答案: D
 87. 答案: E
 88. 答案: B
 89. 答案: A
 90. 答案: C
 91. 答案: A
 92. 答案: A
 93. 答案: E
 94. 答案: A
 95. 答案: B
 96. 答案: D
 97. 答案: D
 98. 答案: B
 99. 答案: B
 100. 答案: C

专业知识

1. 答案: D
 2. 答案: A

解析:双顶径是胎头两顶骨隆突间的距离,是胎头最大横径,临床以 B 型超声测此值步断胎儿大小,一般足月妊娠时平均值约为 9.3 cm。

3. 答案: A
 4. 答案: C

解析:有剖宫产史、多胎、过期妊娠以及胎盘功能异常等均属于高危妊娠范畴。阑尾炎手术史属于既往有腹部手术史,与妊娠无关,因此不在高危妊娠范畴内。

5. 答案: E
 6. 答案: E
 7. 答案: D

8. 答案: B
 9. 答案: C

解析:滴虫阴道炎的治疗以全身治疗为主,局部治疗为辅。夫妻双方要同时治疗,切断直接传播途径;治疗后应在每次月经干净后复查阴道分泌物,转阴后,巩固 1~2 个疗程方可停药。于月经干净后复查阴道分泌物,连续 3 次未发现滴虫者为治愈。全身治疗为口服甲硝唑,妊娠期、哺乳期妇女慎用。局部治疗先用 0.5% 醋酸或 1% 乳酸或 1:5 000 高锰酸钾溶液阴道灌洗,然后用甲硝唑等置于阴道穹隆部。

10. 答案: C
 11. 答案: E

解析:急性盆腔炎患者行妇科检查时,

可发现阴道黏膜充血,脓性分泌物自宫颈口外流。穹隆明显触痛、饱满,宫颈充血,宫颈举痛,宫体略大、压痛、活动受限,输卵管增粗并有压痛,如为输卵管卵巢囊肿可触及包块,宫旁结缔组织炎时可扪及宫旁一侧或两侧有片状增厚,可触及后穹隆或侧穹隆肿块且有波动感。

12. 答案:D

解析:获得性免疫缺陷综合征主要通过性接触、血液和垂直传播。

13. 答案:E

解析:子宫颈阴道部鳞状上皮和宫颈管柱状上皮形成原始鳞柱交界部,其因激素波动可形成生理性鳞柱交界部,二者之间的移行带区是子宫颈癌的好发部位。

14. 答案:B

15. 答案:E

16. 答案:E

17. 答案:E

18. 答案:A

19. 答案:A

20. 答案:A

21. 答案:E

22. 答案:B

解析:常染色体隐性遗传病,父母双方均为携带者时,子代的患病风险为 $1/4$,其余 $3/4$ 为表型正常个体,在表型正常个体中,约 $2/3$ 为基因携带者。

23. 答案:D

24. 答案:E

25. 答案:E

26. 答案:B

27. 答案:D

解析:子宫收缩具有缩复作用,即每次宫缩时,子宫体肌纤维缩短变宽,宫缩后肌纤维虽又重新松弛,但不能完全恢复到原来长度,经过反复收缩,肌纤维越来越短。

28. 答案:B

解析:糖尿病患者需控制饮食,提倡多食绿叶蔬菜、豆类、谷物、低糖水果等,并坚

持低盐饮食,既要满足控制血糖,又要保证胎儿发育,预防低血糖。孕期体重增长控制在 12.5 kg 以下,肥胖者在 10 kg 以下。

29. 答案:E

解析:骨盆出口平面狭窄的特点为骨盆入口各径线值正常,骨盆侧壁内收以及骶骨平直使得坐骨切迹 <2 横指,耻骨弓 $<90^\circ$,出口横径 $<7.5\text{ cm}$,出口横径与出口后矢状径之和小于 15 cm 。题中提示骨盆出口横径 $<8\text{ cm}$,应进一步测量出口后矢状径的值,看是否出口横径与出口后矢状径之和小于 15 cm ,如小于 15 cm ,则不宜试产;如大于 15 cm ,可考虑试产。

30. 答案:B

解析:骨盆每个平面的径线均小于正常值 2 cm 或更多,而骨盆外形属于女性型骨盆,称均小骨盆。多见于身材矮小、体形匀称的妇女。

31. 答案:B

解析:急性感染并发高热者,应有效控制感染和体温下降后再彻底清宫,避免因刮宫引起感染扩散和子宫穿孔。

32. 答案:C

解析:晚期产后出血应给予足量广谱抗生素防治感染。

33. 答案:C

解析:外阴炎症状表现为皮肤黏膜瘙痒、疼痛、灼热,性交及排尿排便时加重,体征可有局部充血、肿胀、糜烂,有抓痕,局部红肿、湿疹,偶见溃疡,皮肤黏膜粗糙增厚、皲裂或呈棕色改变。

34. 答案:A

解析:阴道内糖原增多、酸度增加、局部免疫力下降时,最适合假丝酵母菌繁殖生长。故进行治疗时,应选择 $2\% \sim 4\%$ 碳酸氢钠溶液进行阴道灌洗或坐浴,破坏有利于假丝酵母菌生长的酸性环境。

35. 答案:B

解析:侵蚀性葡萄胎的治疗原则是化疗为主,并几乎代替了手术。

36. 答案:C

解析:患者可在用化疗药物几日后开始出现食欲减退、恶心、呕吐症状,且逐渐加重。此项不良反应一般不影响继续用药,但若患者长期不能进食,恶心、呕吐严重,可引起患者体重锐减、水电解质平衡失调、代谢性中毒,同时也会给患者带来巨大的心理压力。

37. 答案:D

解析:卵巢瘤样病变是引起育龄期妇女卵巢增大的最常见原因,包括卵泡囊肿、黄体囊肿、巧克力囊肿、黄素囊肿、多囊卵巢等,其中以卵泡囊肿和黄体囊肿最常见。

38. 答案:E

解析:外阴癌一旦确诊应以手术治疗为主,辅以放射治疗。

39. 答案:E

解析:人工授精适用于男方患性功能障碍和女方宫颈管狭窄、宫颈黏液异常、抗精子抗体阳性等。

40. 答案:B

41. 答案:D

解析:妊娠合并糖尿病患者应在分娩时随时监测血糖,控制血糖在正常或接近正常范围内,但不低于 5.6 mmol/L 以防发生低血糖,必要时按每 4 g 葡萄糖加 1 U 胰岛素的比例补液。产程延长者易发生酮症酸中毒,严重影响母儿预后,因此最好控制总产程在 12 小时内结束。

42. 答案:A

43. 答案:C

44. 答案:E

45. 答案:B

46. 答案:E

47. 答案:C

解析:患者 P-hCG 阳性,发病与妊娠有关,故排除 D、E。考虑为妊娠滋养细胞疾病,葡萄胎排空后 6 个月内发病者临床诊断为侵蚀性葡萄胎,在其他妊娠后 6 个月以后,一般超过 1 年发病者为绒癌。故此患者

首先可诊断为绒癌。患者突然出现颅压升高的表现,提示有脑转移,并且同时肺部有转移病灶也支持诊断,因绒癌脑转移者一般同时伴有肺转移。

48. 答案:E

49. 答案:B

50. 答案:C

51. 答案:C

解析:卵巢实性肿物,为良性的可能性小,结合患者血清 AFP 升高,可能为卵巢内胚窦瘤。其中 AFP 可作为诊断和监测肿瘤消长的重要指标。

52. 答案:D

解析:外阴癌的处理原则是手术治疗为主,辅以放疗和化疗。手术范围的选择取决于临床分期、病变部位、肿瘤细胞的分化程度、浸润深度、患者的身体状况及年龄等。此患者临床分期为 0 期,年龄较大,体质较差,可行单纯外阴切除术。

53. 答案:D

54. 答案:E

解析:老年期保健应指导保持生活规律,注意劳逸结合,以高蛋白、高维生素、低脂肪饮食为宜。

55. 答案:D

解析:子宫收缩好,无压痛,恶露正常无异味可排除产褥感染;会阴伤口无红肿可排除会阴伤口感染;双乳胀痛硬结,但体温无明显高热,上述局部发红、脓肿等体征,考虑为乳汁淤积。

56. 答案:C

解析:宫缩压力试验(CST)或缩宫素激惹试验(OCT):是通过子宫收缩造成的胎盘一过性缺氧负荷试验及测定胎儿储备能力的试验。自然临产后应行 CST。

57. 答案:D

58. 答案:D

解析:年龄超过 40 岁的患者,可直接切除子宫,保留附件;若子宫超过孕 14 周大小,应考虑吸出葡萄胎组织后再行子宫切除

术。但是,单纯切除子宫只能去除病变侵入局部组织的危险,不能防止转移的发生。

59.答案:B

解析:葡萄胎的诊断一经确定后,应立即给予清除。对于局部恶变倾向的葡萄胎患者选择性地采取预防性化疗。具有恶变倾向的葡萄胎患者包括年龄大于40岁。

60.答案:A

61.答案:D

解析:阴道封闭术主要适用于年老体弱不能耐受较大手术,不需保留性交功能者。

62.答案:D

63.答案:C

64.答案:B

解析:心率1分,呼吸1分,肌张力1分,喉反射1分,肤色1分,共5分。

65.答案:C

解析:新生儿出现窒息时,不能给予口对口人工呼吸。用于新生儿正压人工呼吸的装置有两类,一是自动充气式气囊,二是气流充气式气囊。

66.答案:E

67.答案:C

解析:患者胎膜早破不可下地活动,以防止脐带脱垂;破膜超过12小时给予抗生素预防感染;发现脐带脱垂应立即采取处理措施;因孕33+3周要尽量延长胎儿在宫内生长时间,患者无其他问题不应终止妊娠,故选项A、B、D和E均不正确。患者胎膜早破,若妊娠<35周时,可给予地塞米松以促进胎肺成熟。

68.答案:C

解析:子宫内膜不规则脱落是患者黄体萎缩不全,子宫内膜持续受孕激素刺激,以致不能如期完整脱落,故月经表现为周期正常,但经期延长。

69.答案:D

解析:子宫内膜不规则脱落通常采用孕激素治疗,利用孕激素对下丘脑垂体功能的负反馈抑制,使黄体及时萎缩,促使子宫内

膜及时完整脱落。

70.答案:B

71.答案:C

72.答案:B

73.答案:C

解析:该患者现孕36+2周,胎膜早破,所以应卧床休息,抬高臀部,破膜超过12小时给予抗生素预防感染,监测胎心,若有脐带脱垂发生应在数分钟内结束分娩,若临产,可采取措施尽快结束分娩。一般妊娠小于35周可给予地塞米松促胎肺成熟。

74.答案:D

75.答案:B

解析:氢氧化钾可起到去除杂菌的作用。

76.答案:C

解析:复发性外阴阴道假丝酵母菌病应以全身治疗为主,广谱抗生素对真菌感染无效。

77.答案:B

78.答案:E

79.答案:D

80.答案:E

81.答案:B

解析:氢氧化钾可以溶解其他全细胞成分,使假丝酵母菌检出率增高。

82.答案:E

83.答案:C

84.答案:A

85.答案:B

86.答案:D

87.答案:B

88.答案:C

89.答案:D

90.答案:E

91.答案:C

92.答案:D

93.答案:D

94.答案:E

95.答案:A

96.答案:B

97.答案:A

98.答案:A

99.答案:C

100.答案:B

专业实践能力

1.答案:E

解析:初产妇宫口开全至 10 cm,经产妇宫口开大 3~4 cm 且宫缩好,可护送产房准备接生。当胎头拨露使阴唇后联合紧张时,开始保护会阴。

2.答案:A

3.答案:D

4.答案:C

5.答案:D

6.答案:B

解析:妊娠期重症肝炎需保护肝脏,积极预防及治疗肝性脑病的发生,限制蛋白质的摄入,每日应 $<0.5\text{ g/kg}$,增加糖类,保持大便通畅,预防 DIC 及肾衰竭。妊娠末期合并重症肝炎患者,经积极治疗 24 小时后,以剖宫产结束妊娠。分娩期应备新鲜血液,缩短第二产程,并注意防止母婴传播及产后出血。产褥期应用对肝脏损害较小的广谱抗生素预防产褥感染。

7.答案:E

8.答案:B

9.答案:B

10.答案:E

11.答案:C

解析:急性盆腔炎患者宜取半卧位,使盆腔位置相对较低有利于脓液积聚于直肠子宫陷凹而使炎症吸收或局限。

12.答案:D

13.答案:E

14.答案:E

15.答案:E

16.答案:E

解析:破膜后应立即卧床,听胎心音,行肛门检查,注意观察有无脐带脱垂征象,记

录破膜时间、羊水量及性状,破膜时间 >12 小时尚未分娩者,应用抗生素,预防感染。

17.答案:A

18.答案:A

19.答案:D

20.答案:A

21.答案:A

22.答案:D

解析:子宫破裂患者在抢救休克的同时,应尽快作好剖宫产的术前准备,并于术中、术后应用大剂量抗生素以防感染。

23.答案:E

解析:晚期产后出血是指分娩 24 小时以后,至产褥期内发生的子宫大量出血,以胎盘和(或)胎膜残留引起的出血多见。剖宫产术后子宫伤口裂开引起的大量阴道流血多发生在术后 2~3 周。少量或中等量阴道流血,应给予足量广谱抗生素、子宫收缩剂治疗。剖宫产者,大量阴道流血需积极抢救,此时刮宫手术应慎重,因剖宫产术后组织残留机会甚少,刮宫可造成原切口再损伤导致更多量流血,必要时开腹探查。

24.答案:C

25.答案:D

26.答案:B

解析:前庭大腺炎发生在性交、流产、分娩、月经期和产褥期等状态下,污染外阴部,病原体侵犯腺管,引起炎症急性发作,腺管口因炎症肿胀阻塞,渗出物不能外流、积存而形成脓肿。当急性炎症消退后,腺管口粘连闭塞,分泌物不能排出,脓液逐渐转为清液而形成前庭大腺囊肿,前庭大腺脓肿多发生于一侧。

27.答案:D

解析:子宫颈癌广泛子宫切除术后易并发尿潴留,一般留置尿管7~14天。

28.答案:C

29.答案:A

30.答案:A

31.答案:D

32.答案:D

33.答案:D

34.答案:D

35.答案:A

36.答案:C

37.答案:C

解析:晚期产后出血是指分娩24小时以后,至产褥期内发生的子宫大量出血。剖宫产术后子宫切口裂开或愈合不良所致的阴道出血多见于术后2~3周。查体子宫复旧不良,宫口松弛。产后滋养细胞肿瘤也可引起晚期产后出血。

38.答案:C

39.答案:B

解析:淋病患者治疗结束,临床症状消失7天后,取宫颈管分泌物涂片培养,以后每月复查1次,连续3次阴性方能确定为治愈。

40.答案:C

41.答案:C

42.答案:B

43.答案:A

解析:孕妇发生水肿时,可取左侧卧位,下肢垫高15°,避免长时间地站或坐,以利血液回流。适当限制孕妇对盐的摄入,但不必限制水分。发生贫血时应适当增加含铁食物的摄入,如动物肝脏、瘦肉、蛋黄、豆类等。发生便秘时,孕妇应养成每日定时排便的良好习惯,并多吃含纤维素多的新鲜蔬菜和水果,同时增加每日饮水量,注意适当的活动。

44.答案:A

45.答案:D

46.答案:C

解析:中骨盆狭窄者,若宫口已开全,胎

头双顶径达坐骨棘水平或更低,遵医嘱做好胎头吸引术、产钳等阴道助产术,以及抢救新生儿的准备。

47.答案:B

48.答案:E

解析:根据病例提供信息,考虑该患者是先兆子宫破裂,所以应立即采取有效措施抑制子宫收缩,如乙醚全麻或肌注哌替啶,并尽快行剖宫产术,迅速结束分娩。

49.答案:E

50.答案:D

51.答案:C

52.答案:B

53.答案:D

54.答案:E

解析:该患者考虑为胎盘早剥。胎盘早剥一旦确诊,必须及时终止妊娠。首要的护理措施是纠正休克,改善患者一般情况,为终止妊娠做好准备。

55.答案:A

56.答案:A

解析:根据题干信息,可考虑为骨盆入口平面狭窄,主要测量骶耻外径、前后径和对角径。

57.答案:E

解析:该患者胎膜早破,胎膜早破患者要避免不必要的肛诊与阴道检查。

58.答案:D

解析:该患者可能因子宫收缩过强造成急产,有可能羊水被挤入已破损的小静脉血管内引起题干描述的临床表现,考虑诊断是羊水栓塞。

59.答案:E

60.答案:E

解析:此患者考虑为先兆早产,可通过休息和药物治疗控制宫缩并促胎肺成熟,尽量延长孕周。

61.答案:B

62.答案:D

63.答案:B

64.答案:B

65.答案:A

解析:绒毛膜癌的典型病理改变为绒毛结构消失。

66.答案:E

解析:侵蚀性葡萄胎一般发生在葡萄胎清除术后6个月以内。最常见的转移部位是肺,出现肺转移时,患者往往有咯血。

67.答案:B

68.答案:B

69.答案:D

70.答案:B

71.答案:D

72.答案:B

解析:卵巢囊肿扭转合并感染,表现为腹痛、发热、腹膜刺激征、白细胞升高等,治疗原则为抗炎、补液,同时尽早手术。

73.答案:A

74.答案:E

75.答案:D

76.答案:B

解析:产褥早期因子宫收缩,常引起阵发性腹部疼痛,一般持续2~3天逐渐消失。白细胞于产褥早期较高。

77.答案:E

解析:分娩后7~10天宫颈口闭合方可坐浴。

78.答案:A

79.答案:E

解析:化疗患者出现消化道不良反应时鼓励患者多进食,根据患者的口味进食高蛋白、高维生素、易消化饮食,保证足够的热量和液体。指导患者饮食前后漱口,注意休息,保持充足睡眠以减少消耗。腹痛、腹泻急性期的患者宜禁食,通过输液补充肠道内损失的电解质,恢复期则可进流食,输注化疗药物应注意开吃饭时间,以免影响患者进食。

80.答案:D

81.答案:A

解析:后囟(小囟门)位于胎头后部,是由枕骨和两块顶骨之间的颅缝交界空隙形成的,呈三角形。此胎儿的小囟门位于2点,即枕骨位于骨盆的左前方,结合胎方位的概念,可判断胎方位是枕左前位。

82.答案:C

解析:Apgar评分以出生后1分钟时的心率、呼吸、肌张力、喉反射及皮肤颜色五项体征为依据,每项0~2分,满分10分。心率110次/分,2分;呼吸浅,不规则,1分;四肢活动好,2分;吸痰时喉部恶心,2分;身体红润,四肢发绀,1分。总分8分。

83.答案:C

84.答案:E

85.答案:E

86.答案:B

87.答案:E

解析:滴虫除可藏在腺体及阴道皱襞中,还可寄生于尿道、尿道旁腺、膀胱、肾盂以及男性包皮皱褶、尿道、前列腺等处。故治疗应以口服甲硝唑为主,并配合局部治疗。

88.答案:A

89.答案:C

90.答案:E

91.答案:B

92.答案:C

93.答案:B

94.答案:E

95.答案:A

96.答案:B

97.答案:C

98.答案:E

99.答案:D

100.答案:C