

2017 年全国卫生专业技术资格考试护理学(中级)
考前压轴密卷

外科护理学

模拟试卷(二)

金英杰国家医学考试研究中心 编



答题须知

- 1.考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
- 2.在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
- 3.在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
- 4.答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
- 5.答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
- 6.答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
- 7.考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
- 8.考试结束后,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
- 9.监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
- 10.考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

模拟试卷(二)

基础知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 肝门静脉压力增高时,下列病理变化中最早出现的是
 - 腹水
 - 充血性脾大
 - 上消化道出血
 - 食管胃底静脉曲张
 - 腹壁静脉怒张
- 属于手术室限制区的是
 - 走廊
 - 更衣室
 - 手术间及刷手间
 - 休息室
 - 敷料准备间
- 肛裂好发生于膝胸位时的
 - 12 点处
 - 8 点处
 - 10 点处
 - 4 点处
 - 3 点和 6 点处
- 在普查和诊断肺癌时,下列检查占重要地位的是
 - 肺功能检查
 - 胸部 X 线摄片检查
 - 痰细胞学检查
 - 纤维支气管镜检查
 - 胸腔积液检查
- 胎盘早剥的病因除外
 - 妊娠高血压综合征
 - 外伤
 - 肾炎
 - 母体有血管病变
 - 胎膜早破
- 肿瘤转移途径最常见的是
 - 直接蔓延
 - 跳跃性转移
 - 血行转移
 - 种植性转移
 - 淋巴道转移
- 股骨下 1/3 骨折,易造成
 - 股动脉损伤
 - 腓动脉损伤
 - 皮神经损伤
 - 肱静脉损伤
 - 坐骨神经损伤
- 阴道毛滴虫最适合的生长环境 pH 为
 - 2~3.5
 - 3.6~4.2
 - 4.3~5.2
 - 5.5~6
 - 6.3~6.8
- 导致产后出血原因中最常见的是
 - 胎盘残留
 - 胎盘嵌顿
 - 软产道损伤
 - 血友病
 - 子宫收缩乏力
- 外科最常见的脱水类型是
 - 原发性脱水
 - 慢性脱水
 - 高渗性脱水

- D.低渗性脱水
E.等渗性脱水
- 11.胃癌的转移途径中主要是
- A.直接浸润
B.淋巴转移
C.血行转移
D.腹腔种植
E.肝肾转移
- 12.可以反映心脏后负荷的指标是
- A.血压
B.脉搏
C.中心静脉压
D.肺动脉楔压
E.周围血管阻力
- 13.阻塞性肺气肿的病理分型按累及肺小叶的部位,可分为
- A.小叶中央型、气肿型、混合型
B.小叶中央型、气肿型、全小叶型
C.小叶中央型、全小叶型、混合型
D.气肿型、全小叶型、混合型
E.全小叶型、气肿型、支气管炎型
- 14.病毒性脑炎最常见的病原体是
- A.肠道病毒
B.科萨奇病毒
C.EB病毒
D.腺病毒
E.疱疹病毒
- 15.临床最主要导致新生儿颅内出血的原因是
- A.窒息、产伤
B.脑血管先天畸形
C.脑膜炎
D.血友病
E.输注高渗液体
- 16.以下疾病可表现为前囟早闭或过小的是
- A.佝偻病
B.小头畸形
C.呆小病
D.早熟
E.脑肿瘤
- 17.乳牙出齐的年龄一般在
- A.10~12个月
B.12~18个月
C.20~24个月
D.2~2.5岁
E.3~3.5岁
- 18.最严重的肾损伤类型是
- A.肾挫伤
B.肾盂部分裂伤
C.肾实质部分裂伤
D.肾横断
E.肾蒂损伤
- 19.微循环的灌注状态取决于
- A.心功能、血容量、血压
B.心功能、周围血管张力、脉压
C.血容量、血压、周围血管张力
D.心功能、血容量、周围血管张力
E.血容量、脉压、周围血管张力
- 20.每人每天需要氨基酸的量是
- A.0.6~1.0 g/(kg·d)
B.1.0~1.5 g/(kg·d)
C.1.3~1.8 g/(kg·d)
D.2.0~2.5 g/(kg·d)
E.2.6~3.0 g/(kg·d)
- 21.确诊恶性肿瘤最可靠的方法是
- A.血清酶学检查
B.CT
C.MRI
D.病理检查
E.X线造影
- 22.确诊菌血症的可靠证据是
- A.表现脉搏、呼吸快,体温高
B.神志淡漠、嗜睡
C.出现黄疸、皮下淤血
D.肝、脾大
E.血细菌培养阳性
- 23.成年人体液量约占体重的

- A.35%
B.45%
C.50%
D.60%
E.65%
- 24.丹毒指的是
A.急性管状淋巴管炎
B.急性网状淋巴管炎
C.疖病
D.淋巴结炎
E.痈
- 25.肠套叠病人特征性 X 线表现为
A.杯口状阴影
B.鸟嘴状阴影
C.立位 X 线片见多个气-液平面
D.鱼肋骨刺征
E.充盈缺损
- 26.正常 5 个月小儿的体重是出生体重的
A.1.5 倍
B.2 倍
C.3 倍
D.3.5 倍
E.5 倍
- 27.输卵管通液检查的禁忌情况是
A.月经干净 5 天
B.术前体温 36.8 °C
C.阴道炎治疗中
D.婚后 2 年不孕
E.脂肪瘤
- 28.暴发性脑膜炎的病原体是
A.大肠埃希菌
B.肺炎链球菌
C.金黄色葡萄球菌
D.流感嗜血杆菌
E.脑膜炎双球菌
- 29.急性心肌梗死临床上特征性的心电图改变是
A.ST 段弓背向上抬高
B.ST 段弓背向下
C.高大的 R 波
D.ST 段水平下移
E.T 波倒置
- 30.与慢性胃炎发病有关的细菌为
A.大肠埃希菌
B.沙门球菌
C.空肠弯曲菌
D.幽门螺杆菌
E.嗜盐杆菌
- 31.胃壁细胞的功能是分泌
A.盐酸
B.胃蛋白酶
C.血清促胃液素
D.胃泌素
E.雌激素
- 32.出生时存在但 3~4 个月后消失的反射是
A.拥抱反射
B.喉反射
C.腹壁反射
D.角膜反射
E.吞咽反射
- 33.引起新生儿颅内出血的病因除外
A.产伤
B.臀位产
C.滴注高渗性溶液
D.新生儿窒息
E.妊娠早期母患风疹
- 34.易导致枕骨大孔疝的是
A.小脑蚓部
B.小脑扁桃体
C.大脑颞叶
D.下丘脑
E.小脑绒球小结叶
- 35.导致前列腺增生的主要原因是
A.慢性咳嗽
B.雌激素和雄激素水平失调
C.膀胱结石

- D.老龄化
E.雄激素增多
- 36.下列最常引起心搏、呼吸骤停的是
- A.感染
B.冠心病
C.颅内高压
D.麻醉
E.溺水
- 37.妊娠期母体心脏负荷最重的时间是妊娠
- A.24~28周
B.30~32周
C.32~34周
D.34~36周
E.36~40周
- 38.习惯性流产定义为
- A.连续2次流产
B.连续2次自然流产
C.连续3次流产
D.连续3次自然流产
E.连续3次人工流产
- 39.CO中毒时最先受损的器官是
- A.肝
B.肺部
C.胃肠道
D.肾
E.心、脑
- 40.导致心肌炎最主要的病原体是
- A.病毒
B.细菌
C.药物中毒
D.螺旋体
E.寄生虫
- 41.法洛四联症患儿,2岁,喜蹲踞,其原理是
- A.保证重要器官供血
B.缓解腹部不适
C.腔静脉回心血量增加
D.休息,缓解疲劳
E.增加体循环阻力,减少右向左分流血量
- 42.肝硬化腹水的性质是
- A.渗出液
B.漏出液
C.乳糜液
D.黏液性
E.血性液
- 43.我国产妇死亡第一位的原因是
- A.妊娠合并心脏病
B.产后出血
C.羊水栓塞
D.产褥感染
E.妊娠期高血压疾病
- 44.细菌引发细菌性肝脓肿的最主要入侵途径是
- A.胆道系统
B.肝动脉
C.门静脉系统
D.淋巴系统
E.直接入侵
- 45.发生急性梗阻性化脓性胆管炎最常见的原因是
- A.肿大胆囊压迫胆总管
B.胆总管狭窄
C.胆总管结石
D.胆总管肿瘤合并梗阻
E.肝脓肿并发出血,阻塞胆管
- 46.引起颅内压增高的主要原因
- A.颅内、外感染
B.颅内占位性病变
C.颅外占位性病变
D.脑缺血缺氧
E.脑脊液循环异常
- 47.胸膜腔内的压力为负压,其生理意义正确的是
- A.组成肺的弹性回缩力
B.使肺维持扩张状态
C.降低肺泡表面张力

- D.维持肺泡稳定性
E.不能促进淋巴液的回流
- 48.典型的苯丙酮尿症是因肝脏缺乏
- A.苯丙氨酸羟化酶
B.酪氨酸羟化酶
C.谷氨酸羟化酶
D.二氢生物蝶呤合成酶
E.羟苯丙酮酸氧化酶
- 49.慢性阻塞性肺气肿患者不会出现的体征是
- A.胸廓呈桶状
B.呼吸运动减弱
C.两肺语颤增强
D.双肺叩诊过清音
E.两肺肺泡呼吸音减弱
- 50.引起新生儿窒息的因素不包括
- A.母亲患糖尿病
B.急产
C.脐带绕颈
D.早产儿
E.胎粪吸入
- 51.引起早产儿发生新生儿颅内出血的主要原因是
- A.缺氧
B.产伤
C.过快输入高渗液体
D.机械通气不当
E.脑血管畸形
- 52.慢性呼吸系统疾病发生急性呼吸衰竭最常见的诱因是
- A.呼吸道感染
B.吸烟
C.剧烈活动
D.电解质紊乱
E.营养不良
- 53.符合产后循环系统变化特征的是
- A.循环血容量于产后3天恢复至未孕状态
B.血小板数量减少
C.红细胞计数和血红蛋白值变化不大
D.白细胞于产褥早期较高
E.血液处于低凝状态,易出血
- 54.阑尾炎直接蔓延可引起急性盆腔炎,其主要病原体是
- A.淋病奈瑟菌
B.支原体
C.链球菌
D.结核杆菌
E.大肠埃希菌
- 55.子宫脱垂的主要病因是
- A.营养不良
B.盆底组织先天发育不良
C.长期站立工作
D.便秘或长期咳嗽等致腹压增力
E.分娩损伤
- 56.子宫颈癌普查常用的检查方法是
- A.阴道镜检查
B.宫颈脱落细胞学检查
C.宫颈活组织检查
D.诊断性刮宫
E.女性激素测定
- 57.判断心肌梗死最具敏感性和特异性的生化指标是
- A.肌钙蛋白
B.酸激酶
C.肌酸激酶同工酶
D.C反应蛋白
E.中性粒细胞
- 58.非特异性感染病理改变不包括
- A.炎症介质、细胞因子释放
B.血管通透性增加
C.血浆成分渗出
D.干酪样坏死
E.转为慢性炎症
- 59.不属于闭合性单根单处肋骨骨折治疗原则的是
- A.手术治疗
B.对症止痛

- C.固定胸廓
D.防止并发症
E.鼓励患者咳嗽咳痰
- 60.急性心肌梗死最基本的病因是
A.体力活动
B.情绪激动
C.血压剧升
D.冠状动脉张力增高
E.冠状动脉粥样硬化
- 61.慢性浅表性胃炎的最主要病因是
A.幽门螺杆菌感染
B.自身免疫
C.饮食和环境因素
D.十二指肠液反流
E.长期食用刺激性食物和药物
- 62.符合铁代谢特征的是
A.缺铁时正常肠黏膜对铁吸收减少
B.铁主要在回肠吸收
C.在肠黏膜内能合成铁蛋白
D.人体所需铁完全依靠从食物中摄取
E.血清铁一般是亚铁离子
- 63.急性白血病出血的主要原因是
A.弥散性血管内凝血
B.血小板数量减少
C.血小板功能异常
D.凝血因子减少
E.血管损伤
- 64.不符合糖尿病临床特征的是
A.糖尿病是一组常见的内分泌代谢疾病
B.糖尿病是由多种原因导致的,绝对或相对胰岛素分泌不足或作用的缺陷而引起的代谢紊乱
C.糖尿病特征为高血糖、糖尿、葡萄糖耐量降低及胰岛素释放试验异常
D.糖尿病可引起糖、蛋白质、脂肪、水及电解质等代谢紊乱
E.糖尿病是一种遗传病
- 65.与宫缩乏力导致的产后出血无关的因素是
A.巨大儿
B.双胎妊娠
C.胎膜早破
D.羊水过多
E.产程延长
- 66.有机磷农药中毒后,血液中胆碱酯酶活性
A.不变
B.升至正常人的70%以上
C.降至正常人的70%以下
D.升至正常人的90%以上
E.降至正常人的90%以下
- 67.微生态失衡会引起
A.自身和交叉感染
B.菌群失调和移位
C.定植抵抗力提高
D.内源性和外源性感染
E.非特异性免疫功能增强
- 68.不符合内脏性疼痛临床特点的是
A.疼痛过程缓慢、持续
B.痛感弥散,定位不准确
C.痛觉迟钝,对刺、割、灼等刺激不敏感
D.感觉敏锐,定位准确
E.对较强的张力及缺血、炎症等刺激较敏感
- 69.下肢深静脉血栓形成的原因之一是
A.吸烟
B.静脉腔狭窄
C.静脉内膜损伤
D.长久站立
E.大隐静脉曲张
- 70.良性前列腺增生好发于
A.外周区
B.移行区
C.中央区
D.纤维区
E.基质区
- 71.骨折早期并发症不包括

- A. 血管损伤
B. 内脏损伤
C. 脂肪栓塞
D. 畸形愈合
E. 神经损伤
72. 正常成人颅内压的范围是
A. 20~30 mmH₂O
B. 50~100 mmH₂O
C. 70~200 mmH₂O
D. 80~200 mmH₂O
E. 100~220 mmH₂O
73. 供移植器官的保存原则是
A. 常温保存
B. 低温原则
C. 延长热缺血时间
D. 变冷缺血为热缺血
E. 中断血流后不应立即降温
74. 新生儿低血糖的病因中属于葡萄糖消耗增加的是
A. 早产儿
B. Rh 溶血病患者
C. 小于胎龄儿
D. 败血症患儿
E. 先天性心脏病患儿
75. 猩红热的主要传染源是
A. 患者及带菌者
B. 恢复期患者
C. 链球菌携带者
D. 家畜
E. 蚊蝇
76. 中毒性痢疾多见于
A. 新生儿
B. 婴幼儿
C. 儿童
D. 青年
E. 成人
77. 卵子排出后如未受精, 黄体开始萎缩的时间是
A. 排卵后第 24 小时
B. 排卵后第 7 日
C. 排卵后 9~10 日
D. 排卵后 14 日
E. 下次月经来潮前
78. 符合产后泌乳特征的是
A. 雌激素是产后泌乳的基础
B. 产后雄激素水平急剧下降, 解除了对垂体催乳素的抑制作用
C. 雌磁素有抑制垂体催乳素对乳腺的发育作用
D. 乳汁的分泌很大程度上取决于哺乳时的吸吮刺激
E. 吸吮动作可以反射性地引起腺垂体释放缩宫素, 促进乳汁排出
79. 软产道裂伤多见于
A. 阴道手术操作不当
B. 胎盘植入
C. 凝血功能障碍
D. 软产道充分扩张
E. 产程延长
80. 青春期功能失调性子宫出血的主要发病机制是
A. 黄体功能不足
B. 缺乏雌激素的负反馈作用
C. 孕激素分泌不足, 导致子宫内膜分泌反应不良
D. 垂体分泌 FSH 相对不足, 无 LH 高峰, 卵巢不能排卵
E. 子宫内膜含有过多前列腺素
81. 患者, 女性, 37 岁。孕 1 产 0, 孕 14 周出现口渴多饮症状, 孕 24 周糖筛查血糖值为 10.5 mmol/L, 下一步检查为
A. 尿糖检测
B. 空腹血糖
C. OGTT
D. 尿酮体
E. 羊水穿刺

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(82~84 题共用备选答案)

- A. 第一心音
- B. 第二心音
- C. 第三心音
- D. 第四心音
- E. 杂音

82. 主动脉瓣肺动脉关闭时产生的振动音为

83. 二尖瓣和三尖瓣关闭时振动产生的为

84. 心室舒张早期血流自心房急流入心室使心室振动产生的为

(85~86 题共用备选答案)

- A. 病史
- B. 临床表现
- C. 脑脊液病原学检查
- D. 脑电图检查
- E. 头部 CT

85. 确诊化脓性脑膜炎的主要依据是

86. 确诊脑积水的主要依据是

(87~88 题共用备选答案)

- A. 正常
- B. 延长
- C. 减少
- D. 正常或增多
- E. 正常或减少

87. 特发性血小板减少性紫癜巨核细胞数目

88. 特发性血小板减少性紫癜白细胞数目

(89~90 题共用备选答案)

- A. 尿培养
- B. 痰培养
- C. 血培养
- D. 粪便培养
- E. 骨髓培养

89. 临床诊断败血症的重要方法是

90. 临床诊断白血病的重要依据是

(91~94 题共用备选答案)

- A. 大片炎症浸润影或实变影
- B. 肺蜂窝状肺脓肿
- C. 肺部多种形态浸润影,见于肺下野为
- D. 双肺弥漫性结节性浸润
- E. 肺下叶斑片状浸润

91. 军团菌肺炎 X 线所见是

92. 肺炎支原体肺炎 X 线所见是

93. 肺炎克雷伯杆菌肺炎 X 线所见是

94. 肺炎链球菌肺炎 X 线所见是

(95~96 题共用备选答案)

- A. 幼儿急疹
- B. 风疹
- C. 麻疹
- D. 水痘
- E. 猩红

95. 由带状疱疹病毒引起的疾病是

96. 发热 3~4 天出现斑丘疹,疹间皮肤正常,出疹后热度增高见于

(97~98 题共用备选答案)

- A. 高血压
- B. 低血压
- C. 呼吸道梗阻
- D. 头痛
- E. 全脊髓麻醉

97. 全麻时麻醉过深可能引起

98. 硬膜外麻醉最危险的并发症是

(99~100 题共用备选答案)

- A. 易复性疝
- B. 滑动性疝
- C. 难复性疝
- D. 嵌顿性疝
- E. 绞窄性疝

99. 疝内容物很容易纳入腹腔多见于

100. 疝内容物不能或不能完全回纳入腹腔内多见于

相关专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

1. 医院感染漏报调查年监测患者数及漏报率分别为

- A. 不少于 5%, 漏报率应低于 10%
- B. 不少于 10%, 漏报率应低于 10%
- C. 不少于 10%, 漏报率应低于 15%
- D. 不少于 10%, 漏报率应低于 20%
- E. 不少于 10%, 漏报率应低于 30%

2. 糖尿病病人学习皮下注射方法时, 常采用

- A. 无意模仿
- B. 有意模仿
- C. 强迫模仿
- D. 主动交往
- E. 被动交往

3. 计划工作中, 评估形势的主要内容

包括

A. 社会关系、社会经济、社会竞争、服务对象的需求

B. 社会需求、社会竞争、组织资源、社会

经济的需求

C. 社会竞争、社会关系、社会需求、服务对象的需求

D. 社会需求、社会竞争、组织资源、服务对象的需求

E. 社会需求、社会关系、社会竞争、组织资源的需求

4. 下列是协调活动的重要手段和依据准则的为

- A. 规章制度
- B. 行政法规
- C. 基本法
- D. 刑法
- E. 民法

5. 拉斯韦尔模式的正确表述是

A. 传者 → 信息 → 传播途径 → 受者 → 效果

B. 传者 → 传播途径 → 信息 → 效果 → 受者

C. 信息 → 传者 → 传播途径 → 受者 → 效果

D. 信息 → 传者 → 传播途径 → 效果 → 受者

E. 传者 → 信息 → 传播途径 → 效果 → 受者

6. 授权的步骤不包括

A. 选择授权对象

B. 明确授权内容

C. 形成沟通渠道

D. 实施授权计划

E. 排除被授权者的工作障碍

7. 医患关系要做到真诚相处, 最主要的是

A. 关系和谐

B. 尽职尽责

C. 平等相待

D. 互相尊重

E. 互相信任

8. 属于多线型组织结构的为

A. 直线型

B. 直线-参谋型

C. 职能型

D. 主导型

E. 综合型

9. 脓性指头炎若需要切开引流, 应采用

A. 鱼口状切开

B. 手指侧面纵切开

C. 手指掌面纵切开

D. 在波动明显处横行切开

- E.从原伤口处放射状切开
- 10.空气消毒不宜使用
- A.紫外线照射
- B.臭氧消毒
- C.甲醛熏蒸
- D.醋酸熏蒸
- E.过氧化氢喷雾消毒
- 11.肠道隔离使用的标志是
- A.黄色标志
- B.蓝色标志
- C.橙色标志
- D.红色标志
- E.棕色标志
- 12.健康教育的核心为
- A.促进人们自身护理能力和行为
- B.促进人们住院适应能力
- C.促进人们自我保健能力和行为
- D.促进人们的健康行为和生活方式
- E.帮助人们建立健康行为
- 13.领导效能的内容不包括
- A.时间效能
- B.用人效能
- C.决策办事效能
- D.组织整体贡献效能
- E.结构效能
- 14.三度原位菌群失调的主要原因为
- A.免疫功能降低
- B.大量应用广谱抗菌药物
- C.慢性病诱发
- D.插管或介入治疗
- E.细菌结构变化
- 15.护理部发现问题及时纠正,遵循的管理原则是
- A.整分合原则
- B.能级原则
- C.激励原则
- D.随机制宜原则
- E.反馈原则
- 16.从健康计划实施时开始,并贯穿于计划执行全过程的评价活动是指
- A.形成评价
- B.总结评价
- C.过程评价
- D.效应评价
- E.结局评价
- 17.不适宜血液病病区采用的空气净化方法是
- A.紫外线灯照射消毒
- B.化学消毒
- C.自然通风
- D.空气消毒器
- E.集中空调通风系统
- 18.不需要洗手的情况是
- A.护理两名病人之间
- B.穿隔离衣前
- C.给病人输液后,准备导尿管
- D.给病人伤口换药后
- E.与病人交谈后
- 19.吸毒行为应属于
- A.日常危害健康行为
- B.致病性行为模式
- C.不良疾病行为
- D.违规行为
- E.不良嗜好行为
- 20.不需进行消化道隔离的疾病是
- A.麻疹
- B.甲型肝炎
- C.脊髓灰质炎
- D.霍乱
- E.细菌性痢疾
- 21.以下可能导致偏倚的因素,哪项属于测量对象因素
- A.霍桑效应
- B.暗示效应
- C.评定错误
- D.干预组和对照组选择不均衡
- E.测量者成熟性
- 22.开放性肺结核应采取

- A.保护性隔离
B.血液隔离
C.呼吸道隔离
D.消化道隔离
E.抗酸杆菌隔离
- 23.直线参谋型组织结构的优点是
A.组织适应性好
B.组织反应灵敏
C.满足统一指挥和严格责任制要求
D.直线领导和职能部门职权明确
E.联系便捷,管理成本低
- 24.抗感染药物的作用机制不包括
A.抑制细菌核酸的合成
B.影响细菌细胞壁的合成
C.细菌缺乏药物的靶位点
D.干扰细菌蛋白质的合成
E.损伤细菌的细胞膜
- 25.不属于责任心差引起的护患冲突表现在
A.在班不在岗
B.在岗不尽责
C.医嘱执行不严格
D.查对不认真
E.知识有限
- 26.手术前预防性应用抗生素方法错误的是
A.术前 0.5~1 小时通过静脉给予一次足量抗生素
B.需有明确指征
C.总的预防用药时间不超过 24 小时
D.择期的结直肠手术前,还需通过导泻或灌肠进行肠道准备
E.污染手术使用万古霉素作为预防药物
- 27.通风的目的与哪项无关
A.调节室内温湿度
B.降低微生物密度
C.避免噪音的刺激
D.使患者心情舒畅
E.增加室内空气中含氧量
- 28.炭疽患者用过的治疗性废物和有机垃圾应
A.熟石灰浸泡消毒
B.丢弃
C.焚烧
D.过氧乙酸喷洒
E.深埋
- 29.医院的 I 类环境的空气消毒适用于
A.层流洁净手术室和层流洁净病房
B.产房、婴儿室、早产儿室
C.供应室无菌室
D.注射室、治疗室、换药室
E.急诊室、化验室及各类普通病房
- 30.美国管理学家莱金提出的 ABC 时间管理方法中,C 级目标指
A.必须完成的目标
B.最重要的目标
C.较重要的目标
D.很想完成的目标
E.不太重要的目标
- 31.门诊教育往往侧重于以下哪项的防治教育
A.危重疾病的教育
B.慢性病的教育
C.常见疾病的教育
D.发病机制的教育
E.传染性疾病的教育
- 32.组织或个人为了完成某一目标而制订具体行动方案称为
A.程序化决策
B.非程序化决策
C.目标决策
D.战略决策
E.战术决策
- 33.“鱼和熊掌不可兼得”属于
A.双趋式冲突
B.双避式冲突
C.趋避式冲突

- D.双趋双避式冲突
 E.多重趋避式冲突
- 34.用图形表示组织的整体结构、职权关系及主要职能,称为
- A.程序
 B.结构图
 C.规划图
 D.政策
 E.组织图
- 35.“动态”原理中管理工作动态特性是指
- A.稳定状态是相对的,运动状态是绝对的
 B.稳定状态是绝对的,运动状态也是绝对的
 C.稳定状态是绝对的,运动状态是相对的
 D.稳定状态是相对的,运动状态也是相对的
 E.稳定和运动状态的变化互不干扰
- 36.有效训导的方法错误的是
- A.用平等客观的态度对待下属
 B.对于反复发生的错误,逐步加重处罚
 C.批评对事不对人
 D.以行动强化语言
 E.提出防范错误的建议
- 37.关于抗菌药物的作用机制,错误的叙述是
- A.干扰细胞壁的合成
 B.抑制细菌芽孢生成
 C.抑制细菌核酸合成
 D.影响细菌蛋白质的合成
 E.损伤细胞膜
- 38.常规器械消毒灭菌合格率的评价属于
- A.基础质量评价
 B.服务质量评价
 C.环节质量评价
 D.综合评价
 E.终末质量评价
- 39.梅毒的病原体是
- A.奈瑟菌
 B.钩端螺旋体
 C.苍白螺旋体
 D.汉坦病毒
 E.人类乳头瘤病毒
- 40.四象限时间管理法的两个维度是指事情的
- A.战略性和战术性
 B.集体性和个人性
 C.时间性和紧迫性
 D.权威性和重要性
 E.重要性和紧迫性
- 41.不属于行政管理方法优点的是
- A.市管理系统达到高度统一
 B.利于对常规问题处理
 C.受决策者水平的限制
 D.保证整个系统计划、目标的实现
 E.灵活有效的解决各种例外问题
- 42.护理管理是现代医院管理的重要组成部分,其管理内容不包括
- A.角色管理
 B.组织管理
 C.人员管理
 D.业务管理
 E.质量管理
- 43.“霍桑实验”发现决定工作效率最重要的因素是
- A.人际关系
 B.严格的纪律
 C.统一的指挥
 D.科学的领导
 E.自我控制
- 44.不属于时间管理策略的是
- A.标准化消耗时间
 B.将一般事件安排在不干扰时间
 C.保持时间连续性
 D.充分利用最佳工作时间

- E.选择好的助手
- 45.经常出现的活动的决策是
- A.程序化决策
- B.非程序化决策
- C.战术决策
- D.不确定性决策
- E.确定性决策
- 46.护理组织文化建设不正确的是
- A.易接受性
- B.群众关注
- C.针对性
- D.独特性
- E.交流性
- 47.护理组织文化的核心是
- A.护理群体文化
- B.护理哲理
- C.社会文化
- D.护理价值观
- E.护理专业
- 48.不属于医院院外培训方法的是
- A.全脱产学习
- B.业余培训
- C.电视大学
- D.科室轮转
- E.自学高考
- 49.属于沟通过程中的一个步骤但却包括了信息沟通过程的几个环节的是
- A.信息源
- B.编码
- C.传递信息
- D.解码
- E.反馈
- 50.制定护理质量标准的原则不包括
- A.可衡量性原则
- B.科学性和先进性原则
- C.实用性原则
- D.严肃性和相对稳定性原则
- E.经济原则
- 51.“降低平均住院天数”属于评估指标分类中的
- A.年度评估指标
- B.质量评估指标
- C.差异度评估指标
- D.临床成果评估指标
- E.患者满意度评估指标
- 52.小组讨论是指在一位主持人的带领下,一小组人围绕某个主题进行座谈讨论。确保小组讨论效果的关键点不包括
- A.选择适当的主持人
- B.做好充分准备工作
- C.掌握小组讨论的技巧
- D.安排好小组人员座位排列
- E.现场提出讨论主题
- 53.影响传播效果的因素有多种,其中属于社会环境因素的是
- A.环境布置
- B.传播活动地点、场所
- C.相关的政策法规
- D.传播者的行为动机
- E.患者的心理需求
- 54.健康教育活动的目标是
- A.开展卫生宣传
- B.配合调查研究
- C.普及保健知识
- D.改善人类的健康相关行为
- E.实施系统的健康相关行为干预
- 55.下列不属于按教育目的分类的健康教育研究范畴的是
- A.营养健康教育
- B.生殖健康教育
- C.职业人群健康教育
- D.环境保护健康教育
- E.疾病防治健康教育
- 56.0~3岁时期,个体所处的行为发展阶段是
- A.初试发展阶段
- B.被动发展阶段
- C.主动发展阶段

- D. 自主发展阶段
E. 巩固发展阶段
57. 以下属于“日常危害健康行为”的是
A. 药物滥用
B. 讳疾忌医
C. 不遵医嘱
D. 缺乏体育锻炼
E. 违反法律法规
58. “您今天的气色好多了, 是吧?” 属于常见提问方式中的
A. 封闭式
B. 开放式
C. 复合式
D. 探索式
E. 偏向式
59. 选择健康传播途径的原则除准确性外还包括
A. 针对性、速度性、经济性
B. 科学性、速度性、经济性
C. 针对性、科学性、通用性
D. 速度性、通用性、经济性
E. 针对性、速度性、科学性
60. 关于健康教育计划目标的叙述, 下列错误的是
A. Who 是指对象
B. What 是指实现什么变化
C. When 是指在多长时间内实现这种变化
D. How much 是指有多少对象发生行为变化
E. Where 是指在什么范围内实现这种变化
61. 降低烟草的价格对吸烟行为来讲是一种
A. 倾向因素
B. 促成因素
C. 强化因素
D. 抑制因素
E. 强制因素
62. 为减少回归因素对评价结果正确性的影响, 可采用的方法是
A. 设立对照组
B. 重复测量
C. 抽样测量
D. 比较分析
E. 随机调查
63. 适度变化语音引起对方注意属于非语言传播技巧中的
A. 面部表情
B. 仪表形象
C. 动态语言
D. 同类语言
E. 体态语言
64. 医院感染学是研究医院感染
A. 发生、发展和控制的一门学科
B. 病原体特征的一门学科
C. 流行病学特征的一门学科
D. 管理制度建立和完善的一门学科
E. 控制措施的一门学科
65. 去污染就是人为地将机体的
A. 正常菌群或已定植的细菌部分去除
B. 正常菌群或已定植的细菌全部去除
C. 已定植的细菌部分或全部去除
D. 正常菌群部分或全部去除
E. 正常菌群或已定植的细菌部分或全部去除
66. ICU 最常见的条件致病菌是
A. 肺炎克雷伯菌
B. 大肠埃希菌
C. 铜绿假单胞菌
D. 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌
E. 洋葱伯克霍德菌
67. 医院感染暴发是指在某医院、某科室的住院患者中, 短时间内突然发生
A. 许多医院感染病例
B. 医院感染流行
C. 医院感染集中
D. 医院感染失控

- E. 医院感染蔓延
68. 手术器械和物品属于
- A. 消毒物品
- B. 无危险性物品
- C. 低度危险性物品
- D. 中度危险性物品
- E. 高度危险性物品
69. 腹腔镜使用前必须经过
- A. 清洁
- B. 消毒
- C. 减菌
- D. 灭菌
- E. 无害
70. 接触下列物品护士不需戴手套的是
- A. 患者的血液
- B. 患者的分泌物
- C. 患者的药物
- D. 患者的排泄物
- E. 污染的敷料
71. 下列属于决策步骤的是
- A. 列出对象
- B. 目标分类
- C. 追踪评价
- D. 排列顺序
- E. 分配时间
72. 护士长担任咨询、协调、激励者角色

的护理组织方式是

- A. 个案护理
- B. 功能制护理
- C. 小组护理
- D. 责任制护理
- E. 综合护理

73. 领导在日常工作中有权调度人、财、物、时间等,体现了领导的

- A. 管理权
- B. 决策权
- C. 决定权
- D. 用人权
- E. 指挥权

74. 各要素配置达到科学化、最优化的基本要求是

- A. 解决问题要注重根本
- B. 及时协调出现的问题
- C. 调动组织成员积极性
- D. 协调问题注意合理原则
- E. 协调过程要相互尊重

75. 实施护理质量控制应注意

- A. 检查标准应人性化
- B. 重视细节的控制
- C. 质量控制应具体化
- D. 控制方法应体现管理技巧
- E. 强调综合系统的控制

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

- (76~77 题共用备选答案)
- A. 护士工作兴趣与满意度高
- B. 责任护士技能水平要求高
- C. 患者安全感与归属感增强
- D. 所需要的人力物力费用高
- E. 护士责任职责明确,责任心增强

76. 责任制护理的优点是

77. 综合护理的优点是

(78~80 题共用备选答案)

- A. 吸烟
- B. 戒烟
- C. 及时就医
- D. 讳疾忌医
- E. 药物滥用

78. 属于保健行为的是

79. 属于不良疾病行为的是

80. 属于戒除不良嗜好行为的是

(81~85 题共用备选答案)

- A. 消化道隔离
 B. 呼吸道隔离
 C. 血液、体液隔离
 D. 接触隔离
 E. 严密隔离
81. 皮肤白喉采取的隔离是
 82. 腮腺炎采取的隔离是
 83. 艾滋病采取的隔离是
 84. 伤寒采取的隔离是
 85. 疟疾采取的隔离是
 (86~89 题共用备选答案)
- A. 5%
 B. 10%
 C. 50%
 D. 80%
 E. 90%
86. 下排式灭菌剂的装载量不得超过柜室内容积的
 87. 预真空灭菌剂的装载量不得超过柜室容积的
 88. 预真空灭菌剂的装载量不得小于柜室容积的
 89. 脉动真空灭菌剂的装载量不得小于柜室容积的
 (90~91 题共用备选答案)
- A. 2 小时
 B. 4 小时
 C. 12 小时
 D. 24 小时
 E. 48 小时
90. 医疗机构发生 5 例以上疑似医院感染暴发事件的报告时限为
 91. 医疗机构发生 10 例以上的医院感染暴发事件的报告时限为
 (92~93 题共用备选答案)
- A. 个案护理
 B. 功能制护理
 C. 小组护理
 D. 责任制护理
 E. 综合护理
92. 由一名护理人员在当班期间承担一名患者所需要的全部护理, 被称为
 93. 由一组护理人员应用护理程序的工作方法, 共同完成对一组患者的护理工作, 被称为
 (94~96 题共用备选答案)
- A. 肯定性反馈
 B. 否定性反馈
 C. 模糊性反馈
 D. 动态体语
 E. 仪表形象
94. 护士小王在和患者交谈中, 适时插入了一些“是的”“很好”等语言或点头、微笑等非语言形式给予对方肯定和鼓励, 对患者的言行表示了赞同和支持, 小王在交谈中的反馈行为属于
 95. 当小王发现患者的言行不正确时, 她应当使用的恰当反馈形式是
 96. 在交谈中, 小王以关注的眼神注视患者, 表示在专心倾听对方的话, 小王的交流行为属非语言交流中的
 (97~98 题共用备选答案)
- A. 先天性
 B. 习得性
 C. 偶然性
 D. 一致性
 E. 可控性
97. 属于促进健康行为的特点是
 98. 属于危害健康行为的特点是
 (99~100 题共用备选答案)
- A. 食用生的污染贝类
 B. 直接接触有传染性的分泌物感染
 C. 破损的皮肤接触被病原菌污染的物品感染
 D. 输血感染
 E. 吸入被病原菌污染的空气感染
99. 淋病的传播途径是
 100. 炭疽的传播途径是

专业知识

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这母所属的方框涂黑。

- 1.膀胱癌最常见和最早出现的症状是
 - A.膀胱刺激症状
 - B.腹部肿块
 - C.血尿
 - D.排尿困难
 - E.尿线变细
- 2.肩关节脱位特有的体征是
 - A.肩部肿胀
 - B.肩部外展障碍
 - C.方肩畸形
 - D.肩部内收障碍
 - E.肩部压痛
- 3.处理急性尿潴留最常用的治疗方法是
 - A.留置导尿
 - B.膀胱造瘘
 - C.膀胱穿刺
 - D.尿道扩张
 - E.前列腺切除
- 4.肺结核患者手术适应证为
 - A.经内科治疗后长期排菌者
 - B.肺结核正在扩展期或处于活动期
 - C.心肺代偿能力差
 - D.肺切除后严重影响呼吸功能者
 - E.合并其他脏器结核的患者
- 5.开放性气胸患者呼吸困难最主要的急救措施是
 - A.吸氧
 - B.输血补液
 - C.气管插管行辅助呼吸
 - D.立即剖胸探查
 - E.迅速封闭胸部伤
- 6.脑动静脉畸形患者描述不正确的是
 - A.最常见的首发症状是意识障碍、头痛、呕吐
 - B.由于畸形血管破裂致脑内、脑室内和蛛网膜下腔出血而出现相关症状
 - C.检查患者有运动、感觉、视野以及语言、功能障碍
 - D.较常见的症状是癫痫,均在颅内出血时发生,不可单独出现
 - E.脑血管造影是确诊本病的必需手段
- 7.急性颅内高压早期生命体征改变的特点是
 - A.血压升高,脉搏慢,呼吸慢
 - B.血压下降,脉搏细速
 - C.血压升高,呼吸不规则
 - D.血压升高,脉搏加快
 - E.血压下降,脉搏慢,呼吸慢
- 8.肝癌实验室检查项目中,最常用和最有价值的是
 - A. γ -谷氨酰转肽酶
 - B.血清碱性磷酸酶
 - C.岩藻糖苷酶
 - D.甲胎蛋白
 - E.癌胚抗原
- 9.关于阿米巴性肝脓肿叙述正确的是
 - A.起病急,病程短
 - B.肝大常显著,可有局限性隆起
 - C.脓液多为白色,恶臭
 - D.多见于肝左外叶,常多发
 - E.手术引流是其唯一有效的治疗方法
- 10.引起“肾前性肾功能衰竭”的病因是
 - A.挤压综合征
 - B.感染性休克
 - C.大面积烧伤
 - D.手术误扎双侧输尿管
 - E.缺水、血容量减少
- 11.腹部手术 3~4 日最常见的并发症有

- A.切口感染
 B.切口裂开
 C.肺不张
 D.急性胃扩张
 E.下肢深静脉血栓形成
- 12.肾移植术后最常见的造成患者死亡最主要的并发症是
- A.感染
 B.术后出血
 C.血肿
 D.尿瘘
 E.消化道出血
- 13.预防无菌切口感染的主要措施为
- A.皮下止血不能用电烙
 B.血管结扎要用细丝线
 C.严格遵守无菌技术
 D.手术完毕时用等渗盐水冲洗切口
 E.切口内安放引流
- 14.深Ⅱ度烧伤局部损伤的深度达
- A.真皮浅层,部分生发层健在
 B.表皮层,生发层健在
 C.真皮深层,有皮肤附件残留
 D.脂肪层
 E.脂肪下层
- 15.毒蛇咬伤后现场急救的方法是
- A.向肢体近心端方向挤压伤口
 B.在咬伤肢体近侧关节下方近创口处用止血带缚扎
 C.抬高上肢,迅速转运
 D.将上肢浸入冷水(4~7℃)3~4小时后用冰袋
 E.立即彻底清创,截除被咬伤的上肢
- 16.乳腺癌在病理上恶性程度最大的是
- A.腺样囊性癌
 B.乳头湿疹样癌
 C.炎性乳腺癌
 D.导管内癌
 E.小叶原位癌
- 17.腹外疝嵌顿是指
- A.所有不能回纳的腹外疝
 B.内容物与疝囊粘连的腹外疝
 C.疝囊颈弹性收缩将内容物卡住的腹外疝
 D.肠管成疝囊一部分的腹外疝
 E.所有回纳后又复发的腹外疝
- 18.血栓闭塞性脉管炎的早期最主要的临床表现是
- A.患肢肌肉萎缩
 B.患肢趾甲生长缓慢增厚变形
 C.间歇性跛行
 D.持续性静息痛
 E.足背动脉搏动消失
- 19.血栓闭塞性脉管炎,坏疽期的典型体位为
- A.间歇性跛行
 B.静息痛,喜平卧
 C.屈膝抱足,彻夜难眠
 D.静息痛,喜运动
 E.屈膝抱腹,彻夜难眠
- 20.急性肠梗阻患者采取非手术治疗时,正确的措施为
- A.去枕平卧位
 B.胃肠减压
 C.及早进食
 D.吗啡镇痛
 E.高压灌肠
- 21.在我国引起急性胰腺炎最常见的原因是
- A.胆总管末端梗阻和胆汁逆流
 B.饮酒
 C.流行性腮腺炎
 D.穿透性消化性溃疡
 E.胰腺外伤
- 22.外科急腹症中最常见的是
- A.急性胰腺炎
 B.急性胆囊炎
 C.急性肠梗阻
 D.急性阑尾炎

- E.急性胃十二指肠穿孔
- 23.结肠癌最早出现的症状是
- A.腹部肿块
- B.全身症状,如贫血、消瘦、低热等
- C.肠梗阻症状
- D.排便习惯与粪便性状的变化
- E.阵发性呕吐
- 24.胃、十二指肠溃疡并发症中必须采取外科手术的是
- A.应激性溃疡
- B.瘢痕性幽门梗阻
- C.胃后壁溃疡
- D.溃疡病出血
- E.溃疡病穿孔
- 25.腹部实质性脏器破裂最主要的临床表现是
- A.肠麻痹
- B.胃肠道症状
- C.全身感染症状
- D.内出血征象
- E.腹膜刺激征
- 26.肝、脾破裂首选的辅助检查措施是
- A.B超检查
- B.CT检查
- C.淀粉酶测定
- D.立位X线检查
- E.MRI检查
- 27.颅内压增高的重要客观体征是
- A.头痛
- B.呕吐
- C.视乳头水肿
- D.咳嗽
- E.失明
- 28.小脑幕切迹疝时肢体活动障碍的特点是
- A.病变对侧上肢瘫痪同侧下肢瘫痪
- B.病变同侧上肢和对侧下肢瘫痪
- C.病变对侧肢体瘫痪
- D.病变同侧肢体瘫痪
- E.四肢瘫痪
- 29.开颅术后脑脊液持续脑室外引流,要求引流管开口高于侧脑室平面多少厘米,以维持正常的颅内压
- A.5~10
- B.10~15
- C.15~20
- D.20~25
- E.25~30
- 30.各型肺癌预后最差的是
- A.小细胞肺癌
- B.鳞癌
- C.腺癌
- D.大细胞癌
- E.鳞癌和腺癌
- 31.主动脉关闭不全时主要引起
- A.右心室压力负荷过重
- B.左心室容量负荷过重
- C.左心室压力负荷过重
- D.右心室容量负荷过重
- E.心肌代谢障碍
- 32.髋关节后脱位的畸形是
- A.短缩,屈曲,外展,内旋
- B.短缩,屈曲,外展,外旋
- C.短缩,屈曲,内收,内旋
- D.短缩,后伸,内收,外旋
- E.短缩,后伸,内收,内旋
- 33.嗜铬细胞瘤最适宜的治疗方法是
- A.介入治疗
- B.手术切除
- C.消融治疗
- D.药物治疗
- E.放疗
- 34.表现为尿频、尿急、排尿终末疼痛和里急后重的结石类型是
- A.肾盂结石
- B.膀胱结石
- C.输尿管上段结石
- D.输尿管末端结石

- E. 输尿管中段结石
35. 高血压脑出血治疗原则不包括
- A. 急性期酌情卧床休息或床边行走
- B. 止血、脱水、降低全身血压及颅内压等治疗
- C. 病情仍继续加重者, 应考虑手术治疗
- D. 常用手术方法有开颅血肿清除并行减压术
- E. 常用手术方法包括颅骨钻孔血肿穿刺吸除术
36. 外科感染最严重的症状是
- A. 局部红、肿、热、痛、功能障碍
- B. 周围淋巴细胞肿大
- C. 脉速、乏力、食欲缺乏
- D. 感染性休克
- E. 毒血症
37. 吗啡属于
- A. 解热抗炎镇痛药
- B. 麻醉性镇痛药
- C. 催眠镇静药
- D. 抗癫痫药
- E. 抗抑郁药
38. 等渗性脱水的治疗方法是
- A. 利用高渗盐水补充血容量
- B. 利用等渗盐水补充血容量
- C. 利用低渗盐水补充血容量
- D. 利用晶体和胶体溶液补充血容量
- E. 利用胶体溶液补充血容量
39. 患者, 女性, 近1周尿量 3 500 mL/d, 体重减轻, 血钾 3.3 mol/L, 血钠 127 mol/L, 此患者处于肾衰竭的
- A. 无尿期
- B. 少尿期
- C. 多尿期
- D. 多尿期后期
- E. 恢复期
40. 患者, 男性, 25岁。因“急性阑尾炎”收入院, 行阑尾切除术, 术后患者主诉疼痛, 最佳的止痛方案是
- A. 口服法
- B. 肌肉注射
- C. 连续静脉滴注
- D. 静脉单次给药
- E. PCA
41. 患者, 男性, 56岁。进食油炸面片、炸糕后, 突然出现右上腹阵发性绞痛, 右上腹可触及肿大的胆囊, Murphy征阳性, B超提示胆囊增大, 囊壁增厚, 可见结石影像, 可初步诊断为
- A. 急性胆管炎
- B. 胆管结石
- C. 急性胆囊炎
- D. 胆囊结石
- E. 慢性胆囊炎
42. 患者, 男性, 80岁。高热、寒战, 诊断为急性梗阻性化脓性胆管炎。该患者首选治疗方案为
- A. LC
- B. 开腹胆囊切除
- C. ERCP
- D. PTCD
- E. 胆总管切开取石
43. 患者, 男性, 70岁。肠梗阻术后因全身情况差, 留置深静脉管道给予肠外营养, 伤口愈合情况尚可, 术后第8日出现高热, 次日出现血压下降, 脉率慢, 观察患者神志清楚, 腹软, 皮肤干燥、潮红, 手足温暖, 此时应首先考虑
- A. 深静脉置管感染
- B. 腹腔感染
- C. 肠痿
- D. 出血
- E. 肺部感染
44. 患者, 女性, 28岁。胃大部切除术后4天, 体温 38.5℃, 切口疼痛, 应考虑
- A. 外科手术热
- B. 切口感染
- C. 腹腔感染

D.肺部感染

E.膈下脓肿

45.患者,男性,48岁。头部外伤,伤口出血,经自己在家中简单包裹,来院急诊,到医院时已是伤后12小时。检查头顶伤口6cm深达皮下,创口整齐较清洁,未见其他异物。以下处理不妥的是

A.清创后伤口开放

B.TAT注射

C.用抗生素

D.伤口分帽状腱膜及皮肤两层缝合

E.定期复查

46.患者,女性,30岁。右肾结核,已无功能,左肾轻度积水,功能尚可,膀胱容量正常,肺部有浸润性肺结核。目前对患者最恰当的治疗措施是

A.抗结核治疗

B.右肾切除

C.右肾部分切除

D.左肾造瘘

E.右肾造瘘

47.患儿,男,13岁。突然高热,持续4天不退,伴大腿外上方疼痛和肿胀。检查:体温39.5℃,脉率120次/分,一般情况尚可,左大腿上段肿胀,该处外侧压痛最严重,但无波动感。血白细胞计数 $19.5 \times 10^9/L$,中性粒细胞0.83,X线摄片无改变。考虑可能是

A.风湿热

B.尤因肉瘤

C.骨结核继发感染

D.骨巨细胞瘤

E.急性化脓性骨髓炎

48.患者,男性,50岁。橡胶厂职工,出现无痛性肉眼血尿2个月余,且呈全程血尿。查体无异常,尿中找到癌细胞。对诊断最有意义的检查是

A.KUB平片

B.腹部X线摄片

C.肾动脉造影

D.膀胱镜检查

E.排泄尿路造影

49.患者,男性,29岁。体重60kg,烧伤面积为60%,7小时后入院,经注射吗啡,头孢类抗生素和生理盐水1000mL,仍有休克,应考虑为

A.神经性休克

B.感染性休克

C.心源性休克

D.低血容量性休克

E.中毒性休克

50.患者,男性,30岁。车祸致左肋部伤并脾破裂,急诊入院,血压75/55mmHg,神志清楚,但表情淡漠,脉率120次/分,口渴,面色苍白,估计出血量达

A.400~500mL

B.600~700mL

C.800~1600mL

D.1700~2400mL

E.>2400mL

51.患者,男性,45岁。腹胀呕吐已半年,多于午后发作,吐出隔夜食物,吐量较大,吐后舒服,由于长期呕吐除脱水外还会造成

A.低钾、高氯性碱中毒

B.低钾、低氯性碱中毒

C.低钾、低氯性酸中毒

D.高钾、低氯性酸中毒

E.高钾、低氯性碱中毒

52.患者,男性,35岁多。因车祸导致双下肢挤压伤,第2天统计24小时尿量为200mL,下列化验结果不符合肾衰竭的是

A.血钾5mmol/L

B.尿素氮14.2mmol/L

C.血镁1.4mmol/L

D.血磷0.89mmol/L,血钙2.96mmol/L

E.血浆肌酐106mmol/L

53.患者,男性,24岁。不慎跌入80℃

热水池内,池水淹没臀部,初步估计烫伤面积为

- A.30%~35%
- B.35%~40%
- C.40%~45%
- D.45%~50%
- E.>60%

54.患者,男性,60岁。车祸造成多发性损伤,急救人员首要处理的问题是

- A.开放性骨折
- B.腹部外伤后肠管脱出
- C.外伤性大出血
- D.颅脑外伤
- E.膀胱破裂

55.患者,男性,47岁。因“肺癌”入院,拟行肺部分切除术加术后放疗。术后放疗过程中出现白细胞降至 $2\ 500/\text{mm}^3$,首先应

- A.暂停放疗
- B.少量输血
- C.加强营养
- D.减少放射量
- E.服用生血药物

56.患者,男性,30岁。左前胸刀刺伤1小时,查体:烦躁不安、皮肤苍白湿冷、呼吸困难、脉细弱、颈静脉怒张、血压 $70/50\text{ mmHg}$ 。最可能的诊断是

- A.心脏压塞
- B.肋骨骨折
- C.左侧进行性血胸
- D.左侧张力性气胸
- E.心脏大血管破裂

57.患者,男性,46岁。近日出现低热、食欲下降、消瘦等症状,结核菌素试验阳性,应考虑的诊断是

- A.肺癌
- B.非良性肿瘤
- C.肺结核
- D.肺炎

E.肺囊肿

58.患者,男性,57岁。主诉尿频、尿淋漓半年余,偶尔伴有血尿。直肠指诊触及前列腺高低不平的坚硬结节,可初步诊断为

- A.尿道狭窄
- B.前列腺炎
- C.良性前列腺增生
- D.前列腺癌

E.膀胱颈纤维性挛缩

59.术后第5日,患者体温升高至 $38.5\text{ }^\circ\text{C}$,自述切口疼痛加重,切口局部出现红肿、热、痛,局部按压有波动感,敷料被黄色渗出液浸湿,现阶段较为合适的处理方法为

- A.局部理疗、热敷
- B.大剂量应用抗生素
- C.督促手术医生严格无菌操作
- D.切口局部消毒

E.拆除部分缝线,敞开伤口

(60~61题共用题干)

患者,男性,50岁。因频繁呕吐、腹泻1天入院。入院查体:神志清楚,口唇干燥,眼窝内陷,患者主诉原体重为63 kg;入院后测体重减轻3 kg,抽血测得血清钠 156 mmol/L 。

60.估计体内失液总量约力

- A.3 400 mL
- B.3 800 mL
- C.4 200 mL
- D.4 600 mL
- E.5 000 mL

61.当日补液量应为

- A.5 000 mL
- B.4 500 mL
- C.4 000 mL
- D.3 500 mL
- E.3 000 mL

(62~63题共用题干)

患者,女性,65岁。蛛网膜下腔阻滞麻醉下行膝关节置换术,麻醉穿刺成功注射药液后,立即出现血压下降。

62.分析其原因是

- A.麻醉平面过高
- B.交感神经阻滞
- C.副交感神经阻滞
- D.麻醉平面过低
- E.中枢交感神经介质释放减少

63.给予吸氧,加快输液速度等处理措施后患者血压仍无明显好转,并又出现恶心、呕吐,提示

- A.脑缺氧
- B.胃反流
- C.肠梗阻
- D.麻醉药物过量
- E.胸段脊神经阻滞

(64~67 题共用题干)

患者,男性,69岁。因头痛、头晕、右半身麻木无力2个月,呕吐2天入院。4年前发现血压高,服药可降至正常。体检:神清,血压正常,眼底视乳头模糊不清,视乳头水肿。右面部感觉减退,双眼展神经轻度麻痹,右口角力弱,右侧肢体不全瘫,右侧病理反射阳性。胸片示右肺第2肋间可见阴影

- 64.本例患者考虑有
- A.左大脑中动脉闭塞
 - B.脑干缺血性病灶
 - C.高血压脑出血
 - D.颅内压增高
 - E.脑萎缩

65.为明确诊断,首选的检查是

- A.脑血管造影
- B.头部CT或MRI
- C.脑超声波
- D.腰穿
- E.胸部CT

66.检查发现有颅内占位性病变,病变周围水肿明显,且中线移位 $>0.5\text{ cm}$ 。应首先考虑的诊断为

- A.慢性硬脑膜下血肿
- B.脑出血

- C.脑转移瘤
- D.脑脓肿
- E.原发性颅内肿瘤

67.此时最有效的处理措施是

- A.持续腰穿引流
- B.使用脱水药
- C.开颅病灶切除
- D.过度换气
- E.去骨片减压术

(68~69 题共用题干)

患者,女性,68岁。跌倒后造成左股骨颈骨折,行走困难,被收入院。

68.该患者此时患肢的表现是

- A.外旋缩短畸形
- B.内收外旋畸形
- C.外展外旋畸形
- D.内收内旋畸形
- E.无明显畸形

69.该患者接受人工股骨头置换术,术后卧床期间患肢正确的活动方法是

- A.直腿抬高
- B.保持患肢外旋中立位
- C.可以进行患肢内收活动
- D.尽早练习伸屈膝关节
- E.股四头肌等长收缩

(70~71 题共用题干)

患者,女性,44岁。患腰椎间盘突出症5年;经卧硬板床和骨盆牵引等保守治疗无效。现症状逐渐加重,行走100~200米即出现下肢疼痛,须休息或下蹲数分钟才能缓解,入院准备接受手术治疗

70.该患者术后第1天可以进行的功能锻炼是

- A.三点式支撑法
- B.四点式支撑法
- C.五点式支撑法
- D.直腿抬高
- E.头、上肢及背部后伸

71.此锻炼方式最主要的目的是为了

预防

- A. 神经根粘连
- B. 血肿形成
- C. 骨质疏松
- D. 伤口感染
- E. 肌肉萎缩

(72~73 题共用题干)

患者,男性,67 岁。因腹痛、腹胀、呕吐、停止排气排便 24 小时来医院就诊。查体:生命体征正常,患者急性病容,眼窝凹陷,皮肤弹性差,全腹胀隆,可见肠型和蠕动波,脐区压痛,但无腹肌紧张和反跳痛,肠鸣音活跃,有气过水声。实验室检查:血红蛋白、红细胞计数和红细胞比容均升高,血清钾 2.4 mmol/L,半年前曾做过胃部分切除术。

72. 根据患者的病情可判定为

- A. 血运性肠梗阻、单纯性
- B. 粘连性肠梗阻、单纯性
- C. 低钾血症、麻痹性肠梗阻
- D. 绞窄性肠梗阻
- E. 输入段肠梗阻

73. 下列措施作为最后考虑的是

- A. 禁食水
- B. 胃肠减压
- C. 应用抗生素
- D. 纠正水电解质失衡
- E. 手术治疗

(74~76 题共用题干)

两公共汽车相撞,发生严重事故,现场汽车内乘客伤情各异,有的大喊大叫,有的呻吟,有的不响不动。

74. 在现场抢救中不妥的是

- A. 抢救人员奔向大喊大叫者
- B. 对伤口进行初步检查
- C. 有伤口出血应初步止血
- D. 伤口初步包扎
- E. 有内脏脱出的暂不还纳

75. 将伤员全部清理之后,首先要处理的是

- A. 股骨干闭合性骨折
- B. 髌关节脱位
- C. 大面积软组织挫伤
- D. 开放性气胸
- E. 肩类节脱位

76. 出血量最大的是

- A. 股骨干骨折
- B. 髌关节脱位
- C. 大面积软组织挫伤
- D. 骨盆骨折
- E. 肩关节脱位

(77~79 题共用题干)

患者,男性,15 岁。2 个月前偶然发现右肱骨上端一圆形硬性肿块,不活动,边界清楚,右上肢活动轻度受限。

77. 此患者可能诊断是

- A. 关节脱位
- B. 骨结核
- C. 骨软骨瘤
- D. 骨肉瘤
- E. 软组织挫伤

78. 该肿瘤好发的部位是

- A. 骨干
- B. 骨干骺端
- C. 骨骺
- D. 骨端
- E. 骨髓

79. 该病正确的治疗是

- A. 无需治疗
- B. 化疗
- C. 肿块切除
- D. 截肢术
- E. 彻底刮除并植骨

(80~81 题共用题干)

患者,男性,25 岁。车祸伤 4 小时。查体:脉搏 130 次/分,血压 86/60 mmHg。烦躁不安,严重呼吸困难,皮肤湿冷,左颈胸部皮下捻发感,左肺呼吸音消失。胸片示左肺完全萎陷。

80.急救处理是

- A.抗休克
- B.气管插管
- C.高流量吸氧
- D.呼吸机辅助呼吸
- E.左侧胸膜腔穿刺

81.经急救处理,病情好转后又迅速恶化。此时治疗应立即

- A.气管切开
- B.清除呼吸道分泌物
- C.左胸膜腔闭式引流
- D.静脉快速输血补液
- E.多头胸带包扎固定胸壁

(82~83 题共用题干)

患儿,男性,11岁。主诉左膝部剧痛伴高热入院,1周前因猩红热治疗好转。现有

以下症状:左股骨下端剧痛,体温 39.5℃,脉快,重症病容,白细胞 $2.0 \times 10^9/L$,膝关节不肿胀,X线片骨质未见异常。

82.该患儿最可能的诊断是

- A.急性风湿热
- B.急性骨髓炎
- C.膝关节结核
- D.尤因肉瘤
- E.蜂窝组织炎

83.对该患儿治疗恰当的是

- A.立即手术
- B.膝关节穿刺
- C.绝对卧床休息
- D.退烧后可立即停药
- E.早期应用广谱、联合、大剂量有效抗生素

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方格涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(84~85 题共用备选答案)

- A.抑制 α 受体
- B.抑制 β 受体
- C.抑制 5α 还原酶
- D.抑制 H_2 受体
- E.抑制雄性激素受体

84.特拉唑嗪治疗前列腺增生的机制是

85.非那雄胺治疗前列腺增生的机制是

(86~89 题共用备选答案)

- A.头痛、呕吐、视乳头水肿
- B.血压升高、脉搏呼吸变慢
- C.头痛呕吐颈项强直,生命体征紊乱,早期出现呼吸改变而意识瞳孔改变较晚
- D.头痛呕吐意识障碍,病变同侧瞳孔散大伴对侧瘫痪
- E.对侧肢体偏瘫

86.小脑幕切迹疝表现为

87.颅内压增高三主征为

88.Cushing 综合征表现为

89.枕骨大孔疝表现为

(90~91 题共用备选答案)

- A.抑制甲状腺激素分泌
- B.抑制甲状腺激素的合成
- C.抑制甲状腺激素的释放
- D.抑制外周组织对甲状腺激素反应
- E.抑制交感神经的兴奋,使心率减慢

90.硫氧嘧啶类药物治疗甲亢的作用是

91.术前遵医嘱口服碘剂的作用机制是

(92~94 题共用备选答案)

- A.胆石症
- B.急性胰腺炎
- C.十二指肠溃疡
- D.输尿管结石
- E.脾破裂

92.脐周出现蓝色改变(Cullen 征)多见于

93.最常致出血性休克的是

94.疼痛常放射至右肩背部的是

(95~97 题共用备选答案)

- A.体外冲击波碎石

- B. 输尿管肾镜取石
 - C. 输尿管肾镜碎石
 - D. 经皮肾镜取石
 - E. 输尿管切开取石
95. 小于 2.5 cm 的结石最适宜
96. 大于 2.5 cm 的肾盂结石最适宜
97. 肾积水严重感染的输尿管结石患者适宜
- (98~100 题共用备选答案)

- A. 动、静脉损伤
 - B. 周围神经损伤
 - C. “方肩”畸形
 - D. 缺血性骨坏死
 - E. 损伤性骨化
98. 肘关节脱位可能并发
99. 股骨颈骨折可能发生
100. 肩关节脱位时可出现



专业实践能力

一、以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应这字母所属的方框涂黑。

- 1.对呼吸性酸中毒的临床表现描述正确的是
- A.心肌收缩性增强
B.心肌自律性增高
C.微动脉对儿茶酚胺的反应性增高
D.脑血管扩张
E.脑内氨基丁酸减少
- 2.ARDS 患者使用呼吸机辅助呼吸时,预防感染的正确措施是
- A.仅在操作后认真洗手
B.仅在操作前认真洗手
C.气管插管每周更换位置
D.气管切开处每周严格换药一次
E.定期更换或消毒呼吸机管路及接触呼吸道的设备
- 3.甲状腺大部切除患者术后出现严重抽搐时,应立即给予
- A.多吃肉、蛋白、乳品
B.10%葡萄糖酸钙静脉缓慢注射
C.口服维生素 D₃
D.口服乳酸钙
E.口服二氢速变固醇
- 4.患者,男性,6 小时前提重物时,右侧斜疝嵌顿,提示疝内容物已发生缺血性坏死,应做好急诊术前准备的临床表现是
- A.疝块增大,不能还纳
B.局部有剧烈疼痛
C.疝块紧张发硬,有触痛
D.阵发性腹痛伴呕吐
E.全腹有压痛,肌紧张
- 5.为预防胰腺癌术后肺部并发症,术前准备及健康指导不包括
- A.戒烟 2 周
B.抗生素使用
C.教会患者胸式呼吸
D.给予雾化吸入
E.加强营养
- 6.在护理骨折行骨牵引的患者时,如牵引过度可引起
- A.骨愈合障碍
B.肌肉萎缩
C.肢体畸形
D.剧烈疼痛
E.骨质脱钙
- 7.Colles 骨折复位后,早期固定于
- A.腕中立位
B.腕屈桡偏位
C.腕屈尺偏位
D.腕仰尺偏位
E.腕伸尺偏位
- 8.引起高镁血症的常见原因不包括
- A.肾功能不全
B.烧伤
C.广泛性损伤
D.应激反应
E.甲状旁腺功能亢进
- 9.对代谢性酸中毒的临床表现描述不正确的是
- A.呼吸深快
B.血压轻度下降
C.心跳减弱
D.反应迟钝,嗜睡
E.面部肌肉抽动
- 10.肾结核患者行肾部分切除术后,护理措施错误的是
- A.观察尿量及性质
B.鼓励患者多饮水
C.及早下床活动

- D.继续使用抗结核药物
E.保持引流通畅
- 11.患者,男性,39岁。施行“结肠癌根治术”后回到病房,其意识已清醒,无恶心呕吐,无休克,宜采取的体位是
- A.平卧位
B.头低脚高位
C.高半坐卧位
D.低半坐卧位
E.侧卧位
- 12.肠梗阻患者肠已经坏死,而且病情严重,可行
- A.肠切除、肠吻合术
B.非手术治疗
C.肠造口术
D.短路术
E.开腹探查,冲洗引流术
- 13.开放性气胸引起急性循环功能紊乱的主要原因是
- A.血容量不足
B.伤侧负压消失
C.伤侧肺被压缩
D.心脏受压
E.纵隔扑动,静脉血回流受阻
- 14.石膏绷带包扎固定技术中,错误的是
- A.包扎时宜用手指扶托石膏型
B.包扎时宜用手掌按抚妥帖
C.包扎时松紧适宜,每周重叠1/3
D.包扎时先固定远端,随后向近端缠绕
E.包扎时应露出远端指(趾)
- 15.骨关节结核术前护理不妥的是
- A.加强全身支持性治疗
B.有窦道者使用抗生素至少1周
C.使用抗结核药物至少3个月
D.有窦道者应做好周围皮肤护理
E.有效的患肢制动
- 16.巨大疝修补术后患者护理错误的是
- A.及时处理便秘
B.切口部位压沙袋
C.咳嗽时注意保护切口
D.术后3个月内避免重体力劳动
E.鼓励患者早期下床活动
- 17.成人麻醉前禁食的最适宜时间为
- A.术前4~6小时
B.术前6~8小时
C.术前2~4小时
D.术前8~12小时
E.术前12~24小时
- 18.全麻术后未清醒患者,最适宜的体位是
- A.仰卧位
B.平卧位头偏向一侧
C.头低足高位
D.侧卧位
E.半坐卧位
- 19.对于术后尿潴留患者,首先应采取的处理措施为
- A.在严格无菌操作下,进行导尿
B.肌注卡巴胆碱0.25 mg
C.诱导患者自行排尿
D.下腹部热敷
E.针刺治疗
- 20.术后发生深静脉血栓,其处理措施不正确的是
- A.患肢抬高
B.禁忌经患肢静脉输液
C.勤按摩
D.溶栓治疗
E.抗凝治疗
- 21.关于软组织闭合性创伤的护理正确的是
- A.局部制动,患肢应与心脏在同一水平
B.局部热敷,以促进炎症消散
C.为缓解疼痛,应注意先选用夹板、绷带等固定,而后采取手术复位
D.对挤压伤病人应警惕有无急性肾衰竭表现
E.血肿较大者立即切开引流
- 22.应鼓励进行早期活动的是
- A.心衰患者

- B.存在严重感染
C.深静脉血栓形成
D.大出血
E.肺不张
- 23.破伤风患者早期作气管切开的指征是
- A.呼吸中枢麻痹,呼吸困难
B.肺部感染
C.抽搐频繁不易用药物控制
D.吞咽困难,食物误咽
E.胸腹肌强直,呼吸受限
- 24.大面积烧伤患者休克期口渴时,可给予
- A.大量冷开水
B.少量多次盐开水
C.大量橘子水
D.大量糖水
E.大量茶水
- 25.抗休克纠正组织低灌注和缺氧的关键是
- A.积极治疗原发病
B.纠正酸中毒
C.补充血容量
D.应用血管扩张剂改善微循环
E.抗凝治疗解除微细血栓
- 26.初期复苏中口对口人工呼吸时,表示吹气有效的是
- A.每次吹气量很大
B.吹气频率很快
C.吹气时见到胸廓有明显起伏
D.吹气均匀
E.吹气时无漏气
- 27.肝癌患者行肝叶切除手术后 24 小时活动的原则是
- A.绝对制动
B.卧床休息,不鼓励早期活动
C.早期活动以利于胃肠功能恢复
D.禁止咳嗽
E.平卧,以利于减轻腹痛
- 28.肝癌患者肝叶切除手术后 24 小时内

重点观察的并发症是

- A.肺部感染
B.肝脓肿
C.酸中毒
D.出血
E.腹腔感染
- 29.甲状腺功能亢进患者术前需用碘剂准备者,下列正确的是
- A.每日 3 次,首日每次由 3 滴开始,逐日每次增加 1 滴至每次 16 滴维持此剂量
B.每日 3 次,首日每次由 5 滴开始,逐日每次增滴至每次 25 滴维持此剂量
C.每日 3 次,首日每次由 6 滴开始,逐日每次增加 1 滴至每次 30 滴维持此剂量
D.每日 3 次,首日每次由 7 滴开始,逐日每次增加 1 滴至每次 35 滴维持此剂量
E.每日 3 次,首日每次由 8 滴开始,逐日每次增加 1 滴至每次 40 滴维持此剂量
- 30.关于呼吸机与患者呼吸不同步的原因,下列哪项错误
- A.呼吸道分泌物过多
B.过度镇静
C.疼痛
D.尿潴留或尿滞留
E.通气不当
- 31.对腹部闭合性损伤伴休克,腹腔穿刺抽出粪性液体的患者应
- A.立即手术探查
B.先纠正休克,必须等休克好转后才能施行手术
C.积极治疗休克,在抗休克的同时进行手术探查
D.胃持续减压、输液、应用大剂量抗生素
E.严密观察腹部情况 12 小时后再考虑手术治疗
- 32.为防治门静脉高压症患者发生食管胃底静脉曲张破裂出血,分流手术前准备的正确措施为
- A.食物应加热后给予,不食冷食

- B.口服片剂宜整粒服用,不宜磨碎
 C.术前常规留置胃管
 D.避免劳累及恶心、呕吐、便秘等使腹内压增高的因素
 E.术前行肥皂水灌肠
- 33.胃、十二指肠溃疡合并幽门梗阻手术治疗前,正确的处理是
 A.输液输血纠正营养不良
 B.输液输血纠正低氯、低钾性中毒
 C.禁食、禁饮 1 周
 D.术前后用温盐水洗胃 1 次
 E.术前 1 周反复温盐水洗胃
- 34.腹部损伤行腹腔穿刺时,抽出不凝血,应考虑
 A.空腔脏器破裂
 B.实质性脏器破裂
 C.后腹膜血肿
 D.误穿入腹腔血管
 E.前腹壁血肿
- 35.颅内压增高头痛的特点是
 A.夜间轻
 B.喷嚏时减轻
 C.咳嗽时减轻
 D.低头时减轻
 E.晨起较重
- 36.关于慢性硬脑膜下积液引流术后正确的护理措施是
 A.清醒后给予半卧位
 B.健侧卧位以利于引流
 C.引流瓶应低于创腔 60 cm
 D.术后不使用强力脱水药
 E.应严格限制水分摄入
- 37.颅脑手术后护理体位正确的是
 A.小脑幕上开颅术后取患侧卧位或仰卧位
 B.小脑幕上开颅术后取健侧卧位或俯卧位
 C.小脑幕下开颅术后取患侧卧位或俯卧位
 D.小脑幕下开颅术后取健侧卧位或仰

- 卧位
 E.小脑幕下开颅术后取侧卧位或侧俯卧位
- 38.闭式胸膜腔引流的护理,错误的是
 A.注意无菌操作
 B.确保管道密封
 C.妥善固定
 D.注意水柱波动
 E.搬运患者时水封瓶应高于胸腔引流口
- 39.心导管及造影等特殊检查时正确的护理措施是
 A.导管拔除后穿刺部位按压止血 60 分钟
 B.导管拔除后穿刺部位沙袋压迫 12 小时
 C.为预防血栓形成需长期口服抗凝药
 D.严密观察穿刺肢体肤色
 E.导管拔除后穿刺部位沙袋压迫 18 小时
- 40.若患者上臂石膏内的局部皮肤疼痛,有腐臭气味,主动和被动伸指功能正常,应考虑石膏内可能出现了
 A.压疮
 B.肢体肿胀
 C.皮肤湿疹
 D.血栓性静脉炎
 E.肢体血运障碍
- 41.患者,女性,62 岁。肺癌,行同步放化疗,化疗药为长春新碱,注射时护士采取的给药途径正确的是
 A.静脉推注,药液稀释后更换小针头,不再排气
 B.肌肉注射
 C.输液通畅后给予药液
 D.静脉点滴,并准确掌握滴速
 E.采用滴管的侧孔冲入药液
- 42.患者,男性,39 岁。健康体检时发现 AFP 400 μ /L。腹部 B 超:肝右叶占位性病变,大小约 9.4 \times 7.2 cm。该患者最危险的并

发症是

- A.肝癌破裂出血
- B.肝肾综合征
- C.肝性脑病
- D.肝癌继发感染
- E.肺转移

43.患者,男性,40岁。因左肾结石行ESWL,5天后排出2枚米粒大小结石。经分析为胱氨酸结石,预防结石复发的措施中不当的是

- A.控制尿路感染
- B.多喝水
- C.多运动
- D.酸化尿液
- E.碱化尿液

44.患者,女性,21岁。瘦弱,腰部疼痛,活动受限,脊椎腰1处后凸畸形。右侧腹股沟区有脓肿,穿刺抽出灰白色脓液。考虑可能的诊断是

- A.脊椎结核
- B.脊椎肿瘤
- C.化脓性骨髓炎
- D.腹腔结核
- E.髌关节结核

45.患者,女性,39岁。因尿毒症行血液滤过,护理措施不正确的是

- A.准确记录出入量,量出为入
- B.监测出凝血时间,避免发生出血
- C.固定好动静脉插管,避免脱出
- D.血滤置管处每周换药一次
- E.预防性使用抗生素

46.患者,男性,18岁。建筑工人,施工时被倒塌的水泥预制板砸伤,右下肢伤口处皮肤肿胀、发白、紫红色、轻压伤口处皮肤周围有捻发感,该患者可能感染

- A.金黄色葡萄球菌
- B.破伤风杆菌
- C.铜绿假单胞菌
- D.产气荚膜梭菌
- E.结核杆菌

47.患者,女性,27岁。体检发现右侧乳房外上象限有一直径5cm大小肿块,质硬、界限不清、不光滑,尚可推动;同侧腋窝有2个淋巴结肿大,质硬,能推动。细针穿刺细胞学检查发现有癌细胞,临床诊断为“右侧乳腺癌”,出院前进行健康指导,告知患者预防复发最重要的措施是

- A.5年内避免妊娠
- B.参加体育活动,增强体质
- C.定期到医院复诊
- D.加强营养
- E.定期自我检查乳房

48.脓胸患者,55岁。脓腔内液体出现液平面应考虑伴发

- A.肺不张
- B.气胸
- C.血胸
- D.食管瘘
- E.气管瘘

49.患者,男性,55岁。进食后出现胸骨后针刺样疼痛和停滞感2个月,饮水后可缓解,锁骨上未触及淋巴结。食管吞钡X线造影可见食管中段约2cm黏膜粗糙,充盈缺损,考虑诊断为

- A.早期食管癌
- B.晚期食管癌
- C.贲门失弛缓症
- D.食管息肉
- E.腐蚀性食管灼伤

50.患者,男性,65岁。进行性排尿困难4年,夜尿4~5次/天,B超示前列腺增生,残余尿测定约80mL,推荐的治疗措施为

- A.导尿
- B.药物治疗
- C.TURP
- D.膀胱造瘘
- E.激光治疗

51.患者,男性,36岁。胆源性胰腺炎反复发作数次,为预防胰腺炎再次发作,护士对患者最有意义的指导是

- A. 注意个人卫生
 B. 服用抗生素
 C. 治疗胆道疾患
 D. 服用胰酶抑制剂
 E. 控制血糖
52. 患者, 男性, 72 岁。脓胸, 行胸膜腔闭式引流的患者, 下床活动时, 引流瓶应低于
- A. 胸壁引流口平面 30 cm
 B. 胸壁引流口平面 50 cm
 C. 膝关节
 D. 大腿
 E. 髌关节
53. 患者, 女性, 28 岁。做家务时突然发生右下腹痛 3 小时, 辗转不安, 伴恶心、呕吐, 近年来有多次类似发作史。查体: 腹柔软, 右下腹深压痛。尿常规: 白细胞少数, 红细胞(+++)。该患者可初步诊断为
- A. 急性阑尾炎
 B. 急性胰腺炎
 C. 输尿管结石
 D. 绞窄性肠梗阻
 E. 机械性肠梗阻
54. 患者, 男性, 40 岁。心肺复苏术后体温 39.8 °C, 准备给予冰帽及使用恒温毯降温, 此时应立即使用的药物为
- A. 地塞米松
 B. 丙泊酚
 C. 20% 甘露醇
 D. 硫喷妥钠
 E. 氢化可的松
55. 患者, 男性, 44 岁。扩大胰十二指肠术后, 深静脉置管, 鼻胃管、鼻空肠管及胃造瘘管, 现为术后第 3 天, 最好采取何种方式增加营养
- A. 静脉滴注高糖、脂肪乳剂及氨基酸
 B. 全营养混合液(TNA)
 C. 鼻胃管滴注营养液
 D. 胃造瘘管注入营养液
 E. 鼻空肠管滴注营养液
56. 患者, 女性, 70 岁。Miles 术后 7 天拆线, 拆线后剧烈咳嗽, 突然出现切口疼痛, 切口处流出 100 mL 淡红色液体, 此时患者可能发生了
- A. 手术后出血
 B. 切口感染
 C. 切口裂开
 D. 切口血肿
 E. 切口脂肪液化
57. 患者, 男性, 58 岁。腹胀、肛门停止排气排便 2 天, 3 年前曾因胃溃疡行胃大部切除术。查体: 腹部叩诊鼓音, 肠鸣音 12 次/分钟, 有气过水声, 为明确诊断, 首选的检查方法是
- A. 腹部 X 线摄片
 B. 腹部 CT 检查
 C. 纤维胃镜检查
 D. 诊断性腹腔穿刺
 E. 腹部 B 超
58. 患者, 男性, 41 岁。饮酒后上腹部剧痛 12 小时, 伴有恶心、呕吐, 疼痛向右肩部放射。查体: 上腹部压痛、反跳痛明显, Murphy 征(-), 肠鸣音消失。为明确诊断首选的化验检查是
- A. 血常规检查
 B. 尿常规检查
 C. 肝功能检查
 D. 血淀粉酶含量测定
 E. 血中胆红素测定
59. 患者, 男性, 31 岁。有胃溃疡穿孔修补术史, 3 天前出现腹痛、腹胀伴呕吐, 肛门停止排便排气, 经检查诊断为肠梗阻, 现最重要的是应了解。
- A. 梗阻的原因
 B. 梗阻的部位
 C. 梗阻的程度
 D. 梗阻的发生速度
 E. 梗阻是否绞窄
60. 患者, 女性, 10 岁。被载重汽车砸伤左大腿, 出血 2 小时。左下肢剧痛, 不敢活

动。检查:神志清,表情淡漠,面色苍白,脉搏细弱,大腿中段皮肉裂开,骨端外露。应考虑合并有

- A. 血管损伤
- B. 神经损伤
- C. 创伤性休克
- D. 脂肪栓塞
- E. 挤压综合征

(61~63 题共用题干)

患者,男性,74 岁。无痛间歇性血尿 2 年,反复左肋部剧痛 3 个月,膀胱镜检查膀胱侧壁三角区散在菜花状肿瘤带蒂,左输尿管口喷血。

61. 该患者首先应考虑的诊断

- A. 肾盂癌
- B. 膀胱癌
- C. 膀胱癌加肾癌
- D. 肾癌
- E. 膀胱癌加肾盂癌

62. 该患者首先应选用的辅助检查方法为

- A. CT
- B. 肾盂造影+膀胱造影
- C. 尿脱落细胞检查
- D. B 超
- E. 腹部平片

63. 该患者应采用的手术方案是

- A. 膀胱部分切除术
- B. 膀胱全切术
- C. TUPBT
- D. 根治性左肾切除术
- E. 左肾输尿管全切膀胱部分切除术

(64~65 题共用题干)

患者,女性,56 岁。有高血压史,不规律服药,与人争吵时突发剧烈头痛,言语不清,一侧肢体麻木无力,很快出现意识障碍,大小便失禁,被家属立即送往医院。

64. 应首先考虑诊断为

- A. 高血压脑出血
- B. 脑梗死

C. 右额占位

D. 垂体瘤

E. 小脑占位

65. 入院后相关护理描述不正确的是

- A. 入院后立即备皮,做好术前准备
- B. 术后全麻未醒的患者应给予仰卧位
- C. 密切观察患者生命体征及意识变化
- D. 术后 24 小时待患者意识清醒,吞咽反射恢复后方可进流质饮食
- E. 昏迷患者或后组脑神经麻痹者,吞咽、咳嗽反射差,呼吸道分泌物不易排出易发生肺炎

(66~68 题共用题干)

患者,男性,45 岁。行“全麻下胃大部切除术”后被送回病房。监测患者意识清醒, T 37.8℃, P 95 次/分, R 24 次/分, BP 140/90 mmHg。患者出现呼吸困难,呼吸有鼾声,继而出现鼻翼扇动、三凹征。

66. 应考虑患者发生了

- A. 急性肺炎
- B. 上呼吸道梗阻
- C. 下呼吸道梗阻
- D. 支气管痉挛
- E. 肺不张

67. 可能导致此并发症的原因是

- A. 舌后坠
- B. 气管导管扭折
- C. 严重感染
- D. 麻醉药导致呼吸抑制
- E. 气管导管过长紧贴气管壁

68. 预防和处理该并发症的措施不包括

- A. 及时清除咽喉分泌物或异物
- B. 轻度喉头水肿者给予糖皮质激素
- C. 喉痉挛者必要时行气管内插管
- D. 舌后坠者迅速将下颌托起,放入口咽或鼻咽通气管
- E. 立即静注支气管解痉剂

(69~70 题共用题干)

患者,男性,35 岁。在工作中右手中指和示指被机器压断。

69.此时急救措施中正确的是

- A.将机器倒转,拉出断肢
- B.止血带扎紧断肢近端不能放松
- C.现场即应用干净清水冲洗断肢
- D.保存时离断肢体应与冰块直接接触
- E.无菌敷料包裹断肢后放入清洁塑料袋内,再放入带冰块的容器中

70.断肢运送到医院后,处理措施中正确的是

- A.生理盐水灌注断肢
- B.冲洗后内用无菌干纱布,外用湿纱布包好断肢
- C.包好的断肢先放入无菌容器中,再放入冰箱中冷藏
- D.断肢应放入冰箱冷冻保存
- E.两断指可装在同一袋中保存

(71~72 题共用题干)

患者腹部手术后 6 小时,表情痛苦,心率加快,血压升高,多次询问后患者主诉伤口疼痛严重。

71.此时应首先给予的措施是

- A.鼓励患者忍受疼痛
- B.立即给予止痛药
- C.给予止痛指导
- D.继续观察
- E.分散患者注意力

72.若给该患者止痛治疗,首选药物为

- A.咪达唑仑
- B.盐酸曲马朵缓释片
- C.丙泊酚
- D.可待因
- E.吗啡

(73~74 题共用题干)

患者,女性,20 岁。1 周前不慎被铁钉扎伤右脚,伤口已愈合,现出现肌肉持续性收缩,呈苦笑面容,颈项强直,以破伤风收入院。

73.该患者护理措施中不妥的是

- A.所有敷料及器械需专用
- B.保持病房安静

C.加强安全防护,防止患者坠地

- D.可适当使用镇静药物
- E.尽量使用药物控制,不可做气管切开

74.对该患者的病房要求,不正确的是

- A.隔离病房
- B.保持室内阳光充足
- C.温度及湿度适宜
- D.操作时动作应轻
- E.床边应备齐急救药品和仪器

(75~77 题共用题干)

刘某,因交通事故致伤昏迷,3 小时后入院,患者处于昏迷状态,呼之不应,但按压眶上神经有反应,左侧瞳孔散大,对光反射迟钝。入院第 2 天,血压 150/100 mmHg,脉搏缓慢有力,呼吸深而慢,时而躁动、呕吐,按压眶上神经无反应,左侧瞳孔散大,对光反射消失,右侧肢体瘫痪,病理反射阳性。

75.该患者的主要病症最可能是不列哪项

- A.颅前窝骨折
- B.脑挫裂伤继发颅内血肿
- C.脑震荡
- D.颅中窝骨折
- E.颅后窝骨折

76.对该患者的护理措施欠妥的是

- A.密切观察生命体征、瞳孔等变化
- B.取平卧位头偏向一侧以防止误吸
- C.持续留置导尿
- D.保持大便通畅以防用力排便导致颅内压增高
- E.配备吸痰器、气管切开等抢救用物

77.若进行手术治疗,则手术后护理正确的是

- A.高渗性脱水药加 20% 甘露醇 250 mL 要在 1 小时内快速静脉滴注
- B.冬眠疗法可先用物理降温,再遵医嘱静滴冬眠药物
- C.冬眠疗法降温速度以每小时下降 2℃ 为宜
- D.脱水治疗期间不需记录出入液量

E.防止压疮、呼吸道和泌尿道感染等并发症

(78~80 题共用题干)

患儿,6岁。左臂肱骨髁上骨折后行石膏管型固定,3小时后出现手部苍白、发凉,桡动脉搏动减弱,不让人碰右手手指,一碰即大哭不止。

78.此时应警惕该患儿是否出现了

- A.压疮
- B.石膏综合征
- C.化脓性皮炎
- D.骨折断端移位
- E.骨筋膜室综合征

79.在确诊后,对此并发症最有效的处理措施是

- A.给予止痛剂
- B.应用脱水剂
- C.患肢功能锻炼
- D.松解石膏或切开减压
- E.伤口换药和皮肤护理

80.若该并发症不能及时有效处理,最可能导致患者出现

- A.关节僵硬
- B.骨化性肌炎
- C.缺血性肌挛缩
- D.缺血性骨坏死
- E.创伤性关节炎

(81~82 题共用题干)

患者,男性,58岁。有慢性支气管炎病史20年,已并发肺气肿。今晨因用力大便后感右胸口疼痛,伴干咳、呼吸困难,并渐

出现发绀,体检见气管明显向左移位。

81.此时患者最确切的诊断是

- A.合并气胸
- B.急性心肌梗死
- C.急性右心衰竭
- D.急性呼吸窘迫综合征
- E.合并胸腔积液

82.此患者病变部位的叩诊音为

- A.清音
- B.浊音
- C.鼓音
- D.实音
- E.浊、实音

(83~84 题共用题干)

患者,男性,42岁。乘车时右腿搁在左腿上,突然刹车时右膝受撞击致右髌疼痛不能活动,6小时后送来医院就诊,查体见患肢缩短,右髌屈曲、内收、内旋畸形。

83.应首先考虑的诊断是

- A.右髌关节脱位
- B.左髌关节脱位
- C.股骨颈骨折
- D.右髌关节脱位并右膝损伤
- E.骨盆骨折

84.该患者复位固定4周后,扶双拐下地活动,需多长时间后才能完全承重

- A.1周后
- B.2周后
- C.3个月后
- D.4个月后
- E.5个月后

二、以下提供若干组考题,每组考题共同在考题前列出A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与考题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(85~86 题共用备选答案)

- A.病灶清除术
- B.开窗引流术
- C.切开引流术
- D.窦道切除术

E.骨钻孔引流术

85.慢性骨髓炎死骨形成,出现红、肿、热、痛,应采用

86.慢性骨髓炎有死骨及窦道,骨包壳已形成,应采用

(87~88题共用备选答案)

- A. 进食、胃肠减压
- B. 抗生素
- C. 胰酶抑制剂
- D. 生长抑素
- E. 激素

87. 具有抑制胰腺外分泌作用的药物是

88. 具有抑制胰液分泌作用的措施是

(89~91题共用备选答案)

- A. 屈曲、内收、内旋和短缩畸形
- B. 屈曲、外展、外旋
- C. 屈曲、短缩、内收、外旋
- D. 肘后三角关系失常
- E. 方肩畸形

89. 股骨颈骨折患肢出现

90. 髋关节脱位患侧下肢出现

91. 股骨干上1/3段骨折,近端出现

(92~94题共用备选答案)

- A. 三腔管压迫
- B. 肝固有动脉结扎胆总管引流
- C. 胃大部切除
- D. 肝叶切除
- E. 肝固有动脉结扎

92. 门静脉高压合并食管胃底曲张静脉破裂出血采用

93. 肝癌出血不能切除时采用

94. 肝左外叶严重撕裂伤时采用

(95~96题共用备选答案)

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 主动脉瓣关闭不全

C. 主动脉窦瘤破裂

D. 心室间隔缺损

E. 主动脉瓣狭窄

95. 患者,男性,62岁。自幼发现心脏杂音,3个月前出现心前区疼痛和晕厥,检查发现升主动脉扩张,最大可能是

96. 患儿,男,6岁。胸痛,气短,查体发现胸骨左缘第二肋间连续性机器样杂音。该患儿出现高热不退,血培养阳性,胸骨左缘3~4肋间舒张期杂音,可能存在

(97~98题共用备选答案)

- A. 压力性尿失禁
- B. 充溢性尿失禁
- C. 神经性尿失禁
- D. 麻痹性尿失禁
- E. 痉挛性尿失禁

97. 前列腺肥大引起尿液外溢多为

98. 中年经产妇,咳嗽时引起尿液外溢多为

(99~100题共用备选答案)

A. 石膏固定后最严重的并发症

B. 石膏固定局部压迫,水疱破溃后形成

C. 大量钙盐从骨骼中进入血液,并从肾中排出

D. 若上腹部包裹过紧,进食后可呕吐胃内容物

E. 长期固定肢体后,关节内外组织发生纤维粘连,同时关节囊和周围肌肉挛缩

99. 石膏综合征为

100. 骨筋膜室综合征为



考前点睛班