

## 2020 年初级护师考试 13 日考题汇总（网友回忆版）

77.初产妇，妊娠 40 周临产。。。。。5 小时。阴道检查：宫口开大 6cm，头位。先露-1，

胎膜存。产妇目前处于

- A.第三产程
- B.。。。。
- C.正常潜伏期
- D.第二产程
- E.正常活跃期

78.患者男，50 岁。餐后上腹部烧灼痛 2 个月，黑便 2 日入院。对其诊断最有价值的辅助检

查是

- A.胃液分析检查
- B.选择性动脉造影
- C.X 线检查
- D.胃镜检查
- E.血常规检查

79.患者男，49 岁。因近期头晕、乏力，连续 3 天血压 160~170/95~100mmHg 而院。

患者同时患有支气管哮喘。不宜使用的降压药物是

- A.卡托普利
- B.呋塞米
- C.硝苯地平
- D.阿替洛尔

E. 哌唑嗪

81. 下列甲状腺功能基本筛选试验时的辅助检查，不受外来碘干扰，甲亢时增高的是

A. 基础代谢率 (BMR)

B. 促甲状腺激素释放激素 (TRH) 试验

C. 促甲状腺激素测定 (TSH)

D. 血清总 T<sub>3</sub>、总 T<sub>4</sub> (TT<sub>3</sub>, TT<sub>4</sub>)

E. 血清游离 T<sub>4</sub> (FT<sub>4</sub>)

82. 急性感染性多发性神经根神经炎患者脑脊液的典型改变是

A. 蛋白细胞分离

B. 氯化物减少

C. 均匀血性

D. 压力增高

E. 糖明显增多

83. 10 个月女婴，高热 40°C，剧咳，分泌物粘稠，不易咳出，伴喘憋、青紫。最紧急的处理是

A. 吸痰

B. 鼻导管间歇给氧

C. 肌注苯巴比妥

D. 人工冬眠疗法

E. 正压给氧

相关专业知识

10. 自我监测胎儿安危最适宜的方法是

A. 定期查尿妊娠试验

B. 胎动计数

金英杰教育

- C.尿雌三醇测定
- D.胎心电子监护
- E.自测宫高和腹围

11.患者女，29岁，患支气管扩张10年，咳嗽、咳脓性痰，痰量50ml/d。下列处理不正确的是

- A.长期应用抗生素
- B.体位引流
- C.给予祛痰剂
- D.给予雾化吸入
- E.加强营养

12.患者女，60岁。子宫脱垂I度轻型，下列治疗原则正确的是

- A.增强腹压
- B.使用子宫托
- C.放射治疗
- D.加强运动
- E.手术治疗

13.开放性气胸急救处理的首要措施是

- A.胸腔穿刺术
- B.吸氧、输血、输液
- C.清创缝合术
- D.用厚敷料封闭伤口
- E.胸腔闭式引流术

14.患者女，20岁。3月前，因情绪过激后出现全身抽搐，口吐白沫，呼之不应，持续3分钟后抽搐停止，约半小时恢复意识。近期情绪不稳，反复出现2次抽搐而入院。患者每次发作抽搐约2~

4分钟，神经系统检查未见异常。为明确诊断首要的辅助检查是

- A.脑MRI
- B.脑血流图
- C.脑CT
- D.神经肌电图
- E.脑电图

15.导致肝硬化的因素不包括

- A.胆汁淤积
- B.丙型肝炎
- C.酒精中毒
- D.乙型肝炎
- E.甲型肝炎

16.患儿男，2岁，重度营养不良，清晨起床后突然大汗，面色苍白，体温下降，

神志不清，脉搏减慢，对其进行急救处理应选择静脉推注

- A. 葡萄糖
- B. 甘露醇
- C. 生理盐水
- D. 肾上腺素
- E. 葡萄糖酸钙

17. 应用地西洋控制小儿惊厥的最佳给药途径是

- A. 保留灌肠
- B. 雾化吸入
- C. 肌肉注射
- D. 静脉注射
- E. 静脉输液

18. 慢性盆腔炎术后第 1 天，患者宜取的体位是

- A. 侧卧位
- B. 头低脚高位
- C. 半卧位
- D. 平卧位
- E. 俯卧位

19. 小儿肥胖症饮食管理中不正确的是

- A. 少食多餐
- B. 高糖类
- C. 低脂肪
- D. 不吃零食
- E. 高蛋白质

20. 患者女，26 岁，诊断为系统性红斑狼疮，双面颊和鼻梁有紫红色蝶形红斑，表面光滑，有时可见鳞屑，皮肤护理措施不正确的是

- A. 禁忌日光浴
- B. 保持皮肤的清洁卫生
- C. 碱性肥皂水洗脸
- D. 避免使用化妆品
- E. 出门穿长袖衣裤

21. 冠心病外科治疗必须进行的辅助检查是

- A. 心脏 CT
- B. 心导管检查
- C. 心脏彩色 B 超
- D. 心血管造影
- E. 选择性冠状动脉造影

22. 在临床麻醉中应用最广泛的全身麻醉方式是

金英杰教育

- A. 静脉麻醉
- B. 静脉复合麻醉
- C. 表面麻醉
- D. 吸入麻醉
- E. 椎管内麻群

23. 门静脉吻合术的主要目的是

- A. 降低门静脉压力
- B. 改善肝功能
- C. 消除脾功能亢进
- D. 阻断侧支循环
- E. 减少腹水形成

24. 患儿 3 个月。近 2 日发生腹泻，大便每日 5~6 次，呈黄绿色稀便，内有奶瓣和泡沫，为防止患儿发生 应选择

- A. 静脉补充 10% 葡萄糖溶液
- B. 静脉补充林格液
- C. 少量多次给予米汤
- D. 少量多次喂服 ORS
- E. 少量多次饮温开

【答案】D

25. 患者女，停经 9 周，少量阴道流血 3 天，无腹痛。子宫符合孕月，宫口未开，B 超检查：宫内妊娠。可见胎心搏动，入院后主要的治疗原则是

- A. 尽快清宫
- B. 间断吸氧
- C. 止血补血
- D. 预防感染
- E. 保胎治疗

【答案】E

26. 患者女，38 岁。5 年前曾患过肺结核，近 3 个月来常感腰背部疼痛，时有低热、盗汗。体检：胸 11~12 棘突明显压痛。为确诊应进行的检查是

- A. 血沉
- B. OT 试验
- C. X 线
- D. CT
- E. 血常规

【答案】C

27. 关于对 ARDS 患者的治疗原则，不正确的叙述是

- A. 加强营养支持
- B. 加大补液量

- C.使用有效抗生素
- D.延长机械通气时间
- E.选用呼气末正压通气

【答案】B

28.肝性脑病患者并发上化道出血时应避免输入的血液制品为

- A.血小板
- B.血浆
- C.白蛋白
- D.新鲜血
- E.库存血

【答案】E

29.感染性休克治疗中，应用血管扩张药前最重要的是

- A.调整体位
- B.纠正酸碱失衡
- C.控制感染
- D.控制原发病
- E.补充血容量

【答案】E

30.患者，男，36岁，严重贫血及皮肤广泛瘀斑，最有助于确诊的检查是

- A.骨髓象
- B.B超
- C.CT
- D.尿化验
- E.大便潜血

【答案】A

31.患者男，48岁。因煤气中毒6小时后入院，深昏迷，休克，尿少，血COHb 60%，血压80/50mmHg，诊断为一氧化碳中毒。该患者的中毒类型为

- A.重度中毒
- B.慢性中毒
- C.原发性脑病
- D.中度中毒
- E.轻度中毒

【答案】B

32.肾病综合征的临床表现不包括

- A.高度水肿
- B.血脂低
- C.高血压
- D.高蛋白尿
- E.低蛋白血症

【答案】D

33.程度最轻的意识障碍是

- A.昏睡
- B.嗜睡
- C.昏迷
- D.谵妄
- E.意识模糊

【答案】E

34.患者女，经产妇，39岁。1年来月经量增多，经期持续4~14天。检查：子宫如孕3个月大小，凹凸不平，双附件无异常，血红蛋白90g/L。诊断为子宫肌瘤，恰当的处理为

- A.手术治疗
- B.随访观察
- C.中药治疗
- D.激素治疗
- E.放射治疗

【答案】A

35.乳房皮肤容易出现“橘皮样”改变的乳腺疾病是

- A.乳腺癌
- B.乳房纤维腺瘤
- C.乳房肉瘤
- D.急性乳腺炎
- E.乳房囊性增生

【答案】A

1.妊娠期糖尿病的产妇，孕期使用胰岛素者，分娩后如需继续使用，应减少胰岛素的用量到原用量的

- A.2/3
- B.1/3
- C.1/4
- D.1/5
- E.1/6

答案：B

2.大咯血患者发生窒息时，首要的护理措施是

金英杰教育

www.jinyingjie.com

- A.给予输血
- B.保持气道通畅
- C.给予吸氧
- D.给予止血
- E.应用呼吸机

答案：B

3.下列提高妊娠率的措施中，错误的是

- A.性交时避免精神紧张
- B.性交后立即如厕
- C.性交后适当抬高臀部
- D.排卵期增加性交次数
- E.注重营养，增强体质

答案：B

4.关于非特异性感染患者的健康教育，错误的是

- A.保持皮肤清洁
- B.防止皮肤损伤
- C.处理原发病
- D.治疗相关的全身性疾病
- E.经常应用抗生素预防感染

答案：E

5.肺癌的早期表现是

- A.刺激性咳嗽，痰中带血

- B.持续性胸痛
- C.声音嘶哑
- D.Homer 征
- E.胸腔积液

答案：A

6.消化性溃疡患者出现全腹压痛、反跳痛及板样强直，应考虑

- A.食管静脉破裂
- B.癌变
- C.穿孔
- D.幽门梗阻
- E.出血

答案：C

7.阴道内大量豆腐渣样白带可见于

- A.滴虫阴道炎
- B.霉菌阴道炎
- C.宫颈炎
- D.老年阴道炎
- E.盆腔炎

答案：B

8.颅内高压三主征是

- A.头痛、呕吐、视神经乳头水肿
- B.呕吐、视神经乳头水肿、抽搐

- C.视神经乳头、水肿、抽搐
- D.抽搐、昏迷、头痛
- E.昏迷、头痛、呕吐

答案：A

10.正确的成人胸外心脏按压深度为

- A.3cm-4cm
- B.4cm-5cm
- C.5cm-6cm
- D.6cm-7cm
- E.7cm-8cm

答案：C

50.患儿女，3月龄。足月顺产，生后无窒息，母乳喂养。生后第3天出现黄疸至今未退，呈逐渐加重趋势，大便为灰白色，全身皮肤呈黄绿色。患儿最可能为

- A.母乳性黄疸
- B.药物性黄疸
- C.慢性溶血性疾病
- D.先天性胆道闭锁
- E.乙型肝炎

答案：D

52.患者女，60岁。甲状腺肿大20年，下列与压迫邻近组织无关的症状是

- A.头面部瘀血
- B.咳粉红色泡沫痰

C.声音听哑

D.呼吸的难

E.吞咽闲难

答维：B