

一、A1/A2 型题

1.肌肉注射用连线法取得注射部位是（）

A.髂骨上棘和尾骨连线的外上 1/3 处

B.髂骨上棘和尾骨连线的外上 1/2 处

C.髂骨上棘和尾骨连线的外中 1/3 处

D.髂骨上棘和尾骨连线的外后 1/3 处

E.髂骨上棘和尾骨连线的外后 1/2 处

答案：A

2.甲状腺素的主要成分是（）

A.磷

B.铁

C.碘

D.锌

E.钙

答案：C

3.¹³¹I 测定前，禁食的食物是（）

A.瘦肉

B.紫菜

C.鳝鱼

D.牛肉

E.猪肝

答案：B

4.导致人体产生耳鸣，血压升高的噪声值超过（）

A.50db

B.60db

C.70db

D.80db

E.90db

答案：E

5.不需要进行保护隔离的是（）

A.早产儿

B.大面积烧伤患者

C.肾脏移植术后患者

D.白血病大剂量化疗者

E.慢性乙型肝炎患者

答案：E

6.缺乏时会导致佝偻病的矿物是（）

A.钠

B.钾

C.钙

D.碘

E.铁

答案：C

7.腹腔有炎症的病人应采用的卧位是（）

A.俯卧位

B.端坐位

C.头高脚低位

D.仰卧位

E.半坐卧位

答案：E

8.昏迷患者的体位是（）

A.强迫体位

B.自主体位

C.被动体位

D.被迫体位

E.自由体位

答案：C

9.医嘱苯丙酸诺龙 25mg im biw, 其中 biw 的中文译意是（）

A.一天三次

B.一天两次

C.每周一次

D.两周两次

E.四小时一次

答案：D

10.对疼痛病人通过分散注意力达到解除疼痛和焦虑，增加病人自我控制的能力，起止痛方法属于（）

A.松弛术

B.催眠术

C.按摩术

D.体位疗法

E.心理咨询

答案：A

11.已打开过而未被污染的无菌包，其有效使用时间为（）

A.4h

B.8h

C.12h

D.16h

E.24h

答案：E

12.为昏迷病人插胃管，为了提高成功率，当胃管插至15cm时将病人头部托起，使下颌靠近胸骨柄，其目的是增大（）

A.食管通过膈肌弧度

B.环状软骨水平弧度

C.平气管交叉处弧度

D.贲门口水平处弧度

E.咽喉部通道的弧度

答案：E

13.自我满足的主观感觉是指（）

A.休息

B.安详

C.睡眠

D.放松

E.舒适

答案：E

14.股动脉注射拔针后局部加压时间是（）

A.1-2 分钟

B.3-5 分钟

C.5-10 分钟

D.10-12 分钟

E.12-15 分钟

答案：C

15.患者女，51岁。脑血管意外，经过治疗后病情稳定，但仍遗留下肢运动障碍，行走不便，护士给予下肢功能康复锻炼。根据纽曼的健康系统模式，此护理干预属于

A.初级预防

B.一级预防

C.二级预防

D.三级预防

E.四级预防

答案：D

16.患者男，40岁。肝硬化伴肝功能不全，为该患者灌肠时，不宜选用肥皂水的原因是（）

A.防止发生腹胀

B.防止发生酸中毒

C.减少氨的产生及吸收

D.以免引起顽固性腹泻

E.减少对肠粘膜的刺激

答案：C

17.关于ROM练习的叙述，正确的是（）

A.尽早，频繁的进行ROM练习

B.每天坚持练习5-10次

C.患者疼痛时加快操作速度

D.每个关节每次做20-30下

E.活动时比较两侧关节活动情况

答案：E

18.癌症晚期患者经常偷偷流泪，此时心理反应期一般是（）

A.否认期

B.愤怒期

C.协议期

D.忧郁期

E.接受期

答案：D

19.护理学基本概念的核心是（）

A.人

B.环境

C.护理

D.健康

E.病人

答案：A

20.患者女，55岁。胆结石，拟于次日在硬膜外麻醉下行胆囊切除手术。目前患者病情稳定，术前准备工作已做好，但仍焦虑不安、忧郁。这是因为未能满足患者的（）

A.生理需要

B.安全需要

C.爱与归属的需要

D.尊重的需要

E.自我实现的需要

答案：B

21.应存放在有色瓶中保存的药物是（）

A.易氧化的药物

B.易潮解的药物

C.易挥发的药物

D.易燃烧的药物

E.易风化的药物

答案：A

22.患者男，67岁。慢性支气管炎急性发作，咳嗽，咳痰，痰液粘稠，伴呼吸困哪。护士遵医嘱给予超声波雾化吸入疗法。护士在巡视病房时，发现雾化器水槽内温度过高，立即关闭机器并更换冷蒸馏水。说明此时超声波雾化吸入水槽内的温度已经超过了（）

A.20°C

B.30°C

C.40°C

D.50°C

E.60°C

答案：D

23.南丁格尔创建世界上第一所护士学校的时间是（）

A.1840年

B.1845年

C.1860年

D.1888年

E.1890年

答案：C

24.弗洛伊德认为其心理活动是一切意识活动的基础的是（）

A.意识

B.前意识

C.潜意识

D.自我

E.超我

答案：C

25.患者男, 43 岁。右下腹阵痛难忍 2 小时。经检查诊断为急性阑尾炎, 急诊行阑尾切除术。手术顺利, 术后 7 天, 发现伤口有淡黄色液体渗出。手术医师告知此系缝合切口的羊肠线不为人体组织吸收所致, 在临床中较为少见。经过近 1 个月的继续治疗, 患者痊愈出院。根据《医疗事故处理条例》规定, 该患者经过 1 个月后才得以痊愈这一客观后果, 应当属于 ()

A.二级医疗事故

B.三级医疗事故

C.四级医疗事故

D.因不可抗力而造成的不良后果

E.因患者体质特殊而发生的医疗事故

答案：E

26.下列预防溶血反应的措施, 不正确的是 ()

A.认真做好血型鉴定和交叉配血试验

B.严格执行血液保存规定

C.输血前肌注异丙嗪

D.严格执行查对制度

E.血液不能加温、震荡

答案：C

27.患者男，23岁，不慎致皮肤外伤10天，自己处理不当导致皮损部位感染，局部有大量渗液，该患者局部用药宜选择的药物制剂为（）

- A.溶液
- B.软膏
- C.粉剂
- D.糊剂
- E.搽剂

答案：A

28.做血液气体分析的血标本采集后应密封放置于（）

- A.清洁试管中
- B.草酸钾抗凝试管
- C.无菌试管中
- D.枸橼酸钠试管中
- E.肝素抗凝注射器试管中

答案：E

29.患者男，34岁。因呕血，黑便来院就诊。查体：神志清楚，面色苍白；BP84/50mmHg。考虑血容量不足，需补充液体，应输入的溶液是（）

- A.5%碳酸氢钠
- B.氨基酸
- C.20%甘露醇
- D.中分子右旋糖酐
- E.浓缩白蛋白

答案：D

30.罗伊适应模式对四个护理学基本概念的阐述，正确的是（）。

- A.健康是一种完整的适应状态
- B.人在适应环境变化时无需付出能量
- C.护理的目标是促进人在生理功能上的适应
- D.人是一个适应系统、具有生物、心理和社会属性
- E.人是通过生理调节维持身体平衡而达到适应

答案：D

31.使用燃烧法对无菌持物钳进行消毒灭菌需要的时间是（）

- A.5S
- B.10S
- C.15S
- D.20S
- E.60S

答案：D

32.患者男，50岁。有吸烟史，咳嗽2个月。咯血或痰中带血2周。X线胸片：左肺上叶有1.5cm×2.0cm病灶。患者入院后入睡困难，易醒。引起该患者睡眠不佳的主要原因是（）

- A.环境改变
- B.焦虑情绪
- C.内分泌变化
- D.睡眠周期节律破坏

E.病房不能吸烟

答案：A

33.按我国对医院的分级管理制度，三级医院的最主要任务是（）

A.教学

B.科研

C.预防

D.指导

E.医疗

答案：B

34.流行性出血热患者宜采取的隔离种类为（）

A.接触隔离

B.昆虫隔离

C.严密隔离

D.肠道隔离

E.呼吸道隔离

答案：B

35.深昏迷患者不能将痰液咳出的主要原因是（）

A.咳嗽反射迟钝

B.咳嗽反射消失

C.吞咽反射消失

D.痰液较稀薄

E.咳嗽较无力

答案：B

36.不属于医院感染的是（）

A.新生儿经胎盘获得的感染

B.护理“非典”患者时护士获得的感染

C.新生儿脐带发炎

D.患者住院第10天后出现上呼吸道感染

E.住院患者导尿后发生泌尿系感染

答案：A

37.慎独修养属于护士素质中的（）

A.心理素质

B.体态素质

C.专业素质

D.科学文化素质

E.思想道德素质

答案：E

38.关于超声雾化吸入的目的，正确叙述的是（）

A.抑制细胞活性改善通气

B.减少局部血液改善通气

C.降低神经细胞兴奋性改善通气

D.刺激神经末梢改善通气

E.解除呼吸道痉挛改善通气

答案：E

39.患者女，65岁。患过敏性哮喘，经积极治疗后痊愈，但该患者仍然不肯出院，事事需要护师帮助，这种角色适应不良的情况属于（）

A.角色行为缺如

B.角色行为强化

C.角色行为消退

D.角色行为冲突

E.角色行为异常

答案：B

40.女病人导尿消毒尿道口和小阴唇正确的是（）

A.从上到下，外-内-内

B.从上到下，内-外-内

C.从上到下，内-内-外

D.从下到上，内-外-内

E.从下到上，螺旋式消毒

答案：A

41.患者男，15岁。因车祸急诊入院，经抢救后患者生命体征较为稳定，但伤口疼痛难忍，因没有家属陪伴较为思念家人。此时应优先解决患者的（）

A.生理需要

B.安全需要

C.爱与归属的需要

D.尊重的需要

E.自我实现的需要

答案：C

42.患者男，60岁，急性胰腺炎，给予要素饮食，护士在操作中不妥的是（）

A.必须新鲜配置

B.可从造瘘处滴入

C.可口服或鼻饲

D.滴注前后需要温开水冲净管腔

E.鼻饲前，温度应保持在32°C-36°C

答案：E

43.南丁格尔指出“护理使千差万别的患者都能达到治疗康复的最佳身心状态，这本身就是一项最精致的艺术”，其理论思想是（）

A.护理是助人的活动

B.护理是科学与艺术的结合

C.照顾是护理的核心和永恒的主题

D.护理是一门专业，一门技术

E.护理是一个过程，其方法是护理程序

答案：B

44.患者男，26岁。因患白血病住院治疗。为增加其机体抵抗力，可给予输入的血液制品是（）

A.洗涤红细胞

B.白细胞浓缩悬液

C.血小板浓缩悬液

D.库存血

E.新鲜血

答案： B

45.休克患者留置导管最主要的目的是（）

A.保持床单位清洁干燥，使患者舒适

B.引流尿液，促进有毒物质的排泄

C.收集尿标本，作细菌培养

D.避免尿液留在膀胱内

E.测尿量及比重，了解肾血流灌注情况

答案： E

46.新生儿接种卡介苗，正确的做法是（）

A.用碘伏消毒皮肤

B.注射部位在上臂三角肌下缘

C.针尖与皮肤呈 30°C-40°C角

D.刺入深度 2/3

E.拔针时用干棉签按压快速拔针

答案： B

47.关于使用紫外线灯管消毒法，不正确的叙述是（）

A.用于室内空气消毒时，距离小于 2cm，时间 30-60min

B.可用乙醇棉球擦拭，以保持灯管清洁

C.照射时病人须戴防护镜、穿防护衣

D.消毒时间从紫外线灯亮可开始计时

E.定时监测灭菌效果

答案：D

48.医院分级管理标准中，医院分级的依据中不包括（）

A.地理位置

B.设施条件

C.管理水平

D.任务和功能

E.技术管理水平

答案：A

49.当怀疑或发现压力源存在而尚未发生压力反应时，应采取的预防级别是（）

A.一级预防

B.二级预防

C.三级预防

D.四级预防

E.五级预防

答案：A

51.护士在药房工作，进行配药的过程中不妥的是（）

A.根据服药本摆药

B.先配固体药，再配水剂

- C.数种药液可放在同一药杯内
- D.配完后需重新核对一遍
- E.核对无误后，还需另一护士核对无误后方可发药

答案：C

51.下列属于格拉斯哥昏迷评分表（Glasgow Coma Scale GSC）项目的是（）

- A.呼吸强弱
- B.语言反应
- C.血压情况
- D.体温情况
- E.皮肤反应

答案：B

52.按皮亚杰的观点，以自我为中心，单方面考虑问题的儿童处于（）

- A.感觉运动期
- B.前运思期
- C.具体运思期
- D.形式运思期
- E.运思期

答案：B

53.对3岁以上的儿童评估疼痛的程度时，选择的最佳工具是（）

- A.数学式评估工具
- B.描述式疼痛评估工具

C.面部表情疼痛测量图

D.道歉阈式评估工具

E.文字式评估工具

答案：C

54.患者女，34岁。脑外伤5天，无自主运动，对声光刺激物反应，护士鉴别其深浅昏迷的方法正确的是（）

A.观察眼球运动

B.观察肌肉张力

C.观察疼痛反应

D.观察瞳孔对光反射

E.观察生命体征的变化

答案：D

55.属于社会状况评估的是（）

A.青霉素过敏史

B.姓名、性别、年龄

C.民族、职业、入院方式

D.入院前性格外向，善于交流

E.经济状况良好，家庭关系和谐

答案：E

56.女婴2岁，肺炎，T39.1℃、P98次/分，R30次/分。咳嗽，痰不易咳出，颜面潮红。其中一项护理诊断为体温过高，请选出主要依据（）

A.皮肤过热，触之有热感

- B.体温高于正常范围
- C.呼吸、心跳均加快
- D.痰液不能排出
- E.不能出汗

答案： B

57.在血管内溶血反应中，出现黄疸、血红蛋白尿的原因是（）

- A.血管痉挛
- B.红细胞凝集
- C.红细胞溶解
- D.血小板释放
- E.血红蛋白遇酸结晶

答案： C

58.挤压呼吸气囊，每次可进入肺内的空气量是（）

- A.100-150ml
- B.200-300ml
- C.350-450ml
- D.500-1000ml
- E.1200-1500ml

答案： D

59.护士为病人导尿术时未用屏风遮挡，导致病人不满而投诉。护士的行为应视为（）

- A.侵权

- B.过失犯罪
- C.故意犯罪
- D.亵渎罪
- E.疏忽大意

答案：A

60.护士的心理素质不包括（）

- A.稳定的情绪
- B.良好的忍耐力
- C.较强的适应能力
- D.较强的实践能力
- E.高度的同情心

答案：D

61.患者男，21岁。出现..不适应，从出国第一天..没有食欲。但进行胃镜检查正常，造成该患者出现身体症状的压力源属于（）

- A.生理性
- B.物理性
- C.心理性
- D.社会性
- E.文化性

答案：E

62.患者男，28岁，身高175cm，体重76kg,其体重范围属于（）

A.正常范围

B.过重

C.肥胖

D.消瘦

E.明显消瘦

答案： B

63.小儿头皮静脉穿刺如果误入动脉，局部可表现为（）

A.无大变化

B.充血、发绀

C.条索状红线

D.苍白、水肿

E.呈树枝分布状苍白

答案： E

64.患者男，37岁，出现向心性肥胖、痤疮、高血压，疑为皮质醇增多症，准备进行尿17-羟皮质类固醇监测，24小时尿中加入浓盐酸的剂量是（）

A.1-2ml

B.3-4ml

C.5-10ml

D.15-20ml

E.25-30ml

答案： C

65.患者男，18岁，因癫痫发作突然跌倒，此时急救的首要步骤是（）

- A.口对口人工呼吸
- B.胸外心脏按压
- C.氧气吸入
- D.应用简易呼吸机改善呼吸状态
- E.清除呼吸道分泌物

答案：E

66.近代护理形成的时间是（）

- A.17世纪中叶
- B.18世纪初
- C.18世纪中叶
- D.19世纪中叶
- E.20世纪初

答案：D

67.青霉素过敏性休克，呼吸道阻塞的临床表现不包括（）

- A.喉头水肿
- B.支气管痉挛
- C.胸闷、气促
- D.呼吸困难
- E.血压下降

答案：E

二、B型题

(68~70题共用选项)

A.1-3小时

B.2-4小时

C.12-16小时

D.20小时

E.24小时

68.尸斑出现在死亡后几小时 (B)

69.尸僵出现在死亡后几小时 (A)

70.尸体腐烂出现在死后几小时 (E)

(71~72题共用选项)

A.全补偿系统

B.部分补偿系统

C.支持教育系统

D.预防系统

E.帮助系统

71.根据自理模式理论,对糖尿病患者进行护理时应采用 (C)

72.根据自理模式理论,对昏迷患者进行护理时应采用 (A)

(73~74题共用选项)

A.有关个人对生活环境反应的判断

B.有关个人对医疗技术反应的判断

C.有关个人、家庭、社会对健康问题反应的判断

D.有关个人身体病理生理变化的判断

E.有关个人对生命照顾反应的判断

73.护理诊断阐述的是 (C)

74.医疗诊断阐述的对象是 (D)

(75~76 题共用选项)

A.干烤法

B.燃烧法

C.日光暴晒法

D.臭氧灭菌法

E.微波消毒灭菌法

75.油剂灭菌适宜的方法是 (A)

76.病理标本处理适宜的方法是 (E)

(77~78 题共用选项)

A.30°C-40°C

B.40°C-45°C

C.45°C-50°C

D.50°C-60°C

E.60°C-70°C

77.热湿敷的水温是 (D)

78.热水坐浴的水温是 (B)

(79 ~ 80 题共用选项)

- A. 蛲虫
- B. 阿米巴原虫
- C. 细菌性痢疾
- D. 弓形虫
- E. 疟疾

79. 患者睡前或清晨起床前，将透明胶带贴于肛门周围处是检查 (A)

80. 需要将便器加湿至接近人体的体温，排便后标本连同便盆立即送检的是检查 (B)

(81 ~ 82 题共用选项)

- A. 200U
- B. 150IU
- C. 200IU
- D. 2500U
- E. 5000U

81. 青霉素皮试液每毫升含 (C)

82. 破伤风抗毒素皮试液每毫升含 (B)

(83 ~ 84 题共用选项)

- A. 30°C
- B. 33°C
- C. 36°C
- D. 39°C

E.42°C

83.取下头部冰袋的条件是全身用冷后 30min, 所测体温应低于 (D)

84.使用冰槽物理降温, 肛温不得低于 (A)

三、A3/A4 型题

(85 ~ 86 题共用材料)

患儿, 男, 3 岁。因手足口病入院, 某日出现肺水肿, 护士协助医生及时接上呼吸机。

85.医院用品的危险性是指物品污染后对人体造成危害的程序。呼吸机管道属于 ()

A.极度危险物品

B.高度危险物品

C.中度危险物品

D.低度危险物品

E.无危险物品

答案: C

86.呼吸机管道可采取的消毒方法是 ()

A.干烤

B.日光曝晒

C.紫外线灯管照射

D.含氟消毒剂溶液浸泡

E.洗必泰溶液浸泡

答案: D

(87 ~ 88 题共用材料)

患者，男，33岁。左踝部关节扭伤3天，左脚擦伤，行温水浸泡。

87.该患者进行温水浸泡时，不妥的是（）

- A.浸泡盆可反复使用
- B.水温保持在43°C-46°C
- C.调节室温
- D.暴露患处，取坐姿
- E.用无菌纱布清洁创面

答案：A

88.患者浸泡部位有伤口，护士在操作过程中，应尤其注意的是（）

- A.伤口处辅以鱼石脂软膏
- B.屏风遮挡患者
- C.关闭门窗，注意保暖
- D.保持床单位清洁
- E.运用无菌操作技术

答案：E

(89~91题共用材料)

患者女，52岁。因上腹部疼痛，剧烈难忍，以“急性肾绞痛”急诊入院。责任护士向患者询问病史，准备书写病历。

89.此时影响有效沟通的因素中，属于个人因素的是（）

- A.患者的疼痛
- B.沟通距离

- C.人际关系
- D.同室患者
- E.医生的诊断

答案：A

90.此时的护患沟通大多为

- A.一般性沟通
- B.事务性沟通
- C.分享性沟通
- D.共鸣性沟通
- E.情感性沟通

答案：A

91.此时为不增加患者的痛苦（）

- A.尽量缩短交谈时间
- B.提供宣泄情感的机会
- C.运用非语言沟通技巧
- D.使用幽默技巧
- E.严格按既定的提纲进行谈话

答案：A

(92 ~ 95 题共用材料)

患者男，41岁，自感心前区不适前来就诊，就诊过程中突然倒地，意识丧失。

92.对患者进行一般情况的观察，内容不包括（）

- A.面容与表情
- B.特殊检查和治疗
- C.皮肤与黏膜
- D.姿势与步态
- E.饮食与营养

答案： B

93.基本生命支持步骤是 ()

- A.胸外心脏按压、开放气道、人工呼吸
- B.病情估计、人工呼吸、胸外心脏按压
- C.人工呼吸、胸外心脏按压、药物治疗
- D.开放气道、人工呼吸、心脏除颤
- E.人工呼吸、胸外心脏按压、心脏除颤

答案： A

94.单人行人工呼吸与胸外心脏按压的比例是 ()

- A.1:5
- B.5:1
- C.2:30
- D.15:2
- E.1:15

答案： C

95.危重病人应首先观察的是 ()

- A.有无腹水
- B.生命体征变化
- C.意识状态的变化
- D.大小便情况
- E.肢体活动情况

答案： B

(96 ~ 98 题共用材料)

患者男，40岁。因摔伤头部致昏迷1小时急诊入院。查体：心率86次/分。血压138/80mmHg，huxi 20次/分。诊断为脑挫裂伤，左侧急性硬膜下血肿。右侧硬膜外血肿、颅骨骨折。入院后在全麻下行颞骨枕开颅颅内血肿清除术。术后第1天患者呈深昏迷状态，眼睑不能闭合，气管插管内可见较多分泌物。遵医嘱给予吸痰。

96.吸痰操作中注意事项正确的是（）

- A.调节负压，不可超过40kPa，以免造成黏膜损伤
- B.严格无菌操作
- C.吸痰时间不少于15s
- D.吸痰前给予生理盐水5ml注入气管插管内
- E.吸痰玻璃接管每次吸痰后进行更换

答案： B

97.该患者促进痰液排出的方法，不正确的是（）

- A.叩背
- B.肺部物理治疗
- C.体位引流

D.吸痰

E.雾化吸入

答案：C

98.该患者的护理措施，不正确的是（）

A.密切观察病情，做好抢救准备

B.眼睑处用干无菌纱布覆盖

C.保持呼吸通畅

D.每日口腔护理 2 次

E.每 2 小时为患者翻身一次

答案：B

(99~100 题共用材料)

患者男，52 岁。高血压合并脑出血。现突然进入深度昏迷，出现高热、小便失禁等，准备给予留置尿管。

99.患者尿失禁可能属于（）

A.真性尿失禁

B.假性尿失禁

C.压力性尿失禁

D.强迫性尿失禁

E.功能性尿失禁

答案：B

100.尿管操作中为固定导管，应向导管气囊注入（）

A.空气

B.蒸馏水

C.注射用水

D.生理盐水

E.无菌生理盐水

答案：E