

6 月份护士月度考试

1、陆某，27岁。孕1产0。既往月经规律。2年前，自人工流产后出现痛经并逐渐加重，未避孕而未再孕。妇科检查：子宫后倾固定正常大小，盆腔后部扪及触痛性结节。该病的预防措施不正确的是

- A. 经期尽量不做妇科检查
- B. 输卵管通畅术应于经前3~7日进行
- C. 经期避免剧烈运动
- D. 宫颈管粘连引起经血潴留，及时手术治疗
- E. 多次妊娠、流产、剖宫产为可能诱因

2、心脏复苏的首选药物

- A. 氯化钙
- B. 阿托品
- C. 碳酸氢钠
- D. 利多卡因
- E. 肾上腺素

3、中凹卧位需将床头及床尾抬起的角度分别为（）

- A. $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$ ， $30^{\circ} \sim 35^{\circ}$
- B. $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$ ， $30^{\circ} \sim 35^{\circ}$
- C. $20^{\circ} \sim 25^{\circ}$ ， $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- D. $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$ ， $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- E. $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$ ， $20^{\circ} \sim 30^{\circ}$

4、静脉留置针以多少角度进针：

- A. $10^{\circ} \sim 20^{\circ}$
- B. $15^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- C. $30^{\circ} \sim 40^{\circ}$
- D. $25^{\circ} \sim 30^{\circ}$
- E. $5^{\circ} \sim 10^{\circ}$

5、乙醇拭浴时，禁忌擦拭的部位是（）

- A. 头部和四肢
- B. 手掌和肘窝
- C. 腋窝和腹股沟
- D. 前胸和腹部
- E. 腰骶部

6、亚急性心内膜炎血培养标本采血量应为

- A. 1~3ml
- B. 4~6ml
- C. 7~9ml

D.10~15ml

E.16~18ml

- 7、患者，男，35岁，确诊为“禽流感”，应为患者采取的隔离措施是
- A.严密隔离
 - B.接触隔离
 - C.呼吸道隔离
 - D.肠道隔离
 - E.血液及体液隔离
- 8、男性患儿，9岁。高热3天，行温水或乙醇拭浴时，禁忌擦浴的部位是
- A.面部、腹部、足部
 - B.胸前区、腹部、足底
 - C.面部、背部、腋窝
 - D.咽窝、腋窝、腹股沟
 - E.肘窝、手心、腹股沟
- 9、男性，38岁。因胫骨骨折需在硬膜外麻醉下行胫骨钢板内固定术，用平车将病人推进手术室后。病区护士应为病人准备麻醉床。中单、橡胶中单应铺于病床的
- A.床中部和床下部
 - B.床中部和床上部
 - C.床上部和床下部
 - D.床中部
 - E.床下部
- 10、贫血最常见的护理诊断
- A.组织完整性受损
 - B.活动无耐力
 - C.组织灌注量改变
 - D.心输出量减少
 - E.有体液不足的危险
- 11、患者女，51岁。因淋巴瘤入院接受治疗。护士在评估患者时发现其口腔粘膜有乳白色分泌物，在给予口腔护理时首选的溶液是
- A.朵贝尔溶液
 - B.1%~4%的碳酸氢钠溶液
 - C.0.1%醋酸溶液
 - D.1%~3%的过氧化氢溶液
 - E.生理盐水
- 12、患者男，65岁，发现腹股沟内测包块3年余，3年前腹股沟包块突然增大变硬，不能还纳，伴剧烈疼痛，8小时前疼痛有所缓解，但出现发热，患者最可能出现了
- A.易复性疝
 - B.难复性疝

- C.嵌顿性疝
- D.绞窄性疝
- E.急性阑尾炎

13、130.患儿男，3岁，自1岁时出现活动后气促，乏力，常喜下蹲位，发绀，胸骨左线第2~4肋间闻及Ⅲ级收缩期杂音，可见杵状指，首先考虑

- A.房间隔缺损
- B.动脉导管未闭
- C.法洛四联症
- D.室间隔缺损
- E.右位心

14、某急性发作重度的支气管哮喘患者，其首选药物

- A.氨茶碱
- B.地塞米松
- C.沙丁胺醇
- D.色氨酸钠
- E.异丙托溴胺

15、患者，女性，51岁。上腹疼痛饱胀不适半年，近一个月出现黄疸并进行性加重，疑为胰腺癌，为进一步确诊，该患者首选的辅助检查

- A.血常规
- B.血尿淀粉酶测定
- C.血清淀粉酶测定
- D.X光片
- E.CT

16、患者，女性，43岁。患肺结核2年，使用链霉素抗结核治疗，用药期间注意监测

- A.肝功能
- B.心功能
- C.肾功能
- D.肺功能
- E.胃肠功能

17、患者张某，因误食灭鼠药，被送入急诊室，此时为张某洗胃最好选用

- A.生理盐水
- B.温开水
- C.2%的碳酸氢钠
- D.1:15000~1:20000的高锰酸钾液
- E.4%的碳酸氢钠

18、小儿男，10月龄。常规生长发育监测报告前囟未闭合，家长担心发育不正常。护士告知家长正常小儿前囟闭合的年龄是

- A.10~11个月

- B.12 ~ 18 个月
- C.20 ~ 22 个月
- D.22 ~ 24 个月
- E.24 ~ 30 个月

19、影响此次护患沟通的隐秘因素是

- A.患者文化程度
- B.患者亲属在场
- C.患者伤口疼痛
- D.患者情绪烦躁
- E.患者性别

20、患者，女，35岁。胃大部切除术后切口化脓，创面脓液量多，有臭味。换药处置应

- A.3%氯化钠溶液湿敷
- B.75%乙醇湿敷
- C.优琐湿敷
- D.10%硝酸银烧灼
- E.过氧化氢溶液湿敷

21、患者，男，45岁。饮酒史20余年，昨晚与同事聚会，饮白酒约400ml。陷入昏迷状态，心率130次/分、血压80/50mmHg，呼吸慢而有鼾音。处于严重急性酒精中毒状态，血液透析可以促使体内乙醇排出。透析指征是：血乙醇含量达到

- A.>108 mmol/L (500 mg/dl)
- B.<54 mmol/L (250 mg/dl)
- C.>87 mmol/L (400 mg/dl)
- D.<108 mmol/L (500 mg/dl)
- E.<87 mmol/L (400 mg/dl)

22、患者，男，23岁。野外施工时足底被锈钉子刺伤，因条件有限仅自行简单处理。如发生破伤风通常会在什么时候发作

- A.1~3天
- B.6~12天
- C.14天
- D.15~21天
- E.28~30天

23、患者，男，49岁。再生障碍性贫血半年，应用雄激素治疗的作用机制是刺激骨髓而使

- A.红细胞增多
- B.白细胞增多
- C.血小板增多
- D.全血细胞增多
- E.网织红细胞增多

24、8岁男孩，开水烫伤。双下肢有水疱，剧痛，胸腹部为红斑。估计该患儿Ⅱ度烫伤面积是

- A.20%
- B.41%
- C.42%
- D.46%
- E.59%

25、患者，女，29岁。泌尿系感染，拟采集中段尿做细菌学培养。不正确的操作是

- A.温水清洗外阴
- B.0.1%苯扎溴铵消毒尿道口
- C.排尿不中断
- D.弃前、弃后、留中段尿
- E.取无菌试管，留取尿量<5ml

26、孕妇，32岁，妊娠31周，患者阴道少量出血3天，自感下腹坠痛2小时，听诊：胎心146次/分，肛查：宫口扩张可容纳之间，抬头先露，高浮，该患者最可能的诊断是

- A.先兆流产
- B.早产
- C.胎盘早剥
- D.先兆早产
- E.前置胎盘

27、患儿，12岁。咳嗽、发热3周。患儿以干咳为主，肺部体征不明显，给予青霉素治疗无效。考虑该患儿可能的诊断为

- A.肺炎链球菌性肺炎
- B.呼吸道合胞病毒肺炎
- C.流感病毒肺炎
- D.葡萄球菌肺炎
- E.支原体肺炎

28、患儿，12岁。咳嗽、发热3周。患儿以干咳为主，肺部体征不明显，给予青霉素治疗无效。该患儿首选的治疗药物为

- A.青霉素
- B.红霉素
- C.甲硝唑
- D.头孢菌素
- E.链霉素

29、患者，女，35岁。1周前曾患有上呼吸道感染，进行性四肢无力3天，呛咳1天。查体：神清，双侧提腭差，咽反射消失，颈软，四肢肌张力低，腱反射(-)，双侧肘、膝以下针刺觉减退，趾反射无反应，克氏征阳性。该患者最可能的诊断是

- A.周期性麻痹
- B.重症肌无力

- C.急性炎症性脱髓鞘性多发性神经病
- D.多发性肌炎
- E.脑出血

30、患者，女，35岁。1周前曾患有上呼吸道感染，进行性四肢无力3天，呛咳1天。查体：神清，双侧提腭差，咽反射消失，颈软，四肢肌张力低，腱反射（-），双侧肘、膝以下针刺觉减退，趾反射无反应，克氏征阳性。下列哪项辅助检查有助于本病的诊断

- A.头颅CT
- B.血CPK、LDH
- C.腰穿脑脊液检查
- D.新斯的明试验
- E.心电图和血钾

31、患者，女，43岁。下腹痛、黏液脓血便3个月，有里急后重感，无发热、消瘦。体检：心肺无异常；腹软，左下腹轻压痛，拟诊溃疡性结肠炎。本病腹痛的特点是

- A.疼痛—便意—便后缓解
- B.便意—疼痛—便后缓解
- C.疼痛—便意—便后不缓解
- D.便意—疼痛—便后不缓解
- E.疼痛—便意—便后疼痛加重

32、骨肉瘤最常见的转移部位是

- A.胃
- B.肺
- C.肝
- D.脑
- E.结肠

33、门诊发现传染患者时，护士采取的首要措施是

- A.安排患者提前就诊
- B.进行卫生宣教与候诊教育
- C.将患者隔离诊治
- D.转入急诊科
- E.组织其他患者撤离

34、以下符合小儿生长发育顺序规律的是

- A.由高级到低级
- B.各系统发育快慢均衡
- C.生长发育年龄阶段速度均衡
- D.先慢后快
- E.由简单到复杂

35、患者，男性，19岁。因高考失利，产生轻生念头，服大量毒药，药名不详。急诊护士为其洗胃时首先应

- A.立即灌入 25 ~ 38 °C 洗胃液
- B.灌入温开水或生理盐水
- C.抽取毒物立即送检
- D.向家属、患者询问病史
- E.灌入牛奶或蛋清水

36、孕妇，36 岁。孕 3 产 0，妊娠 32 周，以往有 2 次人工流产史。今晨阴道出血约 200 mL。查体：血压 110/60 mmHg，腹软，无压痛；胎头先露，胎头浮，胎心率 140 次/分。拟诊为前置胎盘。入院后处理应选择

- A.急诊剖宫产术
- B.人工破膜术及静脉滴注缩宫素
- C.地塞米松促胎肺成熟
- D.期待疗法
- E.择期剖宫产

37、患者，男性，43 岁。因颈部肿块来院就诊，经检查后确诊为晚期鼻咽癌。患者对该诊断难以相信，多次去其他医院检查确认。该患者此时的心理反应期属于

- A.否认期
- B.愤怒期
- C.协议期
- D.抑郁期
- E.接受期

38、患者，女性，36 岁。得知自己患晚期乳腺癌后心情沮丧，常暗自落泪，感觉自己时日不多，不时出现拒绝治疗的现象。护士与患者沟通时应避免的行为是

- A.当拒绝治疗时直接告诉主管医生
- B.鼓励患者积极配合治疗
- C.认真倾听患者内心的感受
- D.及时满足患者的合理需求
- E.密切关注患者的情绪变化，及时疏导

39、患者，男性，45 岁，骤起寒战、高热 40 °C、大汗，肝区或右上腹痛并伴有厌食、乏力。查体右季肋区呈饱满状态，右下胸及肝区叩击痛，怀疑“细菌性肝脓肿”，分析细菌侵入的主要途径为

- A.肝动脉
- B.门静脉
- C.肝外伤后肝内血肿感染
- D.淋巴系统
- E.胆道系统

40、某支原体肺炎患者红霉素静脉滴注 3 天，沿血管走行出现条索状红线，局部肿胀、发热伴疼痛，护理措施不妥的是

- A.患肢抬高
- B.增加患肢活动

- C.超短波局部治疗
- D.95%乙醇湿热敷
- E.暂停从该静脉输液

41、患者，男性，55岁。确诊为“原发性高血压”，血压170/105 mmHg，并发冠心病及动脉硬化。患者药物治疗的原则不包括

- A.从小剂量开始
- B.静脉用药快速降压
- C.个体化治疗
- D.优先选择长效制剂
- E.联合用药

42、患者头部外伤后出现昏迷、休克，急诊入院，病室值班护士首先要做的护理工作是

- A.准备床单位，迎接患者
- B.简单做入院介绍和指导
- C.向患者家属介绍住院环境和探视规定
- D.边通知医生，边做好抢救准备工作
- E.立即进行人工呼吸、心外按压

43、患者，女性，76岁。冠心病急性发作入院，患者只会讲粤语。护士在护患沟通时应特别注意使用的沟通技巧是

- A.参与
- B.反映
- C.核实
- D.触摸
- E.倾听

44、孕妇，26岁，孕40周，开始正规宫缩后胎心率168次/分，宫口开3cm，破水时羊水呈Ⅱ度胎粪污染，胎儿头皮血气分析pH

- A.先天性脑积水
- B.急性胎儿窘迫
- C.先天性心脏病
- D.慢性胎儿窘迫
- E.新生儿窒息

45、足月儿，生后2周，黄疸逐渐加重，以结合型胆红素增加为主，肝脏进行性增大，大便呈灰白色，家长咨询其原因，护士的正确解释是

- A.生理性黄疸
- B.母乳性黄疸
- C.新生儿溶血症
- D.新生儿败血症
- E.新生儿胆道闭锁

46、墨菲征阳性见于

- A.急性腹膜炎
- B.急性胃穿孔
- C.急性胆囊炎
- D.急性胰腺炎
- E.肠扭转

47、疝与痛的主要区别在于

- A.致病菌
- B.感染范围
- C.有无区域淋巴结肿大
- D.好发部位
- E.发病患者群

48、急性心肌梗死患者最早、最突出的症状是

- A.心源性休克
- B.室性期前收缩（期前收缩）
- C.心前区疼痛
- D.呼吸困难
- E.腹痛、腹泻

49、放置宫内节育器后，1年内的复查时间，正确的为

- A.1、6个月复查
- B.1、3、6个月复查
- C.1、3、9个月复查
- D.1、6个月及1年复查
- E.1、3、6个月及1年复查

50、护士向葡萄胎清宫术后的患者介绍术后随访的内容，应除外

- A.定期测 hCG
- B.妇科检查
- C.定期做 B 超
- D.有无异常阴道出血
- E.避孕宜用宫内节育器

51、4 个月的佝偻病患儿常见的体征有

- A.颅骨软化
- B.鞍形颅
- C.郝氏沟
- D.脊柱侧弯
- E.X 形腿

52、有助于肝癌早期诊断的实验室检查是

- A.癌胚抗原测定
- B.肝功能检测

- C.甲胎蛋白测定
- D.胆红素代谢试验
- E.血清脂类测定

53、滴虫性阴道炎分泌物的典型表现是

- A.脓血性
- B.豆渣样
- C.稀薄泡沫状
- D.干酪样
- E.黄脓性

54、护士为产妇讲述母乳喂养的方法时，介绍避免母亲乳头皲裂最主要的措施是

- A.喂哺前清洁乳头
- B.喂哺后消毒乳头
- C.用吸乳器将乳汁吸出后喂养
- D.保持新生儿正确吸吮母乳的姿势
- E.沐浴时用鱼肝油软膏

55、对于血栓闭塞性脉管炎患者，护理正确的是

- A.局部保暖并加热
- B.禁用血管扩张药物
- C.有效止痛
- D.为避免坏死可使用雄激素
- E.为避免患肢缺血缺氧，禁止活动

56、护士指导类风湿关节炎患者为防止晨僵的发生所采取的以下措施中，不正确的是

- A.局部红外线理疗
- B.睡眠时使用弹力手套保暖
- C.晨起后用温水泡僵硬的关节 15 分钟
- D.适当进行握拳和分并手指的训练循序渐进
- E.鼓励多卧床休息

57、患者，女性，42 岁。胃癌。在硬膜外麻醉下行胃大部切除术，手术顺利，术后安返病房。护士应注意观察的并发症是

- A.胃肠吻合瘘
- B.输出段梗阻
- C.吻合口出血
- D.早期倾倒综合征
- E.碱性反流性食管炎

58、患者，女性，45 岁。肝硬化。查体：面色灰暗，腹部膨隆呈蛙腹状，腹壁皮肤紧张发亮。放腹水的处置中，不正确的作法是

- A.协助医生做好准备工作
- B.指导患者术前排空膀胱

- C.术中密切观察生命体征的变化
- D.术后缚紧腹带
- E.术前平卧 2 小时

59、患者，男性，61 岁。急性肾衰竭少尿期。患者呼吸困难、头痛、软瘫、腹胀，心电图示：T 波高尖、QRS 间期延长。考虑可能的情况是

- A.低蛋白血症
- B.高钾血症
- C.低钾血症
- D.代谢性碱中毒
- E.代谢性酸中毒

60、患者，32 岁。已婚，有 2 次流产史。现停经 2 个月，阴道少许出血伴轻微下腹痛 1 天。查体：阴道有少许血性分泌物，宫颈口未开，子宫大如孕 2 个月。考虑可能为

- A.先兆流产
- B.难免流产
- C.不全流产
- D.完全流产
- E.习惯性流产

61、患者，女性，30 岁。每次月经过多，持续时间长，头晕耳鸣、心悸、气短，贫血，面色苍白、疲乏无力。血常规提示：小细胞低色素性贫血。护士判断其贫血为

- A.再生障碍性贫血
- B.失血性贫血
- C.缺铁性贫血
- D.溶血性贫血
- E.维生素 B12 缺乏

62、新生儿，胎龄 38 周，出生体重 3 500 g，身长 52 cm,皮肤红润，胎毛少，足纹明显。助产护士估计该新生儿最可能是

- A.低出生体重儿
- B.微小儿
- C.早产儿
- D.足月儿
- E.过期产儿

63、早产儿，女，剖腹产娩出，出生后全身皮肤青紫，呼吸不规律，心率 88/分，四肢稍屈，喉反射消失。其 Apgar 评分为

- A.2 分
- B.4 分
- C.6 分
- D.8 分
- E.10 分

64、患者，男性，47岁。无明显诱因下，反复出现无痛性肉眼血尿3个月余，抗生素治疗效果无效。可能的疾病是

- A.膀胱炎症
- B.泌尿系统结石
- C.泌尿系统肿瘤
- D.肾结核
- E.前列腺癌

65、患者，男性，62岁。肺心病史10年，既往无高血压病史，因头痛、恶心、烦躁入院。查体：血压160/90 mmHg，心率100次/分，护士采取的护理措施中最主要的是

- A.口服扩血管药
- B.地西洋静注
- C.改善通气，氧疗
- D.静脉使用氨茶碱
- E.应用抗生素

66、患儿，6岁，患动脉导管未闭，病情较重，平时需用地高辛维持心功能。现患儿因上感后诱发急性心力衰竭，按医嘱护士给患儿用毛花苷丙（西地兰），患儿出现恶心、呕吐、视物模糊。此时护士应采取的措施是

- A.调快输液速度
- B.禁食、胃肠减压
- C.密切观察患儿心率变化
- D.遵医嘱给予强心、利尿药
- E.暂停使用强心苷并通知医生

67、患者，女性，48岁。右侧乳腺癌根治术后第2天，右上肢康复训练中正确的是

- A.右手梳头
- B.右手爬墙运动
- C.右手刷牙洗脸
- D.下床时用吊带托扶右上肢
- E.下床活动需要有人扶住患者右上肢

68、患儿，女，3岁半，因“房间隔缺损”拟入院择期手术治疗。以下护士健康教育内容中不正确的是

- A.本病为一种先天性心脏病，预后较好
- B.注意保护性隔离，不要去人多拥挤的地方
- C.治疗方案以手术为主
- D.术前最重要的是防止皮肤破损
- E.按时进行预防接种

69、患者，女性，27岁。体检发现卵巢囊性肿物，直径3cm，月经正常，无其他主诉。恰当的处理是

- A.每3个月复查1次
- B.择期患侧卵巢切除术

- C.预防性化疗
- D.腹腔镜探查
- E.雄激素治疗

70、患者，男性，70岁，疑诊肺癌。行纤维支气管镜检查后，护士嘱其不宜立即饮水，向患者解释其目的是为了

- A.恶心
- B.喷嚏
- C.出血
- D.误吸
- E.腹胀

71、患儿，2岁。运动发育迟缓，行为异常，感知障碍，自主运动不协调，下肢肌张力增高，抱起时双腿交叉呈剪刀样。最可能的疾病是

- A.癫痫持续状态
- B.脑性瘫痪
- C.癫痫小发作
- D.癫痫大发作
- E.发作性舞蹈手足徐动症

72、老年女性，55岁。刚刚退休，退休前是一个单位的总会计师，护士指导老年人应积极合理安排退休后生活，以下建议错误的是

- A.正确面对随着年龄变化身体功能所发生的变化
- B.合理安排作息时间
- C.培养兴趣爱好
- D.退休后多在家休息，尽量不要和外界联系
- E.保持心情愉快、家庭和睦

73、患儿，女，1岁。被诊断为肺炎，今日突然出现烦躁不安，呼吸困难，发绀，呼吸65次/分，心率160次/分，右肺叩诊鼓音，听诊呼吸音减低，肝肋下2.5cm，X线示纵膈向左移位。该患儿最可能并发了

- A.脓胸
- B.肺不张
- C.心力衰竭
- D.气胸
- E.支气管异物

74、患儿3岁。发热后出现针尖大小的丘疹，全身皮肤弥漫性充血，疹间皮肤不正常，入院后诊断为猩红热，则应警惕患儿出现的并发症是

- A.肺炎
- B.睾丸炎
- C.脑炎
- D.急性肾小球肾炎
- E.急性胰腺炎

75、患儿，女，足月顺产，牛奶喂养。13天后出现烦躁不安，易激怒，四肢肌张力增高，腱反射增强。血钙 1.6 mmol/L。首先应采取的治疗措施是

- A. 静脉推注葡萄糖
- B. 肌肉注射苯巴比妥
- C. 口服 VitD
- D. 静脉补充钙剂
- E. 吸氧

76、急性颅内压增高的早期表现为

- A. 脉搏增快、呼吸急促、血压升高
- B. 脉搏增快、呼吸急促、血压降低
- C. 脉搏减慢、呼吸急促、血压降低
- D. 脉搏减慢、呼吸减慢、血压降低
- E. 脉搏减慢、呼吸深慢、血压升高

77、青霉素过敏致血清病型反应，一般出现在用药后

- A. 1~3 天
- B. 3~5 天
- C. 5~7 天
- D. 7~12 天
- E. 12~15 天

78、佝偻病活动初期的主要表现是

- A. 方颅
- B. 骨骼畸形
- C. 轻度贫血
- D. 易激惹、多汗
- E. 肌张力低下

79、消化性溃疡发生的基本原理是

- A. 胃酸分泌过多
- B. 幽门螺杆菌感染
- C. 胃黏膜保护作用减弱
- D. 胃黏膜和胃蛋白酶的消化作用
- E. 黏膜损害因素和保护因素之间失去平衡

80、正确测量胃管插入长度的方法是

- A. 从前额发际至胸骨柄
- B. 从前额发际至剑突
- C. 从眉心至胸骨柄
- D. 从眉心至剑突
- E. 从鼻尖至剑突

- 81、肝昏迷患者发生便秘时，灌肠时应禁用
- A.生理盐水
 - B.肥皂水
 - C.新霉素液
 - D.弱酸性溶液
 - E.石蜡油
- 82、患者,女, 28 岁, 胆石症取石手术后, 下列哪项是拔除“T”管引流的指征
- A.术后 2 周, 引流量减少, 造影通畅
 - B.术后 1 周, 引流量减少
 - C.术后体温正常, 白细胞不高
 - D.术后 2 周, 引流量增加
 - E.术后 1 周, 疼痛消失
- 83、患儿, 女, 16 岁。在儿童时期频发风湿热, 目前已诊断为慢性风心病二尖瓣狭窄。其可靠的依据是
- A.心尖部舒张期杂音
 - B.心尖部收缩期杂音
 - C.剑突下收缩期杂音
 - D.胸骨右缘第 2 肋间舒张期杂音
 - E.胸骨左缘第 2 肋间舒张期杂音
- 84、患者,男, 60 岁。高血压病史 10 年, 今日突然出现头痛、呕吐、多汗、面色苍白、视力模糊, 测血压 262/123mmHg, 经及时治疗抢救, 血压有所下降。考虑该患者为
- A.脑血管意外
 - B.高血压脑病
 - C.急性心肌梗死
 - D.高血压危象
 - E.急进型高血压
- 85、对胎盘早剥病人的健康教育, 不正确的是
- A.妊娠晚期避免长时间侧卧位
 - B.防治妊娠期高血压疾病
 - C.防止宫腔内压骤降
 - D.密切监测胎儿情况
 - E.随时做好手术和抢救母儿准备
- 86、法洛四联症患儿缺氧发作时, 使用普萘洛尔进行治疗的目的是
- A.控制惊厥
 - B.减慢心率
 - C.减少水钠潴留
 - D.抑制呼吸中枢
 - E.纠正代谢性酸中毒

- 87、以下关于病毒性肝炎的描述，错误的是
- A. 传染源均为患者和（或）带病毒者
 - B. 乙型肝炎主要通过血液途径传播
 - C. 病后可获得免疫力，但彼此无交叉免疫保护力
 - D. 甲肝儿童多见，病程呈自限性
 - E. 各种病毒性肝炎均应进行抗病毒治疗
- 88、预防胃大部切除术后倾倒综合征的措施中，错误的是
- A. 少食多餐
 - B. 宜进高糖、低蛋白饮食
 - C. 避免过咸、过浓流质
 - D. 避免过甜、过浓流质
 - E. 宜进低糖、高蛋白饮食
- 89、有机磷农药口服中毒，出现症状的时间
- A. 10 分钟至 1 小时内
 - B. 10 分钟至 2 小时内
 - C. 10 分钟至 3 小时内
 - D. 10 分钟至 4 小时内
 - E. 10 分钟至 5 小时内
- 90、急性血源性骨髓炎护理中不妥的是
- A. 患肢必须给予固定
 - B. 物理降温、预防惊厥
 - C. 高蛋白质、高糖、高维生素饮食
 - D. 体温正常后，还应继续用抗生素
 - E. 体温正常后可下床活动
- 91、新生儿出生后 2~3 天，家属为其换尿布时发现大便为黄绿色，且粪水是分开的。护士给予的解释是
- A. 进食不足
 - B. 消化不良
 - C. 肠道感染
 - D. 进食过量
 - E. 婴儿腹泻
- 92、患者，女，43 岁。下腹痛、黏液脓血便 3 个月，有里急后重感，无发热、消瘦。体检：心肺无异常；腹软，左下腹轻压痛，拟诊溃疡性结肠炎。该患者病情观察中哪项可以作为疾病活动期的判断指标
- A. 体温升高
 - B. 呼吸急促
 - C. 黏液脓血便
 - D. 腹痛加剧
 - E. 血压升高

93、患者，男性，28岁。腹泻、黏液脓血便4周，4~5次/天，伴下腹阵痛，便后缓解。最有可能考虑的疾病是

- A. 克罗恩病
- B. 肠易激综合征
- C. 直肠肛管周围脓肿
- D. 肠结核
- E. 溃疡性结肠炎

94、患者，男性，38岁。慢性细菌性痢疾，拟给予药物灌肠治疗。给予该患者最好的灌肠方法是

- A. 大量不保留灌肠法
- B. 小量不保留灌肠法
- C. 清洁灌肠法
- D. 保留灌肠法
- E. 大量保留灌肠法

95、患者，男性，38岁。慢性细菌性痢疾，拟给予药物灌肠治疗。行灌肠时，药量一般不超过

- A. 200 mL
- B. 400 mL
- C. 500 mL
- D. 600 mL
- E. 800 mL

96、患者，女，5岁。患风湿性心脏瓣膜病。不明原因持续发热1月余，体温波动在37.5~38.5℃之间，应用多种抗生素治疗无效，今晨以“感染性心内膜炎”收住入院。如果该患者同时抽取了多个血标本，注入容器的先后顺序是

- A. 血培养瓶、抗凝试管、干燥试管
- B. 血培养瓶、干燥试管、抗凝试管
- C. 干燥试管、血培养瓶、抗凝试管
- D. 抗凝试管、干燥试管、血培养瓶
- E. 干燥试管、抗凝试管、血培养瓶

97、患者赵某，男，26岁。因高热急诊入院。查：T 39.8℃（腋温），P 112次/分，R 23次/分，BP 110/78 mmHg。经证实体温测量结果没有错误，护士在体温单上填写该体温时，正确的符号为

- A. 蓝色“z”
- B. 红色“z”
- C. 蓝色“x”
- D. 红色“v”
- E. 在体温符号外画蓝色“O”

98、患者赵某，男，26岁。因高热急诊入院。查：T 39.8℃（腋温），P 112次/分，R 23

次/分, BP 110/78 mmHg。根据患者病情, 医生开出下列医嘱, 需立即执行的是

- A. 复方氨基比林 2 mL im st
- B. 一级护理
- C. 胸部 X 线片
- D. 0.9%氯化钠溶液 250 mL+青霉素 320 万 U/iv gtt bid
- E. 软食

99、张阿姨突发心脏病据医嘱做了相关检查, 下列哪项化验结果高度怀疑急性心肌梗死

- A. 血清总胆固醇下降
- B. 血清甘油三酯下降
- C. 血清高密度脂蛋白胆固醇增高
- D. 血清低密度脂蛋白胆固醇增高
- E. 血清肌酸磷酸激酶增高

100、纤维蛋白性心包炎的典型体征是

- A. 心界扩大
- B. 心包摩擦音
- C. 心音遥远
- D. 奇脉
- E. 脉短绌

101、下列哪项不是急性心肌梗死溶栓的指征

- A. 年龄在 65 岁以下
- B. 发病在 6 小时以内
- C. 胸痛持续 30 分钟以上
- D. 出现病理性 Q 波
- E. 相邻 2 个以上导联 ST 段抬高大于 2mm

102、急性重症肝炎早期,与慢性亚急性重症肝炎相鉴别,最有诊断意义的是

- A. 黄疸迅速加深
- B. 出血倾向加重
- C. 中枢神经系统症状
- D. 严重恶心、呕吐
- E. 出现腹水

103、患者男,70 岁。患肺结核 20 年,近年来病情反复,经常咯血,表现为烦躁焦虑。护士在护理过程中,应注意的是

- A. 采取严密隔离
- B. 讲解疾病知识,给予鼓励和帮助
- C. 采取健侧卧位
- D. 患者咯血时可进温软流食
- E. 高流量高浓度吸氧

104、肺结核患者在家休养治疗期间,最简便有效的处理痰液的方法是

- A.煮沸
- B.深埋
- C.焚烧
- D.70%乙醇浸泡
- E.5%苯酚消毒

105、麻疹患者在出疹期首先出皮疹的部位

- A.前额、面、颈
- B.耳后发际
- C.胸、背
- D.胸、膜
- E.四肢

106、患者,男,31岁。主诉因“近日高热,咳嗽伴痛,有头全身酸痛、不适,乏力等就诊,经检查确诊为非典型肺炎并收入院治疗。患者病情进一步加重,对其行气管切开术,污染敷料应

- A.紫外线照射
- B.高压灭菌
- C.焚烧
- D.煮沸
- E.浸泡

107、门诊发现传染病病人时应立即采取的措施是

- A.安排病人提前就诊
- B.进行卫生宣教与候诊教育
- C.将病人隔离诊治
- D.转急诊室处理
- E.消毒候诊环境

108、急性黄疸型肝炎黄疸前期症状是

- A.消化道症状
- B.呼吸道症状
- C.泌尿道症状
- D.神经系统症状
- E.血液系统症状

109、以下哪项不是猩红热的临床特征

- A.杨梅舌
- B.口周苍白圈
- C.帕氏线
- D.疹间皮肤不正常
- E.皮肤出血点

110、对于未接种过卡介苗患儿行结核菌素试验,其结果如果呈强阳性反应,常提示

- A.机体反应正常

- B.需要接种卡介苗
- C.有活动性结核病
- D.曾有结核分枝杆菌感染
- E.营养状况良好

111、患者男,18岁。因“饮酒后昏迷,抽搐3小时”急诊入院。患者于3小时前饮白酒800ml后逐渐胡言乱语,昏睡,继之昏迷,伴有剧烈抽搐,口吐白沫,无双眼上翻,未咬破舌头。最可能的诊断是

- A.癫痫
- B.中风
- C.脑水肿
- D.酒精中毒
- E.食物中毒

112、临床上最常见的中暑类型

- A.热伤风
- B.热射病
- C.先兆中暑
- D.热痉挛
- E.热衰竭

113、对溺水患者进行急救时,首先应

- A.倒水处理
- B.口对口人工呼吸
- C.保持呼吸道通畅
- D.给强心利尿药
- E.胸外心脏按压

114、引起食物中毒后呕吐最严重的细菌是

- A.副溶血性弧菌
- B.沙门菌属
- C.大肠埃希菌
- D.溶血性链球菌
- E.金黄色葡萄球菌

115、颈椎骨折合并脊髓损伤的患者应如何搬运

- A.一人背起病人搬运
- B.一人抱起病人搬运
- C.二人搬运,其中一人抬头,一人抬腿
- D.三人将病人平托到木板上搬运
- E.四人搬运,三人将病人平托到木板上,一人固定头颈部

116、下列关于特发性血小板减少性紫癜的护理措施,不正确的是

- A.血小板计数在 $(30\sim 40)\times 10^9/L$ 以下者,要少活动

- B.给予高蛋白、高维生素、少渣饮食
- C.血小板计数在 $30 \times 10^9/L$ 。L 以下者应警惕脑出血
- D.严密观察出血部位出现症状和出血量
- E.鼻腔出血时可用油纱条填塞

117、下列哪一项是婴儿手足搐搦症的主要死亡原因

- A.心力衰竭
- B.喉痉挛
- C.呼吸衰竭
- D.手足搐搦
- E.无热惊厥

118、对于癫痫药物治疗的原则的描述,下列哪一项是错误的

- A.最好单一药物治疗
- B.根据发作类型选择最佳药物
- C.定时监测血药浓度以指导用药
- D.颅内占位病变首先考虑手术治疗
- E.完全控制发作后及时停药,防止药物不良反应

119、癫痫强阵挛发作时防窒息的护理不包括

- A.解开衣领裤带
- B.头低偏向一侧
- C.托起下颌,舌拉出
- D.喂水稀释痰液
- E.吸出口腔液体

120、下列哪一项是出血性脑血管疾病的主要治疗措施

- A.应用血管扩张剂
- B.抗凝治疗
- C.血液扩充剂治疗
- D.应用止血药物
- E.降低颅血压和控制血压