

## 2021 年 6 月临床执业医师月度考试（第二单元）

- 1、（A1 型选择题）单纯性鞘膜积液最可靠的诊断是
- A.阴囊肿大
  - B.透光试验阳性
  - C.阴囊肿块有波动感
  - D.阴囊肿大表面光滑
  - E.右侧阴囊无睾丸
- 2、（A1 型选择题）下列不是女性外生殖器官血液供应主要来源的是
- A.卵巢动脉
  - B.髂外动脉
  - C.子宫动脉
  - D.阴道动脉
  - E.阴部内动脉
- 3、（A1 型选择题）能改善稳定型心绞痛患者临床预后的是
- A.尿素酶

B.速效救心丸

C.阿司匹林

D.硝酸甘油

E.利多卡因

4、（A1 型选择题）下列与结肠癌关系最密切的疾病是

A.回盲部结核

B.溃疡性结肠炎

C.家族性结肠息肉病

D.血吸虫性肉芽肿

E.克罗恩病

5、（A1 型选择题）可将肝外组织胆固醇转运至肝的主要脂蛋白是

A.LDL

B.CM

C.IDL

D.HDL

E.VLDL

6、（A1 型选择题）附睾结核多继发于

- A.骨结核
- B.肾结核
- C.淋巴结核
- D.肠结核
- E.肺结核

7、（A1 型选择题）佝偻病颅骨软化多发于

- A.12 个月以上
- B.9~12 个月
- C.6~9 个月
- D.3~6 个月
- E.1~3 个月

8、（A1 型选择题）急性胆囊炎的临床表现不包括

- A.右上腹持续性痛并阵发性加重
- B.右上腹压痛
- C.右上腹局限性肌紧张

D.可伴有右肩部不适症状

E.大多伴有黄疸

9、（A1 型选择题）进行膳食调查的主要目的是

A.了解有无膳食缺乏症

B.了解体内的营养素水平

C.了解机体营养情况

D.是营养不足或缺乏的检查

E.了解膳食组成及营养素摄取情况

10、（A1 型选择题）体内细胞色素 C 直接参与的反应是

A.糖酵解

B.脂肪酸合成

C.生物氧化

D.肽键合成

E.叶酸还原

11、（A1 型选择题）有关糖尿病的诊断，正确的是

A.空腹血糖正常可排除糖尿病

B.空腹血糖 $\geq 7.0\text{mmol/L}$  是重要的诊断指标

C.两次 OGTT 仍不能诊断时应做第 3 次

D.糖耐量减低是糖尿病的一个亚型

E.尿糖阴性可排除糖尿病

12、（A1 型选择题）胃食管反流病的主要发病机制不包括

A.胃排空异常

B.下食管括约肌压力降低

C.异常的下食管括约肌一过性松弛

D.夜间胃酸分泌过多

E.食管酸清除能力下降

13、（A1 型选择题）下列提示糖尿病微血管病变的是

A.足部溃疡

B.高血压

C.脑卒中

D.心肌梗死

E.眼底出血

14、（A1 型选择题）对诊断门静脉高压最有价值的依据是

- A.肝功能异常
- B.食管胃底静脉曲张
- C.脾大和脾功能亢进
- D.腹水征阳性
- E.肝掌阳性

15、（A1 型选择题）发生外科感染的必要条件不包括

- A.外界病菌大量侵入组织
- B.人体正常菌群变成病菌
- C.病菌在组织内大量繁殖
- D.组织内需要有氧环境
- E.人体抵抗力有一定缺陷

16、（A1 型选择题）导致胎儿生长受限最常见的病因是

- A.胎盘早剥
- B.臀先露
- C.前置胎盘

D.孕妇因素

E.脐带因素

17、（A1 型选择题）婴幼儿时期，外界刺激不易在大脑皮层形成明确兴奋灶的原因是

A.神经元少

B.树突、轴突少

C.神经髓鞘形成和发育不完善

D.神经元体积小

E.树突轴突短

18、（A1 型选择题）室间隔缺损、房间隔缺损、动脉导管未闭及法洛四联症，上述的先天性心脏病患儿平时最常见的并发症是

A.心律失常

B.脑栓塞

C.肺炎

D.喉返神经麻痹

E.感染性心内膜炎

19、（A1 型选择题）以下不是肺血栓栓塞症体征的是

- A.发绀
- B.肺部湿啰音
- C.频发室性期前收缩
- D.颈静脉充盈或异常波动
- E.心动过速

20、（A1 型选择题）CO 中毒时下列不正确的是

- A.老人和孩子易患
- B.老人应与脑血管意外鉴别
- C.严重中毒血液 COHb 浓度可高于 50%
- D.迟发脑病恢复较慢
- E.应立即原地抢救

21、（A1 型选择题）鉴别上尿路结石与腹腔钙化灶常用的检查方法是

- A.静脉尿路造影
- B.CT
- C.MRI



D.B 超

E.腹部侧位 X 线平片

22、（A1 型选择题）最有助于自身免疫性胃炎诊断的实验室检查是

A.胃酸测定

B.血胃蛋白酶原定量

C.胃液中胃蛋白定量

D.血清壁细胞抗体检测

E.血清促胃液素测定

23、（A1 型选择题）提示室性心动过速的特征性心电图改变是

A.室性融合波

B.QRS 波群电交替

C.P 波与 QRS 波群传导比例为 1 : 2

D.QRS 波群至逆传 P 波的时间  $< 0.10$  秒

E.心动过速由房性期前收缩诱发

24、（A1 型选择题）大量出汗时尿量减少，主要原因是

A.血浆晶体渗透压升高，引起 ADH 分泌增多

- B.血浆胶体渗透压升高,导致肾小球滤过减少
- C.肾素-血管紧张素系统活动增强,可引起醛固酮分泌增多
- D.交感神经兴奋,引起肾小球滤过减少
- E.血容量减少,导致肾小球滤过减小

25、(A1型选择题)休克在微循环衰竭期最突出的情况是

- A.代谢性碱中毒
- B.后括约肌收缩状态
- C.血管内高凝状态
- D.前括约肌收缩状态
- E.毛细血管内可进可出

26、(A1型选择题)提示结核性脑膜炎进入晚期的临床表现是

- A.性格改变
- B.脑膜刺激征
- C.颅神经障碍
- D.昏迷、频繁惊厥
- E.肢体瘫痪或偏瘫

27、（A1 型选择题）根治原发性肝癌最好的方法是

- A.化学抗癌药物治疗
- B.放射治疗
- C.手术切除治疗
- D.中医治疗
- E.生物和免疫治疗

28、（A1 型选择题）对判断白细胞分布异常最有意义的检查是

- A.骨髓造血干细胞培养
- B.肾上腺素试验
- C.白细胞聚集试验
- D.骨髓细胞学检查
- E.氢化可的松试验

29、（A1 型选择题）导致新生儿胆红素生成过多的疾病是

- A.先天性胆道闭锁
- B.先天性甲状腺功能减退症
- C.新生儿败血症

D.新生儿窒息

E.胆汁黏稠综合征

30、（A1 型选择题）非特异性感觉投射的临床特点正确的是

A.不通过脑干网状结构上行激动系统起作用

B.与大脑皮层具有点对点的投射关系

C.为单突触传递系统

D.没有专一的感觉传导功能

E.不易受巴比妥类药物的影响

31、（A1 型选择题）经产妇，足月活胎可经阴道娩出的胎位是

A.肩右后位

B.肩左后位

C.枕右后位

D.颞左后位

E.颞右后位

32、（A1 型选择题）医务人员彼此协作的基础是

A.没有分歧

- B.彼此独立
- C.互相学习
- D.互相信任
- E.彼此竞争

33、（A1 型选择题）下列按照假药论处的是

- A.超过有效期的药品
- B.更改有效期的药品
- C.所注明的适应证超出规定范围的药品
- D.药品成分的含量不符合国家药品标准的药品
- E.未注明有效期的药品

34、（A1 型选择题）在血吸虫发育各阶段中，引起人主要病理改变的是

- A.尾蚴
- B.虫卵
- C.成虫
- D.幼虫
- E.毛蚴

35、（A1 型选择题）急性梗阻性化脓性胆管炎特征性的表现是

A.Trendelenburg 征

B.Whipple 三联征

C.Murphy 征

D.Babinski 征

E.Reynolds 五联征

36、（A1 型选择题）外科治疗肝硬化门静脉高压症公认的重点是

A.预防肝癌

B.控制腹水

C.治疗和预防出血

D.防治门静脉高压性胃病

E.治疗脾功能亢进

37、（A1 型选择题）急性乳腺炎的重要病因是

A.全身和局部抵抗力下降

B.哺乳次数增多

C.乳腺组织发育不良

D.乳汁瘀积并细菌入侵

E.乳腺分泌障碍 38.最容易引起枕骨大

38、（A1 型选择题）最容易引起枕骨大孔疝的颅内占位性病变是

A.颞叶肿瘤

B.侧脑室肿瘤

C.第二脑室肿瘤

D.第四脑室肿瘤

E.鞍区肿瘤

39、（A1 型选择题）正常人时间肺活量第 1 秒末呼出气量占肺活量的百分比是

A.60%

B.70%

C.75%

D.80%

E.90%

40、（A1 型选择题）肝硬化最严重的并发症是

- A.肝肾综合征
- B.原发性腹膜炎
- C.肝性脑病
- D.电解质紊乱
- E.上消化道出血

41、（A1 型选择题）临床上老年人最常见的腹外疝是

- A.腹股沟直疝
- B.股疝
- C.脐疝
- D.腹股沟斜疝
- E.腹壁疝

42、（A1 型选择题）幼儿急疹的出疹时间是

- A.先出疹后退热
- B.边出疹边退热
- C.退热后出疹
- D.出疹 1~2 天后退热



E.出疹 3~5 天后退热

43、（A1 型选择题）内痔的早期症状是

A.排便时出血

B.内痔脱出

C.里急后重

D.肛门瘙痒

E.排便时疼痛

44、（A1 型选择题）急性肾小球肾炎水肿的主要机制为

A.低蛋白血症

B.肾小球滤过率下降，水钠潴留

C.毛细血管通透性增加

D.继发性醛固酮增多症

E.抗利尿激素增加

45、（A1 型选择题）不属于硝酸甘油药理作用机制的是

A.降低室壁肌张力

B.降低心肌耗氧量

C.扩张心外膜血管

D.降低交感神经活性

E.降低左心室舒张末压

46、（A1 型选择题）肝硬化时，脾大的主要原因是

A.脾内纤维组织增生

B.脾窦巨噬细胞增多

C.脾内淋巴细胞聚集

D.脾窦扩张红细胞淤滞

E.脾小体多量中性粒细胞浸润

47、（A1 型选择题）体内脂肪大量动员时，肝内生的乙酰辅酶 A 可生成的是

A.葡萄糖

B.酮体

C.胆固醇

D.草酰乙酸

E.二氧化碳和水

48、（A1 型选择题）内科的心身疾病一般不包括

- A.冠心病
- B.高血压
- C.肺结核
- D.支气管哮喘
- E.消化性溃疡

49、（A1 型选择题）痛风患者合并的泌尿系结石最可能是

- A.草酸钙结石
- B.磷酸盐结石
- C.碳酸盐结石
- D.黄嘌呤结石
- E.尿酸结石

50、（A1 型选择题）在骨骼肌兴奋-收缩偶联中起关键作用的离子是

- A.Na<sup>+</sup>
- B.K<sup>+</sup>
- C.Mg<sup>2+</sup>

D.Ca<sup>2+</sup>

E.Cl<sup>-</sup>

51、（A1 型选择题）病因不明的急性腹膜炎行剖腹探查时，手术切口一般多选择

A.右旁正中

B.右肋缘下

C.左肋缘下

D.正中

E.左旁正中

52、（A1 型选择题）颅底骨折通常的诊断依据是

A.昏迷

B.头痛伴呕吐

C.偏瘫头皮血肿

D.视力模糊

E.脑脊液鼻、耳漏

53、（A1 型选择题）硬脑膜外血肿的典型特征是

A.伤后当时立即出现的昏迷时间较长

B.CT 示皮髓质交界处多个点状出血点

C.伤后一过性意识清醒或好转

D.鼻出血

E.伤后逆行性遗忘

54、（A1 型选择题）长期淤血导致肝硬化的基本病理变化是

A.肝细胞坏死

B.肝细胞缺氧改变

C.大量肝小叶改建

D.大量肝细胞脂肪变性

E.大量肝细胞嗜酸性变性

55、（A1 型选择题）上唇部疔或痈的主要危险是导致

A.颈部蜂窝织炎

B.大脑脓肿

C.眼球感染

D.海绵窦静脉炎

E.上颌骨髓炎

56、（A1 型选择题）乳腺癌局部表现中提示预后最差的是

- A.乳头内陷，偏向一侧
- B.乳头湿疹样变
- C.局部皮肤凹陷，呈“酒窝征”
- D.皮肤红肿、炎症样变
- E.皮肤呈橘皮样变

57、（A1 型选择题）颌下、颈部发生急性蜂窝织炎，最危险的并发症是

- A.脓毒血症
- B.吞咽困难
- C.呼吸困难、窒息
- D.化脓性颌下腺炎
- E.面部感染

58、（A1 型选择题）血源性肺脓肿最常见的病原体是

- A.流感嗜血杆菌
- B.肺炎克雷伯杆菌

C.金黄色葡萄球菌

D.铜绿假单胞菌

E.肺炎链球菌

59、（A1 型选择题）根据传染病法的规定，不属于乙类传染病的是

A.艾滋病

B.脊髓灰质炎

C.霍乱

D.梅毒

E.麻疹

60、（A1 型选择题）适宜卡介苗接种的主要对象是

A.结核性脑膜炎

B.结核菌素试验阳性者

C.严重的结核病患者

D.细胞免疫功能低下者

E.新生儿及结核菌素试验阴的儿童

61、（A1 型选择题）细菌细胞壁特有的成分是

- A.外膜
- B.肽聚糖
- C.脂蛋白
- D.脂多糖
- E.类脂

62、（A1 型选择题）有助于诊断肝性脑病的血液实验室检查指标是

- A.球蛋白
- B.丙氨酸氨基转移酶
- C.白蛋白
- D.血氨
- E.血小板计数

63、（A1 型选择题）佩戴金属首饰后局部皮肤出现炎症反应，其免疫病理基础可能是

- A.Arthus 反应
- B.IV型超敏反应
- C.Ⅲ型超敏反应



D. II型超敏反应

E. I型超敏反应

64、（A1型选择题）严重心力衰竭，治疗频发室性期前收缩首选的药物是

A.多巴酚丁胺

B.索他洛尔

C.胺碘酮

D.氟卡尼

E.普罗帕酮

65、（A1型选择题）严重外伤患者发生脂肪栓塞综合征，该综合征主要累及的部位是

A.胰

B.肾

C.肺

D.骨

E.肝

66、（A2型选择题）男，40岁。2周前搬重物时出现腰部疼痛，排便时加

重，并向左下肢放射，逐渐出现左小腿皮肤感觉减退。查体:腰部活动受限，左侧直腿抬高 40°出现左下肢放射性疼痛。腰椎 X 线片未见异常。最可能的诊断是

- A. 腰椎肿瘤
- B. 腰椎间盘突出症
- C. 腰椎管狭窄症
- D. 强直性脊柱炎
- E. 腰扭伤

67、（A2 型选择题）女，40 岁。因原发性甲状腺功能亢进症在气管内插管全麻下行甲状腺双侧次全切除术，术后清醒拔出气管插管,后患者出现呼吸困难，伴有失音，无手足麻木。查体：T37.2°C,P90 次/分，R27 次/分，BP130/75mmHg，面红无发绀，颈部不肿，引流管通畅，有少许血液流出。引起该患者呼吸困难最可能的原因是

- A. 喉上神经损伤
- B. 伤口出血
- C. 甲亢危象
- D. 甲状旁腺损伤
- E. 双侧喉返神经损伤

68、（A2 型选择题）女，36 岁。发现颈部包块 2 年，包块逐渐增大，无甲亢表现，目前有憋闷感。查体：右侧甲状腺可触及 4cm×3cm 包块，光滑，质韧，随吞咽上下移动，无压痛，未触及肿大淋巴结。核素扫描：甲状腺右叶温结节。建议手术治疗，最主要的依据是

- A. 易发生继发感染
- B. 用力后包块易破裂
- C. 有压迫症状
- D. 可继发甲亢
- E. 易发生恶变

69、（A2 型选择题）男，36 岁。呕血 1 小时。患肝硬化门静脉高压症多年。查体：巩膜黄染，中等量腹水。血白蛋白 25g/L。应首选的治疗方法是

- A. 断流手术
- B. 选择性门体分流术
- C. 非选择性门体分流术
- D. 三腔二囊管压迫止血
- E. 经颈静脉肝内门体分流术

70、（A2 型选择题）女，18 岁。额部多发性疖肿，未治，红肿扩大，弛张

性高热，4天后臀部皮下又发现一肿块，疼痛，压痛明显，且有波动感。治疗方案为

- A. 醇浴退热
- B. 额部疔肿换药
- C. 综合应用多种抗生素
- D. 加强营养，增强抵抗力
- E. 臀部脓肿切开引流及抗生素治疗

71、（A2型选择题）女，66岁。6个月前无明确原因咳嗽、咳痰，痰中带血。MRI示大脑半球皮质多个小类圆形低信号影。诊断是

- A. 脑蛔虫
- B. 脑脓肿
- C. 脑梗死
- D. 脑软化灶
- E. 脑转移瘤

72、（A2型选择题）女，47岁。体检发现右肾下有2cm×2cm占位病变，IVU尿路造影未见右肾盂肾盏形态改变，CT诊断右肾下级恶性肿瘤，左肾形态和功能正常。下面治疗方案正确的是

- A.右肾切除
- B.根治性右肾切除
- C.右肾部分切除
- D.右肾动脉栓塞
- E.右肾部分切除加放化疗

73、（A2 型选择题）女，20 岁。右腕部被刀割伤 3 小时。查体：右手小指掌背侧及环指尺侧感觉障碍。损伤的神经是

- A.腋神经
- B.桡神经
- C.尺神经
- D.肌皮神经
- E.正中神经

74、（A2 型选择题）男，50 岁。身高 170cm，体重 65kg，每天所需基本热量约为

- A.1035kcal
- B.1235kcal

C.1425kcal

D.1625kcal

E.2560kcal

75、（A2 型选择题）女,50 岁。肝硬化病史 6 年，大量放腹腔积液后出现睡眠障碍，扑翼样震颤，脑电异常。最可能的诊断是

A.亚临床肝性脑病

B.肝性脑病Ⅳ级

C.肝性脑病Ⅲ级

D.肝性脑病Ⅱ级

E.肝性脑病Ⅰ级

76、（A2 型选择题）女，26 岁。腹泻半天，于 8 月 15 日来诊。腹泻 30 多次，开始为稀便，后为水样便，继之多次呕吐。查体：T36.5°C，P110/分，BP60/40mmHg，神志清楚，皮肤干燥，弹性差，腹软，无压痛。粪常规:水样便，镜检 WBC0~3/HP，RBC0~2/HP。最可能的诊断是

A.胃肠型细菌性食物中毒

B.霍乱

C.急性细菌性痢疾

D.溃疡性结肠炎

E.阿米巴痢疾

77、（A2型选择题）男，60岁。酒精性肝硬化15年。1个月前出现右上腹胀痛，低热，体重下降。最可能的诊断为

A.肝脓肿

B.肝血管瘤

C.肝囊肿

D.胃癌

E.原发性肝癌

78、（A2型选择题）女，60岁。上腹痛2小时，伴恶心、呕吐2次，为胃内容物。在下列疾病诊断中，可能性最小的是

A.心肌梗死

B.急性胰腺炎

C.急性阑尾炎

D.急性胃炎

E.梅尼埃综合征

79、（A2 型选择题）男，68 岁。排尿困难 2 年，腹部平片提示膀胱区有 2cm 椭圆形致密影，典型的临床表现是

- A.膀胱刺激征
- B.进行性排尿困难
- C.血尿
- D.尿流中断，改变体位后好转
- E.腰痛，血尿，脓尿

80、（A2 型选择题）女，39 岁。发作性心悸，头痛，大汗，发作时血压 230/130mmHg。平素血压不高，对诊断最有帮助的是发作时测定

- A.蛋白质
- B.儿茶酚胺
- C.钾、钠、氯
- D.钙、磷
- E.游离皮质醇

81、（A2 型选择题）女，16 岁。月经初潮后 1 年，月经期 1~4 个月，经量多，伴血块，止血首先应选择

- A.雄激素



B.大剂量雌激素

C.孕激素

D.雌、孕激素联合法

E.刮宫术

82、（A2 型选择题）女，50 岁。头部棍击伤，无昏迷史及意识障碍，无颅骨骨折，1 个月后出现颅内高压症状。最可能的诊断是

A.慢性硬膜下血肿

B.多发颅内血肿

C.慢性硬膜外血肿

D.急性颅内血肿

E.脑震荡后遗症

83、（A2 型选择题）女，38 岁。吞咽困难 30 天，不能进水 2 天，口渴、尿少、体重下降。查体 26 次/分，BP80/50mmHg，神志清楚，烦躁。血 Na<sup>+</sup>152mmol/L,血 K<sup>+</sup>3.2mmol/L、HCO<sup>-</sup>318mmol/L、PaCO<sub>2</sub>38mmHg。首要的处理措施应是

A.氧疗

B.补充血容量

C.纠正酸碱失衡

D.有控制的补充血钾

E.应用升压药

84、（A2型选择题）女,25岁。尿频、尿急、尿痛2天,无发热及腰痛,既往无类似发作。查体:双肾区无叩击痛,血WBC $5.4 \times 10^9/L$ ,尿WBC $30 \sim 40/HP$ ,RBC $10 \sim 15/HP$ ,亚硝酸盐(+)。该患者抗感染治疗疗程应为

A.3天

B.7天

C.10天

D.2周

E.4周

85、（A2型选择题）女,18岁。9个月前开始右上臂肿胀、疼痛,诊断为右肱骨上端骨肉瘤,优选的治疗方案是

A.化疗加放疗

B.化疗

C.术前化疗加根治性手术加术后放疗

D.肿瘤刮除术

## E.左肩关节离断术

86、（A2 型选择题）女，50 岁。月经不规则 3 年余，阴道不规则流血 30 天。查体：中度贫血貌，子宫略大，稍软，无压痛，宫旁未触及异常。为确定诊断，首选的检查是

A.盆腔 CT 检查

B.尿 hCG 测定

C.盆腔 B 超

D.分段诊刮

E.阴道镜检查

87、（A2 型选择题）女婴，7 个月。平时多汗，有夜惊，枕秃明显，易激惹，烦躁，睡眠不安。早期诊断最可靠的指标是

A.血 25-(OH) D3 升高

B.血 25-(OH) D3 下降

C.维生素 C

D.血清钙、磷

E.骨密度

88、（A2 型选择题）女，63 岁。COPD 急性发作伴发热。使用头孢他啶 10

天，体温曾降至正常，症状缓解 3 天后再次出现高热。检查发现口腔黏膜有白色念珠菌感染。此时抗生素拟改用

- A. 红霉素
- B. 氟霉素
- C. 青霉素
- D. 环丙沙星
- E. 两性霉素 B

89、（A2 型选择题）女，40 岁。便血、面色苍白 3 个月。血常规：Hb60g/L，MCV72fl，MCHC27%，WBC $8.0 \times 10^9/L$ ，PLT $38 \times 10^9/L$ ，网织红细胞 0.025。最可能出现的特有临床表现是

- A. 皮肤瘀斑
- B. 肝脾大
- C. 酱油色尿
- D. 巩膜黄染
- E. 匙状甲

90、（A2 型选择题）女，28 岁。颈部肿块 7 天，可随吞咽上下活动，欲确诊病变的性质，应采取的诊断方法为

- A. 甲状腺 B 超
- B. 甲状腺 CT
- C. 甲状腺功能测定
- D. 甲状腺同位素测定
- E. 细针穿刺细胞学检查

91、（A2 型选择题）女，50 岁。右季肋部胀痛 1 个月余。查体：无黄疸，肝肋缘下 3cm，质硬，无腹水征。B 超示肝右叶低回声病灶，约 11cm×10cm，肝左叶见多个小低回声区。AFP>1000μg/L。最佳的治疗措施是

- A. 放射治疗
- B. 抗感染治疗
- C. 中草药治疗
- D. 剖腹探查术
- E. 肝动脉插管栓塞化疗

92、（A2 型选择题）女，30 岁。外阴瘙痒伴烧灼感 4 天。妇科检查见外阴局部充血、小阴唇内侧及阴道黏膜表面有白色状薄膜或凝乳状物。诊断是

- A. 细菌性阴道炎
- B. 滴虫性阴道炎

C.萎缩性阴道炎

D.淋病性阴道炎

E.外阴阴道念珠菌病

93、（A2型选择题）女,28岁。继发不孕3年,经后4天突起高热、寒战、下腹痛,右侧疼痛更甚。血压110/80mmHg, P120次/分,体温39°C,下腹轻压痛。白细胞 $18 \times 10^9/L$ ,中性粒细胞80%。复查:宫颈稍大稍软,有压痛,双侧附件增厚,压痛。诊断为

A.急性阑尾炎

B.急性盆腔腹膜炎

C.急性盆腔结缔组织炎

D.急性子宫内膜炎

E.以上均不是

94、（A2型选择题）男,56岁。因吞咽、饮水困难2周,现有乏力、尿少、极度口渴来诊。查体:血压正常,唇干,眼窝凹陷,烦躁不安,出现躁狂、幻觉,有时昏迷。该患者应考虑为

A.中度等渗性缺水

B.重度高渗性缺水

C.重度等渗性缺水

D.中度低渗性缺水

E.中度高渗性缺水

95、（A2型选择题）女，35岁。上腹胀伴恶心、呕吐20天。进食后上腹胀明显，恶心，有时呕吐所进食物，无发热。5个月前曾撞伤上腹部。查体：无贫血，无黄染，上腹部隆起，可触及18cm×14cm囊性包块，不活动，无压痛。钡餐透视见胃大弯受压上抬，横结肠下移。最可能的诊断是

A.胰腺假性囊肿

B.腹膜后血肿

C.胰腺囊肿

D.肠系膜囊肿

E.胰腺囊腺瘤

96、（A2型选择题）男，35岁。健康查体时ECG发现偶发房性期前收缩。既往体健。查体：心界不大，心率81次/分，心脏各瓣膜区未闻及杂音。该患者最恰当的处理措施是

A.静脉注射利多卡因

B.口服普罗帕酮

- C.口服美西律片
- D.口服胺碘酮
- E.寻找病因，定期随诊

97、（A2 型选择题）女,70 岁。因高血压、冠心病口服阿司匹林,一天前因胸闷、心前区疼痛就诊。检查心肌酶谱中的磷酸肌酸激酶水平明显升高,原因可能是

- A.胃溃疡
- B.心肌梗死
- C.肝脏占位
- D.药物副作用
- E.深静脉血栓形成

98、（A2 型选择题）女, 50 岁。绝经 3 年, 阴道脱出肿物, 检查宫颈及部分宫体脱出阴口外。患者治疗采用的方式是

- A.阴道前壁修补术
- B.Manchester 手术
- C.阴道纵隔形成术
- D.子宫悬吊术



## E.经阴道子宫全切及阴道前后壁修补术

99、（A2 型选择题）上腹部汽车撞伤 4 小时，患者面色苍白，四肢厥冷，脉搏 140 次/分，血压 60/40mmHg，全腹轻度压痛、肌紧张及反跳痛。首先考虑为

- A.肝脾破裂
- B.十二指肠破裂
- C.胃破裂
- D.严重的腹壁软组织损伤
- E.腹膜后血肿

100、（A2 型选择题）男，32 岁。间断咳嗽、咳痰伴咯血 20 年，行 HRCT 检查示右中叶支气管囊状扩张，其余肺叶未见异常。今日再次咯血，量约 200ml，给予静脉滴注垂体后叶素治疗，效果欠佳。该患者宜选择的最佳治疗措施为

- A.静脉滴注鱼精蛋白
- B.换用酚妥拉明静脉滴注
- C.支气管镜下止血
- D.支气管动脉栓塞

## E.手术切除病变肺

101、（A2 型选择题）男，20 岁。头晕、呕吐伴流涎半小时。1 小时前曾少量饮酒并进食较多凉拌蔬菜。查体：P55 次/分，BP100/70mmHg，神志清晰，皮肤潮湿，双瞳孔针尖样大小，双下肺可闻及湿啰音。最可能的诊断是

A.亚硝酸盐中毒

B.杀鼠药中毒

C.吗啡中毒

D.乙醇中毒

E.有机磷农药中毒

102、（A2 型选择题）患儿女，13 岁。咳嗽、发热 3 天。双肺闻及散在的细湿啰音及广泛呼吸时哮鸣音。血常规：白细胞  $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 60%。胸片正位片：两下肺散在斑片状影。诊断最可能是

A.合胞病毒肺炎

B.支原体肺炎

C.支气管肺炎

D.腺病毒肺炎

E.金黄色葡萄球菌肺炎

103、（A2 型选择题）男，25 岁。腰背痛 2 年。下腰段及骶髂关节压痛，腰椎活明显受限。X 线片示双侧骶髂关节虫蚀样破坏，脊柱呈“竹节样”改变。最可能的诊断是

- A. 化脓性脊柱炎
- B. 腰椎肿瘤
- C. 腰椎结核
- D. 腰椎间盘突出症
- E. 强直性脊柱炎

104、（A2 型选择题）女，37 岁。间断上腹痛 5 年，空腹时出现。HP（+）。应选择的联合治疗方案的是

- A. 奥美拉唑+CBS+两种抗生素
- B. 奥美拉唑+阿托品
- C. 硫糖铝+阿托品+抗生素
- D. 前列腺素+硫糖铝
- E. 法莫替丁+抗生素

105、（A2 型选择题）女，58 岁。2 年来间断出现活动时胸闷，休息时可缓解，近 4 个月无胸闷发作。查体：BP130/85mmHg，心率 72 次/分，心脏各瓣

膜区未闻及杂音。最有助于明确诊断的检查是

- A.放射性核素静态心肌造影
- B.动态心电图
- C.超声心动图
- D.胸部 X 线片
- E.心电图运动负荷试验

106、（A2 型选择题）女，61 岁。宫颈癌行子宫切除术后 3 天，晨起时突发左小腿疼痛，左足不能着地踏平，行走时疼痛加重。查体：左小腿肿胀，深压痛，足背动脉搏动存在。首选的检查为

- A.同位素骨扫描
- B.下肢 CT
- C.下肢 X 线平片
- D.下肢超声多普勒
- E.下肢 MRI

107、（A2 型选择题）男，40 岁。腹痛 16 小时，呈持续性,阵发性加重,伴呕吐，无肛门排气。查体:全腹肌紧张，有压痛及反跳痛。行腹腔穿刺抽出的液体呈血性，伴臭味。最可能的断是

- A.结核性腹膜炎
- B.胃十二直肠穿孔
- C.急性阑尾炎穿孔
- D.绞窄性肠梗阻
- E.急性重症胰腺炎

108、（A2 型选择题）男，65 岁。间断腹胀、上腹隐痛 25 年。胃镜检查提示：胃体黏膜变薄，血管透见，皱襞稀疏。患者可能缺乏的维生素是

- A.维生素 C
- B.维生素 D
- C.维生素 B2
- D.维生素 B4
- E.维生素 B12

109、（A2 型选择题）男，65 岁。摔倒时右手撑地，腕部疼痛、肿胀。查体：右腕部呈“枪刺刀”畸形。最可能是

- A.Galeazzi 骨折
- B.Smith 骨折

C.Monteggia 骨折

D.Chance 骨折

E.Colles 骨折

110、（A2 型选择题）女，73 岁。9 年前因心肌梗死住院。3 年前出现活动后气短，夜间憋醒，近 1 年双下肢水肿，少尿。查体：BP140/90mmHg，颈静脉怒张，双下肺可闻及细湿啰音，心界向两侧扩大，心率 110 次/分，肝肋下 3cm，质中，压痛（+），双下肢水肿。该患者可能的诊断是

A.全心衰竭

B.右心衰竭

C.心功能Ⅲ级（NYHA 分级）

D.左心衰竭

E.心功能Ⅲ级（Killip 分级）

111、（B1 型选择题）女，60 岁。腹胀、右下腹部隐痛 6 个月，阵发性腹痛、乏力、消瘦，近 3 个月贫血。首先应考虑的诊断是

A.降结肠癌

B.升结肠癌

C.克罗恩病

D.溃疡性结肠炎

E.小肠肿瘤

112、（B1 型选择题）男，23 岁。腹痛、腹泻、便秘交替 2 年，便无脓血和黏液。近 1 年来消瘦、乏力、贫血，下午有时低热。首先考虑的诊断是

A.降结肠癌

B.升结肠癌

C.克罗恩病

D.溃疡性结肠炎

E.小肠肿瘤

113、（B1 型选择题）治疗铜绿假单胞菌感染首选的药物是

A.磺胺嘧啶

B.四环素

C.异烟肼

D.环丙沙星

E.甲氧苄啶

114、（B1 型选择题）治疗结核病选用的药物是

A.磺胺嘧啶

B.四环素

C.异烟肼

D.环丙沙星

E.甲氧苄啶

115、（B1 型选择题）葡萄胎时主要增高的是

A.血淀粉酶检测

B.血清甲胎蛋白检测

C.腹部 CT 检查

D.绒毛膜激素

E.血 CEA

116、（B1 型选择题）肝细胞肝癌时主要增高的是

A.血淀粉酶检测

B.血清甲胎蛋白检测

C.腹部 CT 检查

D.绒毛膜激素



E.血 CEA

117、（B1 型选择题）登革病毒的传播方式是经

A.呼吸道传播

B.消化道传播

C.血液传播

D.虫媒传播

E.性接触传播

118、（B1 型选择题）人乳头瘤病毒的传播方式是经

A.呼吸道传播

B.消化道传播

C.血液传播

D.虫媒传播

E.性接触传播

119、（B1 型选择题）延缓肠道碳水化合物吸收的药物是

A.罗格列酮

B.吡格列酮

C.阿卡波糖

D.格列齐特

E.二甲双胍

120、（B1 型选择题）促进胰岛素分泌的药物是

A.罗格列酮

B.吡格列酮

C.阿卡波糖

D.格列齐特

E.二甲双胍

121、（B1 型选择题）心动周期中，主动脉压的最低值是

A.收缩压

B.循环系统平均充盈压

C.脉压

D.舒张压

E.平均动脉压

122、（B1 型选择题）心动周期中，主动脉压的最高值是

A.收缩压

B.循环系统平均充盈压

C.脉压

D.舒张压

E.平均动脉压

123、（B1 型选择题）心动周期中，主动脉压的最高值与最低值之差是

A.收缩压

B.循环系统平均充盈压

C.脉压

D.舒张压

E.平均动脉压

124、（B1 型选择题）具有降压作用的利尿药物是

A.硝苯地平

B.普萘洛尔

C.卡托普利

D.氢氯噻嗪

E.哌唑嗪

125、（B1 型选择题）适用于早期糖尿病肾病的降压药物是

A.硝苯地平

B.普萘洛尔

C.卡托普利

D.氢氯噻嗪

E.哌唑嗪

126、（B1 型选择题）卵巢黄体功能不全，子宫内膜的表现是

A.月经 5~6 日刮宫，子宫内膜呈分泌型

B.月经 5~6 日刮宫，子宫内膜呈增生期和分泌期并存

C.经前诊断性刮宫，子宫内膜呈脱膜反应

D.经前诊断性刮宫，子宫内膜呈增生型

E.经前诊断性刮宫，子宫内膜呈分泌不良

127、（B1 型选择题）无排卵性功能失调性子宫出血，子宫内的表现是

A.月经 5~6 日刮宫，子宫内膜呈分泌型

B.月经 5~6 日刮宫，子宫内膜呈增生期和分泌期并存

C.经前诊断性刮宫，子宫内膜呈脱膜反应

D.经前诊断性刮宫，子宫内膜呈增生型

E.经前诊断性刮宫，子宫内膜呈分泌不良

128、（B1 型选择题）取得执业助理医师执业证书后，具有高等学校医学专科学历的，可以在医疗、预防、保健机构中工作满一定年限后报考执业医师资格考试的年限是

A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.4 年

E.5 年

129、（B1 型选择题）具有高等学校医学专业本科学历，报考执业医师资格考试的，需要在医疗、预防、保健机构中工作满一定年限，该年限是

A.1 年

B.2 年

C.3 年

D.4 年

E.5 年

130、（A3/A4 型选择题）男，35 岁。会阴部骑跨伤，受伤后尿道外口滴血，会阴部和阴囊处肿胀、瘀斑及蝶形血肿。该患者泌尿系损伤的部位是

- A.尿道球部
- B.尿道阴茎部
- C.膀胱
- D.尿道前列腺部
- E.尿道膜部

131、（A3/A4 型选择题）男，35 岁。会阴部骑跨伤，受伤后尿道外口滴血，会阴部和阴囊处肿胀、瘀斑及蝶形血肿。该患者最可能的诊断是

- A.后尿道挫裂伤
- B.膀胱破裂
- C.膀胱挫伤
- D.前尿道挫伤
- E.前尿道裂伤

132、（A3/A4 型选择题）初产妇，妊娠 38 周，8 小时前突然出现阴道流液，如尿样，6 小时前开始出现规律宫缩，因胎手脱出于阴道口 2 小时就诊。查

体：产妇烦躁不安，腹痛拒按，脉搏 110 次/分，呼吸 28 次/分，胎心 160 次/分，导尿时血尿。诊断首先考虑为

- A.胎膜早破
- B.先兆子宫破裂
- C.子宫破裂
- D.前置胎盘
- E.胎盘早剥

133、（A3/A4 型选择题）初产妇，妊娠 38 周，8 小时前突然出现阴道流液，如尿样，6 小时前开始出现规律宫缩，因胎手脱出于阴道口 2 小时就诊。查体：产妇烦躁不安，腹痛拒按，脉搏 110 次/分，呼吸 28 次/分，胎心 160 次/分，导尿时血尿。最适宜的处理是

- A.口服地西洋
- B.消毒后还纳肢体
- C.立即行剖宫产
- D.全麻下行内倒转术
- E.等待宫口开全后行牵引术

134、（A3/A4 型选择题）女，7 岁。发热、胸痛、气短一周余。查体：右

胸部饱满，叩诊呈浊音，右胸呼吸音减弱。实验室检查：白细胞  $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞分数 90%。胸透：右胸腔积液。应首先考虑为

A.胸导管损伤

B.癌性胸膜炎

C.急性脓胸

D.急性左心衰竭

E.结核性胸膜炎

135、（A3/A4 型选择题）女，7 岁。发热、胸痛、气短一周余。查体：右胸部饱满，叩诊呈浊音，右胸呼吸音减弱。实验室检查：白细胞  $20 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞分数 90%。胸透：右胸腔积液。首选诊断方法是

A.MRI

B.胸部 CT

C.纤维支气管镜

D.胸穿

E.B 超

136、（A3/A4 型选择题）女，50 岁。发热、咳脓痰 1 周。胸部 X 线片示右下叶背段浸润阴影。用头孢呋辛治疗体温稍下降，但痰量增多，为脓血痰，有



臭味。1 周后复查胸部 X 线片：大片浸润阴影中出现空洞。治疗中需加用的药物是

- A. 阿米卡星
- B. 甲硝唑
- C. 左氧氟沙星
- D. 红霉素
- E. 万古霉素

137、（A3/A4 型选择题）女，50 岁。发热、咳脓痰 1 周。胸部 X 线片示右下叶背段浸润阴影。用头孢呋辛治疗体温稍下降，但痰量增多，为脓血痰，有臭味。1 周后复查胸部 X 线片：大片浸润阴影中出现空洞。治疗 2 周后，患者临床症状明显改善，胸部 X 线片示空洞缩小。抗感染的总疗程应为

- A. 2~4 周
- B. 4~6 周
- C. 6~8 周
- D. 8~10 周
- E. 8~12 周

138、（A3/A4 型选择题）女，30 岁。急性腹膜炎术后 7 天，发热，为弛张

热，伴乏力、盗汗、纳差，右上腹、肋下持续性钝痛，深呼吸及咳嗽时疼痛加重。腹部 B 超及 CT 示肝右叶上方、膈肌下见 6cm×4cm 液气平面，诊断性穿刺可抽出脓液。如决定行切开引流，为防止脓液流入腹腔再次引起弥漫性腹膜炎，最主要的措施是

- A. 进入脓腔分离时，不要破坏粘连层
- B. 切开引流同时应用有效抗生素
- C. 选择合理切口，显露充分
- D. 麻醉效果良好，便于操作
- E. 吸净脓液，低压灌洗后留置负压引流

139、（A3/A4 型选择题）女，30 岁。急性腹膜炎术后 7 天，发热，为弛张热，伴乏力、盗汗、纳差，右上腹、肋下持续性钝痛，深呼吸及咳嗽时疼痛加重。腹部 B 超及 CT 示肝右叶上方、膈肌下见 6cm×4cm 液气平面，诊断性穿刺可抽出脓液。最常用的抗生素是

- A. 半合成青霉素
- B. 克林霉素
- C. 第三代头孢菌素
- D. 氨基苷类
- E. 第二代头孢菌素

140、（A3/A4 型选择题）女，13 岁。低热、咳嗽、咽部不适 2 周。胸部 X 线片示两肺下部网状及按小叶分布的斑片状浸润阴影。血 WBC $10 \times 10^9/L$ 。患者最可能的诊断是

A. 军团菌肺炎

B. 病毒性肺炎

C. 支原体肺炎

D. 肺炎球菌肺炎

E. 浸润型肺结核

141、（A3/A4 型选择题）女，13 岁。低热、咳嗽、咽部不适 2 周。胸部 X 线片示两肺下部网状及按小叶分布的斑片状浸润阴影。血 WBC $10 \times 10^9/L$ 。为确定诊断，首选的检查

A. 痰细菌培养

B. 痰真菌培养

C. 血清抗体测定

D. 冷凝集试验

E. 痰抗酸杆菌涂片

142、（A3/A4 型选择题）女，13 岁。低热、咳嗽、咽部不适 2 周。胸部 X

线片示两肺下部网状及按小叶分布的斑片状浸润阴影。血 WBC $10\times 10^9/L$ 。治疗首选药物是

- A. 红霉素
- B. 青霉素
- C. 氟康唑
- D. 异烟肼+利福平
- E. 利巴韦林

143、（A3/A4 型选择题）女，62 岁。咳嗽、咳痰伴喘息 20 余年，加重 1 周。2 天来发热、咳嗽、意识不清。血 WBC $12.8\times 10^9/L$ ，N0.82，SpO<sub>2</sub>85%（吸氧）。患者意识障碍最可能的原因是

- A. 脑血管病
- B. 低血糖
- C. 低钠血症
- D. 感染中毒性脑病
- E. 肺性脑病

144、（A3/A4 型选择题）女，62 岁。咳嗽、咳痰伴喘息 20 余年，加重 1 周。2 天来发热、咳嗽、意识不清。血 WBC $12.8\times 10^9/L$ ，N0.82，SpO<sub>2</sub>85%（吸

氧)。对于该患者最重要的治疗措施是

- A. 静脉滴注呼吸兴奋剂
- B. 静脉注射 10% 葡萄糖
- C. 静脉滴注 3% 氯化钠溶液
- D. 静脉滴注甘露醇
- E. 机械通气

145、(A3/A4 型选择题) 女, 40 岁。发现颈部肿物 3 个月, 无不适, 无结核病史。查体: 左颈部外侧中部有肿块, 2.5cm 大小, 活动, 无压痛, 甲状腺未触及结节。对该患者确诊最有意义的检查是

- A. MRI 检查
- B. PPD 试验
- C. B 超检查
- D. CT 检查
- E. 细针穿刺细胞学检查

146、(A3/A4 型选择题) 女, 40 岁。发现颈部肿物 3 个月, 无不适, 无结核病史。查体: 左颈部外侧中部有肿块, 2.5cm 大小, 活动, 无压痛, 甲状腺未触及结节。若以上的检查方法未能明确诊断, 而肿块仍在增大, 其进一步的检

查是

- A.用抗生素治疗、观察
- B.肿瘤标记物检查
- C.复查 MRI
- D.肿块切除活检
- E.同位素扫描

147、（A3/A4 型选择题）女，45 岁。脸圆、变红 1 年，体重增加、月经稀发 6 个月。查体：BP160/100mmHg，向心性肥胖，皮肤薄，面部痤疮较多，下颌小胡须，全身毳毛增多，腹部、大腿根部可见宽大紫纹。血钾 1.1mmol/L，空腹血糖 15.4mmol/L。该患者最可能的诊断是

- A.原发性醛固酮增多症
- B.原发性高血压
- C.女性男性化
- D.糖尿病
- E.库欣综合征

148、（A3/A4 型选择题）女，45 岁。脸圆、变红 1 年，体重增加、月经稀发 6 个月。查体：BP160/100mmHg，向心性肥胖，皮肤薄，面部痤疮较多，下

颌小胡须，全身毳毛增多，腹部、大腿根部可见宽大紫纹。血钾 1.1mmol/L，空腹血糖 15.4mmol/L。定性诊断最主要的检查是

- A.小剂量地塞米松试验
- B.血 ACTH 测定
- C.大剂量地塞米松试验
- D.血皮质醇测定
- E.血醛固酮测定

149、（A3/A4 型选择题）女,32 岁。G2P1 停经 70 天，下腹隐痛,阴道不规则流血 6 天，子宫达脐水平，尿 hCG（+）。首选的辅助检查是

- A.B 超检查
- B.盆腔 CT
- C.血 hCG
- D.诊断刮宫
- E.PPD 试验

150、（A3/A4 型选择题）女,32 岁。G2P1 停经 70 天，下腹隐痛,阴道不规则流血 6 天，子宫达脐水平，尿 hCG（+）。随访中无需常规检查的是

- A.hCG 定量测定

B.月经规律

C.胸片

D.定期 B 超检查

E.定期性激素水平测定

答案

1、 正确答案： B

答案解析： 解析:单纯睾丸鞘膜积液时可用透光试验确定 。

2、 正确答案： B

答案解析： ;解析:记忆题,女性生殖器官血供主要来自子宫动脉、卵巢动脉、阴道动脉及阴部内动脉 。

3、 正确答案： C

答案解析： 解析： 长期服用阿司匹林可出示粥样斑块稳定减少血栓形成，降低心梗的发病率 。 稳定性心绞痛能够改善预后的药物包括： 1 .阿司匹林； 2 .氯吡格雷； 3 . $\beta$  受体拮抗剂； 4 .他汀类药物； 5 .ACEI 或者 ARB 。



4、正确答案：C

答案解析：

5、正确答案：D

答案解析：解析：高密度脂蛋白(HDL)：它运载周围组织中的胆固醇至肝脏，再转化为胆汁酸或直接通过胆汁从肠道排出；极低密度脂蛋白(VLDL)：运输肝脏中合成的内源性甘油三酯；低密度脂蛋白(LDL)是由极低密度脂蛋白(VLDL)转变而来。主要功能是把胆固醇运输到全身各处细胞，运输到肝脏合成胆酸；乳糜微粒(CM)主要功能是运输外源性三酰甘油和胆固醇。

6、正确答案：B

答案解析：解析：结核菌通常由肾到前列腺、精囊，再到附睾；也有部分通过血行感染所致

7、正确答案：D

答案解析：佝偻病颅骨软化多发生于3-6月份，婴儿头骨软化的发生率相对较高

8、正确答案：E

答案解析：解析：急性胆囊炎较少伴有黄疸。

9、正确答案：E

答案解析：解析：膳食调查的目的是了解在一定时间内调查对象通过膳食

所摄取的热能和各种营养素的数量和质量，借此来评定正常营养需要能得到满足的程度。膳食调查是营养调查工作中的一个基本组成部分，它本身又是相对独立的内容，结合选项 E 项正确。

10、正确答案：C

答案解析：解析：细胞色素 C 参与生物氧化过程可以从呼吸链的组成中看出，氧化呼吸链是由 4 种具有传递电子能力的复合体组成，(1)复合体 I 作用是将  $\text{NADH}+\text{H}^+$  中的电子传递给泛醌(2)复合体 II 作用是将电子从琥珀酸传递到泛醌(3)复合体 III 作用是将电子从还原型泛醌传递给细胞色素 C(4)复合体 IV 将电子从细胞色素 C 传递给氧。

11、正确答案：B

答案解析：

12、正确答案：D

答案解析：解析：夜间胃酸分泌过多是十二指肠溃疡的发病机制。

13、正确答案：E

答案解析：解析：糖尿病微血管病变是指微小动脉和微小静脉之间管腔直径在  $100\mu\text{m}$  以下的主细血管及微血管网，微血管病变是糖尿病的特异性并发症其中尤以糖尿病肾病和视网膜病为重要。

14、正确答案：B

答案解析：解析:A、B、C、D、E 各项均可在肝硬化门静脉高压症时出现,但以食管下段、胃底静脉曲张(食管下段有蚯蚓样充盈缺损)最有价值 ;。

15、正确答案：D

答案解析：解析：外科感染的发生，总的来说，就是因为人体正常菌群变成病菌或者外界病菌大量侵入组织并在组织内大量繁殖，同时人体的抵抗能力有一定缺陷 。

16、正确答案：D

答案解析：孕妇重度子痫前期是导致胎儿生长受限最常见的病因。

17、正确答案：C

答案解析：解析：神经髓鞘形成和发育不完善使外界刺激不易在大脑皮层形成明确兴奋灶 。

18、正确答案：C

答案解析： ;解析:室间隔缺损,房间隔缺损,动脉导管未闭及法洛四联症均可造成左向右分流,使肺血流量增多,致肺淤血,易并发肺炎 。

19、正确答案：C

答案解析：解析：频发提前不是肺栓塞症的体征 。

20、正确答案：E

答案解析：解析：救治措施：迅速将病人转移到空气新鲜的地方，卧床休息，保暖，保持呼吸道通畅。

21、正确答案：E

答案解析：解析：腹部侧位 X 线片即可鉴别上尿路结石及腹腔钙化灶，为临床常用方法。

22、正确答案：D

答案解析：解析：自身免疫性胃炎（A 型胃炎）患者血液中存在自身抗体如壁细胞抗体，伴恶性贫血者还可查到内因子抗体。自身抗体攻击壁细胞，使壁细胞总数减少，导致胃酸分泌减少或丧失；由壁细胞分泌的内因子丧失，引起维生素 B12 吸收不良而导致恶性贫血。

23、正确答案：A

答案解析：【解析】室性心动过速是指起源于希氏束分叉处以下的 3-5 个以上宽大畸形 QRS 波组成的心动过速。

24、正确答案：A

答案解析：解析：汗液是低渗性液体，大量出汗引起血浆晶体渗透压增高，刺激下丘脑渗透压感受器兴奋，反射性引起下丘脑-神经垂体系统合成、释放 ADH 增多，远曲小管和集合管对水的重吸收增加，尿量减少。

25、正确答案：C

答案解析： 解析： 1. 微循环缺血缺氧期(代偿期)(1)微循环的变化：①毛细血管前后阻力增加(前阻力增加为显著)。②真毛细血管网关闭。③微循环灌流减少(少灌少流)。④动-静脉吻合支开放，使微循环缺血缺氧更为明显(灌少于流)。(2)休克早期微循环变化的代偿意义①自我输血：休克时增加回心血量的第一道防线。由于容量血管中的肌性微动脉和小静脉收缩，肝脏储血库收缩，使回心血量迅速增加，为心输出量的增加提供了保障。②自我输液：休克时增加回心血量的第二道防线。由于微动脉、后微动脉和毛细血管比微静脉对儿茶酚胺更敏感，导致毛细血管前阻力比后阻力更大，毛细血管中流体静压下降，使组织液进入血管。③血液重新分布：由于不同脏器的血管对儿茶酚胺反应不一，皮肤、内脏、骨骼肌、肾的血管 $\alpha$ 受体密度高，对儿茶酚胺的敏感性较高，收缩更甚，而冠状动脉血管因 $\alpha$ 受体密度低而无明显改变，而脑动脉由于受舒血管代谢物影响舒张；其中冠状动脉可因 $\beta$ 受体的作用而出现舒张反应；使心、脑血流增加。

2. 微循环瘀血缺氧期(可逆性失代偿期)(1)微循环的变化：①毛细血管前阻力降低(后阻力降低不明显)，血管运动现象减弱。②真毛细血管网开放。③微循环灌多于流(多灌少流)。④血细胞(白细胞、红细胞和血小板)的黏附或聚集，使微循环瘀血缺氧加剧。(2)休克期微循环失代偿的后果：①心输出量的降低。②动脉血压急剧下降。③心脑血管供血减少。

3. 微循环衰竭期(不可逆转期)(1)微循环的变化：①毛细血管前后阻力均降低。②真毛细血管内血液瘀滞。③微循环麻痹(不灌不流)。④广泛的微血栓形成。

26、正确答案：D

答案解析： 解析： 结脑晚期(昏迷期)意识朦胧、半昏迷而昏迷，阵挛性或强

直性惊厥频繁发作，常出现水电解紊乱，最终因颅内压急剧增高导致脑疝致呼吸循环衰竭。

27、正确答案：C

答案解析：解析:治疗原发性肝癌最好方法是手术根治性切除肿块。

28、正确答案：D

答案解析：

29、正确答案：C

答案解析：解析：新生儿败血症是指致病菌进入血液生长繁殖，产生毒素而造成全身性细菌感染。新生儿血清胆红素增高。

30、正确答案：D

答案解析：解析：非特异性投射系统是指各种感觉冲动上传至大脑皮层的共同上行通路。特异性感觉纤维经过脑干时，都发出侧支与脑干网状结构的神经元发生突触联系，通过其短轴突多次更换神经元后，抵达丘脑的皮质下联系核，再发出纤维弥散地投射到大脑皮层的广泛区域。由于上行过程中经过脑干网状结构神经元的错综复杂的换元传递，因而失去了特异感觉的特异性和严格的定位区分，上行纤维广泛终止于大脑皮层的各层细胞，不引起特定的感觉，其主要功能是维持和改变大脑皮层的兴奋状态。

31、正确答案：C

答案解析：

32、正确答案：D

答案解析：【解析】记忆题,考查医际关系。

33、正确答案：C

答案解析：解析：(1)假药的定义：①药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符的；②以非药品冒充药品或者以他种药品冒充此种药品的。(2)按假药论处的情形：①国家药品监督管理部门规定禁止使用的；②必须批准而未经批准生产、进口，或者必须检验而未经检验即销售的；③变质的；④被污染的；⑤使用必须取得批准文号而未取得批准文号的原料药生产的；⑥所标明的适应症或者功能主治超出规定范围的（C）。(3)劣药的定义：药品成分的含量不符合国家药品标准的。(4)按劣药论处的情形：①未标明有效期或者更改有效期的；②不注明或者更改生产批号的；③超过有效期的；④直接接触药品的包装材料和容器未经批准的；⑤擅自添加着色剂、防腐剂、香料、矫味剂及辅料的；⑥生产没有国家药品标准的中药饮片，不符合省级药品监督管理部门制定的炮制规范的；⑦医疗机构不按照省级药品监督管理部门批准的标准配制制剂的。

34、正确答案：B

答案解析：解析：人主要通过皮肤、黏膜接触含有血吸虫尾蚴的疫水而感染血吸虫病，其虫卵引起的肝与结肠的肉芽肿是本病主要的病理改变。

35、正确答案：E

答案解析：解析：Reynolds 五联征：腹痛、寒战高热、黄疸、休克、中枢神经系统受抑制

36、正确答案：C

答案解析：解析:外科治疗肝硬化门静脉高压症公认的重点是治疗和预防出血。

37、正确答案：D

答案解析：记忆题

38、正确答案：D

答案解析：【解析】第四脑室肿瘤最容易引起枕骨大孔疝的颅内占位性病变。

39、正确答案：D

答案解析：解析:正常人时间肺活量第 1 秒末呼出气量占肺活量的 80%。

40、正确答案：C

答案解析：解析：肝性脑病是肝硬化最严重的并发症，临床表现轻者可仅有轻微的智力减退，严重者出现意识障碍、行为失常和昏迷。

41、正确答案：A

答案解析：解析:老年男性最常见的腹外疝为腹股沟直疝。



42、正确答案：C

答案解析：解析：幼儿急疹出疹特点是热退疹出。

43、正确答案：A

答案解析：解析：内痔早期症状就是便血，一般表现为无痛性进行性滴血或喷射状出血，便血一般呈鲜红色，血液与粪便不相混合。

44、正确答案：B

答案解析：解析：肾小球疾病水肿可分为肾病性水肿和肾炎性水肿，肾炎性水肿主要是由肾小球率过率下降，而肾小管重吸收功能基本正常造成球管失衡和肾小球滤过分数下降，导致水、钠潴留。肾病行水肿主要是由于血浆蛋白过低，血浆胶体渗透压降低引起。

45、正确答案：D

答案解析：解析：硝酸甘油可以直接松弛血管平滑肌，特别是小血管平滑肌，使全身血管扩张，外周阻力减少，静脉回流减少，减轻心脏前后负荷，降低心肌耗氧量、解除心肌缺氧。用于心绞痛急性发作，也用于急性左心衰竭。

46、正确答案：A

答案解析：【解析】由于长期慢性淤血慢性感染细胞浸润等病因的长期刺激，组织细胞异常增生，致脾脏纤维组织大量增生，而使脾脏肿大变硬。

47、正确答案：B

答案解析：体内脂肪大量动员时，肝细胞会产生大量乙酰 CoA，可氧化生成 ATP 供能，还可在线粒体内转化生成酮体，包括乙酰乙酸、 $\beta$  羟丁酸及丙酮。

48、正确答案：C

答案解析：解析：心身疾病，就是指那些心理—社会因素在疾病的发生和发展中起主导作用的躯体疾病。由于它具有生理上的障碍，因此心身疾病又称为心理生理疾病。狭义的心身疾病是指心理社会因素在发病、发展过程中起重要作用的躯体器质性疾病，例如原发性高血压、溃疡病、冠心病、哮喘等。

49、正确答案：E

答案解析：解析：痛风伴高尿酸血症，最易合并泌尿系尿酸结石。

50、正确答案：D

答案解析：【解析】记忆题,考查骨骼肌兴奋收缩耦联。

51、正确答案：A

答案解析：解析:急性腹膜炎的剖腹探查宜采用右中腹直肌切口,切口的上1/3 在脐上,下 2/3 在脐下。

52、正确答案：E

答案解析：解析：诊断颅底骨折最重要的依据是脑脊液漏。(1)颅前窝骨折：眶周皮下及眼球结合膜下瘀血，表现“熊猫眼”征。鼻腔流血并伴脑脊液鼻漏。可合并嗅神经、视神经、脑垂体、丘脑和额叶脑挫伤症状。(2)颅中窝骨折：外耳道流血并脑脊液耳漏，常伴有听神经、面神经、三叉神经、外展神经和颞叶脑损伤症状。少数患者合并颈内动脉-海绵窦瘘或外伤性动脉瘤。(3)颅后窝骨折：乳突皮下瘀血、肿胀、压痛，有时咽后壁肿胀、瘀血或脑脊液漏。可合并舌咽神经、迷走神经、副神经、舌下神经和小脑、脑干损伤症状。

53、正确答案：C

答案解析：解析：硬脑膜外血肿的典型特征是伤后一过性的意识清醒或好转，又称中间清醒期。

54、正确答案：C

答案解析：解析：长期肝瘀血导致肝硬化的基本病理改变是肝间质纤维增多，大量肝小叶改建是门脉性肝硬化的基本病变。

55、正确答案：D

答案解析：解析：面部危险三角，通常指的是两侧口角至鼻根连线所形成的三角形区域，这个区域是公认的危险区域当面部发生炎症，尤其在这三角区域内有感染（疖或痈）时，易在面前静脉内形成血栓，影响正常静脉血回流，并逆流至眼上静脉，经眶上而通向颅内蝶鞍两侧的海绵窦，将面部炎症传播到颅内，产生海绵窦化脓性、血栓性静脉炎的严重并发症。

56、正确答案：D

答案解析：解析：在所有乳癌的病理类型中，炎性乳癌预后最差。炎性乳癌的特征为局部皮肤呈炎症样表现；开始较局限，以后扩展到乳腺大部分皮肤，表现为皮肤发红、水肿、增厚、粗糙、皮温升高。答案选 D。乳头内陷提示癌肿累及乳管。乳头湿疹样变为 Paget 病，恶性程度低，预后好。局部皮肤凹陷呈酒窝征提示癌肿累及 Cooper 韧带。皮肤呈橘皮样变提示癌肿累及皮下淋巴管。这些体征均不能提示预后不良。

57、正确答案：C

答案解析：解析：颌下、颈部蜂窝织炎时由于组织炎症、水肿及渗出压迫临近的气管极易导致呼吸困难和窒息，危及生命。

58、正确答案：C

答案解析：【解析】血源性肺脓肿最常见的病原体是金黄色葡萄球菌。吸入性肺脓肿最常见的病原菌是厌氧菌。

59、正确答案：C

答案解析：解析：鼠疫、霍乱属于甲级传染病；。

60、正确答案：E

答案解析：解析：卡介苗预防结核性脑膜炎及粟粒性结核 2 种疾病，接种对象为新生儿，出生后 6 个月以内的婴儿也可接种，6 月-7 周岁没接种过卡介苗儿童并且 PPD 试验阴性也可接种。

61、正确答案：B

答案解析：解析：肽聚糖是一类复杂的多聚体，是细菌细胞壁中的主要成分，为原核细胞所特有。革兰阴性菌细胞壁的特殊组分是外膜，它由脂蛋白、脂质双层和脂多糖三部分组成。

62、正确答案：D

答案解析：解析：血氨是诊断肝性脑部的血液化验指标；。

63、正确答案：B

答案解析：IV型超敏反应：与其他三型超敏反应不同，其与补体和抗体无关，是一种以单核细胞浸润和细胞变性坏死为主要特征的超敏反应，此超敏反应发生较慢，通常在接触相同抗原后 24~72 小时出现炎症反应，又称为迟发型超敏反应。

64、正确答案：C

答案解析：解析：胺碘酮适用于下列心律失常，尤其合并器质性心脏病如冠状动脉供血不足及心力衰竭：1.房性心律失常(心房扑动、心房纤颤转律和转律后窦性心律的维持)；2.结性心律失常；3.室性心律失常(治疗危及生命的室性期前收缩和室性心动过速以及室性心律过速或心室纤颤的预防)；4.伴 W-P-W 综合征的心律失常。

65、正确答案：C

答案解析：

66、正确答案：B

答案解析：直腿抬高试验阳性可以诊断为腰椎间盘突出症。

67、正确答案：E

答案解析：解析：双侧喉返神经损伤，可导致失音或严重的呼吸困难，甚至窒息。

68、正确答案：C

答案解析：【解析】甲状腺温结节提示恶性肿瘤的可能。恶性甲状腺肿瘤诊断的主要症状是压迫感，压迫支气管可致出气不畅。

69、正确答案：D

答案解析：解析：三腔二囊管压迫止血适用于食管、胃底静脉曲张破裂大出血患者局部压迫止血。

70、正确答案：E

答案解析：解析：处于炎症结节状态的疖可用热敷或物理疗法，也可外敷鱼石脂软膏、金黄膏等。出现脓头时可涂石炭或碘酊。有波动时，应及早切开引流。对面部疖和未成熟的疖不应任意挤压。有全身症状的疖、疖病和面部疖应给与抗菌药物并注意休息。

71、正确答案：E

答案解析：【解析】老年男性,痰中带血应考虑肺癌的可能性,MRI 多个小结节,低信号,考虑转移。

72、正确答案：B

答案解析：解析：根治性肾切除术是肾癌最主要的治疗方法，对位于肾上、下极直径小于 3cm 的肾癌，可作保留肾单位的肾部分切除术，故本题可考虑右肾部分切除。

73、正确答案：C

答案解析：解析：尺神经在臂部损伤时，主要表现为屈腕能力减弱，屈 4、5 指的远节指骨不能屈曲及拇指内收力弱，小鱼际肌及骨间肌明显萎缩，各指不能互相靠拢，各掌指关节过伸，第 4、5 指的指间关节弯曲，称为爪形手，其感觉障碍则以手内侧缘为主。尺神经损伤后小指及环指尺侧半感觉消失。

74、正确答案：D

答案解析：解析：每日所需热量计算公式：女子 18-30 岁： $14.6 \times \text{体重(公斤)} + 450$ ；31-60 岁： $8.6 \times \text{体重(公斤)} + 830$ ；60 岁以上： $10.4 \times \text{体重(公斤)} + 600$ 。男子 18-30 岁： $15.2 \times \text{体重(公斤)} + 680$ ；31-60 岁： $11.5 \times \text{体重(公斤)} + 830$ ；60 岁以上： $13.4 \times \text{体重(公斤)} + 490$ 。

75、正确答案：D

答案解析：解析：肝性脑病分级 II 级：精神错乱，不认人，木僵，昏睡，出现扑翼样震颤或其他不自主动作，该患者出现睡眠障碍，扑翼样震颤，符合 II 级。

76、正确答案：B

答案解析：解析：患者的临床表现符合霍乱，霍乱大多数病例突起剧烈腹泻，继而呕吐，腹泻为无痛性，亦无里急后重，大便性质初为色稀水便，量多，转而变为米泔水样。

77、正确答案：E

答案解析：解析：患者有酒精性肝硬化病史，上腹胀痛，低热，体重下降，最可能诊断为肝癌。

78、正确答案：E

答案解析：解析：梅尼埃综合症旧称为美尼尔综合征，是内耳窝的病变，不会有腹痛。美尼尔氏综合症又称迷路积水，是由于内耳的膜迷路发生积水，以致出现发作性眩晕、耳鸣、耳聋、头内胀痛症状的疾病。

79、正确答案：D

答案解析：解析：腹部平片示膀胱区致密影，最有可能是膀胱结石，典型临床表现为尿流中断，改变体位后好转。

80、正确答案：B

答案解析：解析：阵发性高血压首先考虑嗜铬细胞瘤，尿儿茶酚胺增高则提示嗜铬细胞瘤。

81、正确答案：B

答案解析：解析：大剂量雌激素可迅速促进子宫内膜生长，短期内修复止



血。

82、正确答案：A

答案解析：解析：慢性硬膜下血肿是指颅内出血血液积聚于硬脑膜下腔、伤后三周以上出现症状者。血肿常发生于额顶颞半球凸面，积血量可达 100~300 毫升。临床表现以颅内压增高为主，头痛较为突出，部分有痴呆、淡漠和智力迟钝等精神症状，少数可有偏瘫、失语和局源性癫痫等局源性脑症状。

83、正确答案：B

答案解析：解析：因吞咽困难水和营养物质缺乏形成脱水和酸碱失衡电解质紊乱，目前引起循环衰竭形成休克，首要的任务是补充血容量纠正休克。

84、正确答案：A

答案解析：解析：女性泌尿系感染抗菌治疗 3 天即可。

85、正确答案：C

答案解析：解析：以手术为主的综合治疗。

86、正确答案：C

答案解析：解析：该患者可疑子宫内膜癌，B 超检查可以了解子宫大小、子宫内膜厚度、有无回声不均或宫腔内赘生物，有无肌层浸润及其程度等，其诊断符合率达 80%以上。由于子宫内膜癌患者肥胖者甚多，因此经阴道超声比经腹部超声更具优势。由于 B 超检查方便及无创，因此成为诊断子宫内膜癌最常

规的检查，也是初步筛查的方法。

87、正确答案：B

答案解析：诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病，早期血 25-（OH）-D3 下降，为可靠的早期诊断指标。

88、正确答案：E

答案解析：解析:两性霉素 B 是多烯类抗深部真菌抗生素,目前是治疗深部真菌感染的首选药物。

89、正确答案：E

答案解析：解析:MCV<80fl,MCHC<32%为小细胞低色素贫血常见于缺铁性贫血,可出现匙状甲。

90、正确答案：E

答案解析：解析:肿块病理确定最准确的金标准为病理细胞学检查。

91、正确答案：E

答案解析：解析：肝右叶巨大肝癌(>10cm)，左叶多发小肝癌，不能手术切除，本例最佳方法是 E。

92、正确答案：E

答案解析：

93、正确答案：C

答案解析：

94、正确答案：B

答案解析：【解析】脱水轻中重度的划分主要依靠症状来判断，患者狂躁，幻觉，提示重度；口渴提示高渗性脱水。

95、正确答案：A

答案解析：解析:患者有腹部受伤史,查体发现上腹部隆起,有囊性包块,结合患者的临床症状,最可能诊断为胰腺假性囊肿。

96、正确答案：E

答案解析：【解析】对房性期前收缩的出现首先要判定是生理性的还是病理性的。患者偶发，应该定期随诊，查找病因。

97、正确答案：B

答案解析：解析：临床意义：(1)心肌梗塞后，CPK 较谷草转氨酶和乳酸脱氢酶特异性高，但持续时间短，2-4 天恢复正常。(2)病毒性心肌炎，CPK 也可升高，对诊断及预后有参考价值。(3)进行性肌营养不良、多发性肌炎以及肌肉损伤时 CPK 也可升高。(4)严重的心绞痛、心包炎、房颤、脑血管意外、脑膜炎以及心脏手术等，CPK 可见升高。

98、正确答案：E

答案解析：

99、正确答案：A

答案解析：【解析】患者车祸后,有休克征象,考虑腹腔内大量出血所致的失血性休克,肝脾破裂可导致大量失血。

100、正确答案：E

答案解析：解析：根据患者的临床表现、检查结果可知该患者应诊断为支气管扩张，治疗原则：治疗基础疾病，控制感染，改善气流受限，清除气道分泌物，对于局限性，且内科治疗无效的顽固复发者，可手术切除病变组织。故选E。

101、正确答案：E

答案解析：解析：蔬菜农药残留所致有机磷农药中毒。

102、正确答案：B

答案解析：解析：患儿13岁，发热、咳嗽3天，气促，两肺可闻细湿啰音，临床支持支气管肺炎诊断。血常规及胸片正位两下肺斑片状阴影更证实诊断。

103、正确答案：E

答案解析：解析：以骶髂关节和脊柱附着点炎症为主要症状的疾病。与HLA-B27呈强关联。病变发展至胸椎和颈椎椎间小关节，间盘间隙发生钙化，

纤维环和前纵行韧带钙化、骨化、韧带骨赘形成，使相邻椎体连合，形成椎体间骨桥，呈最有特征的竹节样脊柱。

104、正确答案：A

答案解析：空腹腹痛，HP（+），诊断患十二指肠溃疡。治疗药物：H2受体拮抗剂如西咪替丁，质子泵抑制剂如奥美拉唑，抗幽门螺旋杆菌如克拉霉素，铋剂（CBS即枸橼酸铋剂），甲硝唑。保护胃粘膜的药物如硫糖铝和胶体铋。

105、正确答案：E

答案解析：解析：心电图运动负荷试验是通过一定量的运动增加心脏负荷，观察心电图变化，对已知或怀疑患有心血管疾病，尤其是冠状动脉粥样硬化性心脏病（冠心病）进行临床评估的方法。适合本例患者明确诊断。

106、正确答案：D

答案解析：解析：患者可能并发下肢深静脉血栓，应首选下肢超声检查。

107、正确答案：D

答案解析：

108、正确答案：E

答案解析：解析：胃镜检查提示胃体黏膜变薄，血管透见，皱襞稀疏，应诊断为慢性萎缩性胃炎。慢性萎缩性胃炎分为A型胃炎和B型胃炎。A型胃

炎也称自身免疫性胃炎，体内可出现针对壁细胞或内因子的自身抗体，作为靶细胞的壁细胞数量减少，内因子分泌减少，导致维生素 B12 吸收障碍，出现巨幼红细胞性贫血，故本题答案选 E 。

109、正确答案：E

答案解析：解析：Galeazzi 骨折为桡骨中下 1/3 骨折伴下尺桡关节分离（半脱位或全脱位）。Colles 骨折为伸直型桡骨下端骨折，远折端向手背侧、桡侧移位，近折端向掌侧移位，侧面银叉样畸形、正面枪刺样畸形。Monteggia 骨折（孟氏骨折）指尺骨上 1/3 骨折合并桡骨头脱位的骨折。临床表现为肘关节的肿胀、疼痛、压痛、畸形、功能障碍等。Chance 骨折指的是屈曲牵张性骨折，损伤的部位为脊柱椎体水平状。Smith 骨折为屈曲型桡骨下端骨折，远折端向手掌侧、桡侧移位，近折端向背侧移位。

110、正确答案：A

答案解析：解析：本例有右心衰体征：颈静脉怒张肺淤血下肢水肿，有左心衰体征：双肺湿啰音。并心界向两侧扩大，诊断为全心衰。

111、正确答案：B

答案解析：

112、正确答案：C

答案解析：

113、正确答案：D

答案解析：

114、正确答案：C

答案解析：

115、正确答案：D

答案解析：

116、正确答案：B

答案解析：

117、正确答案：D

答案解析：

118、正确答案：E

答案解析：

119、正确答案：C

答案解析：

120、正确答案：D

答案解析：

121、正确答案：D

答案解析：

122、正确答案：A

答案解析：

123、正确答案：C

答案解析：

124、正确答案：D

答案解析：

125、正确答案：C

答案解析：

126、正确答案：E

答案解析：

127、正确答案：D

答案解析：

128、正确答案：B

答案解析：

129、正确答案：A



答案解析：

130、正确答案：A

答案解析：

131、正确答案：E

答案解析：

132、正确答案：B

答案解析：

133、正确答案：C

答案解析：

134、正确答案：C

答案解析：

135、正确答案：D

答案解析：

136、正确答案：B

答案解析：

137、正确答案：C

答案解析：

138、正确答案：E

答案解析：

139、正确答案：C

答案解析：解析：1.腹膜炎术后，发热，为弛张热，右上腹、肋下持续性纯痛，深呼吸及咳嗽时疼痛加重结合B超检查结果及诊断性穿刺结果，首先考虑膈下脓肿。为防止脓液流入腹腔再次引起弥漫性腹膜炎，最主要的措施是吸净脓液，低压灌洗后留置负压引流。2.最常用的抗生素是第三代头孢菌素。

140、正确答案：C

答案解析：

141、正确答案：C

答案解析：

142、正确答案：A

答案解析：解析：1.青少年女性患者，有低热咳嗽，咽部不适病史，X线片示网状及小片状阴影，最可能诊断为支原体肺炎。2.支原体原发感染检测血清IgM，滴度 $\geq 1:16$ 或有4倍以上的升高。3.治疗首选药物是红霉素。

143、正确答案：E

答案解析：

144、正确答案：E

答案解析：解析：1.患者咳嗽、咳痰伴喘息 20 余年病史，加重 1 周，2 天来发热、咳嗽、意识不清，结合实验室检查，考虑为慢性阻塞性肺疾病引起肺性脑病。肺性脑病的诊断依据：诊断(1)已确诊慢性肺部疾病和呼吸障碍疾病引起肺功能不全的基础上；(2)如发现抑制状态和朦胧、昏睡、兴奋不安、昏迷；(3)动脉血气、CO 分压、CO 结合力提示氧和 pH 降低时就应诊断为肺性脑病。2.患者发生肺性脑病，应选用机械通气纠正血氧含量。

145、正确答案：E

答案解析：

146、正确答案：D

答案解析：解析：1.颈部肿物,为确诊良恶性,首选细针穿刺细胞学检查。2.肿块进行性增大,应选择切除后活检,若为恶性,行进一步治疗。

147、正确答案：E

答案解析：

148、正确答案：A

答案解析：解析：1.高血糖、高血压、低血钾、脸圆、变红、月经稀发、向心性肥胖，皮肤薄，面部痤疮较多，下颌小胡须，全身毳毛增多。腹部、大腿

根部可见宽大紫纹提示库欣综合征。2.定性诊断最主要的检查是小剂量地塞米松试验，库欣综合征患者皮质醇分泌增多，失去昼夜分泌规律，不能被小剂量地塞米松抑制。有助于了解其病因或病变部位的检查是大剂量地塞米松试验。

149、正确答案：A

答案解析：

150、正确答案：E

答案解析：