

# 2021 年临床执业医师资格考试模拟试卷

## 第一单元

1. 比较不同职业人群的冠心病患病率，本例假设检验应计算的统计量为

- A. t
- B.  $\chi^2$
- C. S
- D. u
- E. P

2. 医生王某观察某药对预防胃癌的效果，根据下面的统计信息，下列说法最合适的是观察

|      | 总人数 | 发病人数 | 未发病人数 | 发病率(%) |
|------|-----|------|-------|--------|
| 服药组  | 240 | 50   | 190   | 20.83  |
| 未服药组 | 180 | 50   | 130   | 27.78  |

- A. 服药组的发病率低于未服药组，可以认为该药有效
- B. 两组发病率相差不大，不能认为该药有效
- C. 因有抽样误差存在，不能作出结论
- D. 应先作假设检验再作结论
- E. 由于未设对照组，不能认为该药有效

3. 20 例样本均数与已知总体均数  $\mu_0$  比较时，适用的检验方法是

- A. u 检验
- B. 秩和检验
- C.  $\chi^2$  检验
- D. logistic 回归分析
- E. t 检验

4. 两样本均数差别的假设检验得出  $P \leq \alpha$ ，按  $\alpha$  检验水准作出统计推断为

- A. 两样本均数相差很大
- B. 两样本均数的差别具有应用价值
- C. 两总体均数有一定差别
- D. 两总体均数相差肯定很大
- E. 两样本均数的差别具有统计学意义

5. 某地区共有 80 万人口，在结核病普查中共查出结核病患者 160 人。可计算出该地区结核病的分布指标是

- A. 续发率为 20/10 万
- B. 生存率为 20/10 万
- C. 患病率为 20/10 万
- D. 罹患率为 20/10 万



E. 发病率为 20/10 万

6. 某企业 1 周内发生伤寒病人 24 例，罹患率为 17%，该疾病的流行强度属于

- A. 散发
- B. 流行
- C. 大流行
- D. 暴发
- E. 局部流行

7. 用于描述小范围、短时间内疾病频率的测量指标常用

- A. 发病率
- B. 罹患率
- C. 暴发率
- D. 患病率
- E. 感染率

8. 开展流行病学现况调查过程中，系统抽样的方法是

- A. 按照就近原则抽取调查单位
- B. 按照随机原则抽取调查单位
- C. 按照一定顺序和间隔抽取调查单位
- D. 按照疾病所涉及的人体不同系统抽取调查单位
- E. 按照地区系统抽取调查单位

9. 男性，78 岁。高血压病史 28 年。查体：心率 80 次/分，BP170/60mmHg。该患者脉压增大最可能的原因是

- A. 外周阻力增大
- B. 外周阻力降低
- C. 心脏每搏输出量增加
- D. 大动脉管壁硬化
- E. 心率稍快

10. 女，21 岁。不洁饮食后腹泻 2 天，伴心悸 1 天。ECG 示提前发生的宽大畸形 QRS 波群，前无 P 波，时限  $>0.12s$ ，每分钟超过 5 次。其最可能发生在心肌细胞的

- A. 相对不应期
- B. 快速复极初期
- C. 有效不应期
- D. 静息期
- E. 超常期

11. 心肌自律细胞与工作细胞的最大区别在于自律细胞

- A. 没有明显的动作电位 1 期
- B. 没有明显的动作电位 2 期
- C. 没有稳定的静息电位
- D. 静息电位时程较长



E. 动作电位时程较长

12. 在所有心肌细胞中动作电位时程最长的是

- A. 窦房结 P 细胞
- B. 房室结细胞
- C. 心房肌细胞
- D. 浦肯野细胞
- E. 心室肌细胞

13. 影响心动周期中动脉血压波动幅度的最主要因素是

- A. 心脏每搏输出量
- B. 心率
- C. 外周阻力
- D. 循环血量
- E. 动脉的弹性储器作用

14. 交感缩血管神经纤维分布密度最小的是

- A. 皮肤血管
- B. 冠状血管
- C. 骨骼肌血管
- D. 肾血管
- E. 胃肠道血管

15. 可使静脉回心血量减少的情况是

- A. 体循环平均充盈压升高
- B. 右心衰竭
- C. 肌肉泵作用增强
- D. 体位由直立位转为平卧位
- E. 左心衰竭

16. 冠状动脉血流量调节的最主要因素是

- A. 心肌代谢水平
- B. 交感神经兴奋
- C. 迷走神经兴奋
- D. 肾上腺素和去甲肾上腺素
- E. NO 和 CGRP

17. 下述可出现基础代谢率降低的是

- A. 肾病综合征
- B. 糖尿病
- C. 红细胞增多症
- D. 白血病
- E. 甲状腺功能亢进症



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



18. 中枢温度感受器的热敏神经元多存在

- A. 视前区-下丘脑前部
- B. 脑干网状结构
- C. 下丘脑弓状核
- D. 下丘脑视交叉上核
- E. 下丘脑后部

19. 肾小球滤过率是指

- A. 单位时间内每侧肾脏生成的终尿量
- B. 单位时间内两侧肾脏生成的终尿量
- C. 单位时间内每侧肾脏生成的原尿量
- D. 单位时间内两侧肾脏生成的原尿量
- E. 单位时间内每侧肾脏生成的超滤液量

20. 尿中开始出现葡萄糖，血糖浓度至少为

- A. 8.33mmol/L (150mg/dl)
- B. 6.67mmol/L (120mg/dl)
- C. 2.78mmol/L (50mg/dl)
- D. 1.11mmol/L (20mg/dl)
- E. 1.0mmol/L (18mg/dl)

21. 大多数脱氢酶的辅酶是

- A. FADH<sub>2</sub>
- B. NAD<sup>+</sup>
- C. Cyt<sub>c</sub>
- D. CoA
- E. NADP<sup>+</sup>

22. 柠檬酸循环(三羧酸循环)中的唯一一次底物水平磷酸化反应是


- A. 异柠檬酸→ $\alpha$ -酮戊二酸
- B. 琥珀酰 CoA→琥珀酸
- C. 琥珀酸→延胡索酸
- D. 延胡索酸→苹果酸
- E. 苹果酸→草酰乙酸

23. 琥珀酸脱氢酶的辅酶是

- A. CoQ
- B. NAD<sup>+</sup>
- C. NADP<sup>+</sup>
- D. FAD
- E. FMN

24. 长期饥饿时糖异生的生理意义之一是

- A. 有利于必需氨基酸合成



全英本医学  
JINYINGJIE.COM



- B. 有利于排钠保钾
- C. 有利于脂酸合成
- D. 有利于补充血糖
- E. 有利于脂肪合成

25. 脂酰 CoA 完成一次  $\beta$ -氧化过程的顺序是

- A. 水合→脱氢→再加水→硫解
- B. 水合→脱氢→硫解→再加水
- C. 脱氢→加水→再脱氢→再加水
- D. 脱氢→加水→再脱氢→硫解
- E. 脱氢→脱水→再脱氢→硫解

26. 糖尿病患者发生酮症酸中毒的直接原因是

- A. 脂肪动员加强
- B. 氨基酸进入细胞受阻
- C. 胰岛素抵抗
- D. 尿中排出糖增加
- E. 蛋白质分解增加

27. 属于人体必需氨基酸的是

- A. 甘氨酸
- B. 组氨酸
- C. 苏氨酸
- D. 脯氨酸
- E. 丝氨酸

28. 联合脱氨基指的是


- A. 腺苷酸脱氨酶与谷氨酸脱羧酶联合
- B. 腺苷酸脱氨酶与氨基酸氧化酶联合
- C. 转氨酶与 L-谷氨酸脱氢酶联合
- D. 氨基酸氧化酶与谷氨酸脱氢酶联合
- E. 氨基酸氧化酶与谷氨酸脱羧酶联合

29. 肌肉中最主要的脱氨基方式是

- A. 嘌呤核苷酸循环
- B. 联合脱氨基作用
- C. 氨基移换作用
- D. D-氨基酸氧化脱氨基作用
- E. L-谷氨酸氧化脱氨基作用

30.  $\alpha$ -酮酸可转变成的物质是

- A.  $\text{CO}_2$  和  $\text{H}_2\text{O}$
- B. 营养必需脂肪酸
- C. 维生素 A



英杰医学  
YINGJIE.COM



- D. 营养必须氨基酸
- E. 维生素 E

31. 氨从脑组织运往肝或肾的主要形式是

- A. 丙氨酸
- B. 谷氨酰胺
- C.  $\text{NH}_4$
- D. 谷氨酸
- E. 尿素

32. 某患者被诊断为虹膜睫状体炎，常与阿托品交替使用预防虹膜与晶状体粘连的是

- A. 山莨菪碱
- B. 环丙沙星
- C. 毛果芸香碱
- D. 环喷托酯
- E. 红霉素眼药膏

33. 下列哪个药品常与局麻药配伍以延长局麻药麻醉时间

- A. 肾上腺素
- B. 去甲肾上腺素
- C. 去氧肾上腺素
- D. 异丙肾上腺素
- E. 多巴胺

34. 下列没有降低眼压作用的是？

- A. 噻吗洛尔
- B. 东莨菪碱
- C. 乙酰唑胺
- D. 毛果芸香碱
- E. 肾上腺素

35. 既可以抗心律失常，又可以治疗癫痫大发作的药物是

- A. 卡马西平
- B. 乙琥胺
- C. 扑米酮
- D. 苯巴比妥
- E. 苯妥英钠

36. 下列属于氯丙嗪药理作用的是

- A. 激动中脑-边缘系统 D2 受体
- B. 激动中脑皮质系统 D2 受体
- C. 激动延髓第四脑室底部 D2 受体
- D. 激动结节-漏斗系统 D2 受体
- E. 拮抗  $\alpha$  肾上腺素受体和 M 胆碱受体



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



37. 下列选项中不属于阿司匹林不良反应的是

- A. 消化性溃疡
- B. 水杨酸反应
- C. 支气管哮喘
- D. 瑞夷综合征
- E. 皮肤黏膜淋巴结综合征

38. 强心苷类药物正性肌力作用的机制是

- A. 抑制钙泵
- B. 抑制钠泵
- C. 抑制 H 泵
- D. 抑制  $\beta_1$  受体
- E. 激动  $\beta_1$  受体

39. 正在用庆大霉素治疗的患者不可同时使用的利尿剂是

- A. 呋塞米
- B. 螺内酯
- C. 乙酰唑胺
- D. 氢氯噻嗪
- E. 依普利酮

40. 氨茶碱与潘生丁都具有下列哪个药理作用

- A. 抑制磷酸二酯酶
- B. 激活腺苷活性
- C. 阻断腺苷受体
- D. 抑制血小板环氧酶
- E. 减少细胞内 cAMP 含量

41. 铜绿假单胞菌效果较差的抗菌药物是

- A. 二代头孢菌素
- B. 三代头孢菌素
- C. 环丙沙星
- D. 磺胺嘧啶银
- E. 妥布霉素

42. 以下对青霉素 G 敏感的病原微生物是

- A. 肠球菌
- B. 螺旋体
- C. 真菌
- D. 立克次体
- E. 原虫

43. 急性乳腺炎治疗宜选择的药物是



- A. 青霉素
- B. 四环素
- C. 氨基糖苷类
- D. 喹诺酮类
- E. 磺胺药

44. 一名艾滋病患者感染隐球菌，发生了脑膜炎时首选用药是

- A. 氟康唑
- B. 咪康唑
- C. 益康唑
- D. 酮康唑
- E. 克霉唑

45. 细胞胞质内出现大小不等、圆形均质红染物质的病变，见于

- A. 纤维化肾小球
- B. 纤维瘢痕组织
- C. 高血压病时细动脉
- D. 动脉粥样硬化的纤维斑块
- E. 肾小球肾炎时的肾小管

46. 细胞坏死的主要形态学标志是

- A. 细胞核的变化
- B. 细胞质的变化
- C. 间质的变化
- D. 线粒体、内质网的变化
- E. 酶活性的变化

47. 炎性充血主要是指

- A. 动脉扩张，局部组织含氧量增多
- B. 静脉回流障碍，组织含血量增多
- C. 炎区微循环内血量增多
- D. 静脉血液量增多
- E. 炎区组织间隙中血量增多

48. 男，76岁。右心衰竭致死。尸检见肝切面上出现红黄相间条纹，这种现象称为

- A. 心肌硬化
- B. 气球样变
- C. 槟榔肝
- D. 脂肪肝
- E. 虎斑变

49. 炎症细胞自血管内游出，向组织炎症区域定向运动的现象称

- A. 炎性浸润
- B. 炎性渗出



全英杰医学  
QINYINGJIE.COM





- C. 炎性漏出
- D. 趋化作用
- E. 阿米巴样运动

50. 属于慢性肉芽肿性炎的是

- A. 结核
- B. 伤寒
- C. 肠阿米巴病
- D. 慢性支气管炎
- E. 慢性阑尾炎

51. 男, 2岁。腹膜后肿块 5个月。直径 3cm, 病理诊断为恶性肿瘤, 最可能的肿瘤是

- A. 错构瘤
- B. 神经鞘膜瘤
- C. 神经母细胞瘤
- D. 囊性畸胎瘤
- E. 平滑肌肉瘤

52. 慢性阻塞性肺疾病的慢性气道炎症最主要的效应细胞是

- A. 巨噬细胞
- B. 中性粒细胞
- C. 嗜碱性粒细胞
- D. 嗜酸性粒细胞
- E. 淋巴细胞

53. 门脉性肝硬化形成假小叶, 其病理特点不正确的是

- A. 肝细胞排列紊乱
- B. 肝细胞体积大, 核大深染, 可有双核出现
- C. 肝细胞可变性坏死
- D. 小胆管闭塞、缺如
- E. 中央静脉可偏位、缺如

54. 致密沉积物病属于下列哪种肾小球肾炎?

- A. 膜性肾小球肾炎
- B. 快速进行性肾小球肾炎
- C. 系膜增生性肾小球肾炎
- D. 膜性增生性肾小球肾炎
- E. 毛细血管内增生性肾小球肾炎

55. 不属于细菌基本结构的是

- A. 细胞壁
- B. 细胞膜
- C. 细胞浆
- D. 细胞器



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



E. 核质

56. 革兰阳性菌细胞壁的特殊组分是

- A. 肽聚糖
- B. 几丁质
- C. 外膜
- D. 磷壁酸
- E. 脂多糖

57. 下列对沙门菌的叙述，正确的是

- A. 革兰阴性杆菌，氧化酶(+)，动力(-)
- B. 革兰阳性杆菌，氧化酶(-)，动力(+)
- C. 革兰阴性杆菌，氧化酶(-)，动力(-)
- D. 革兰阴性杆菌，氧化酶(-)，动力(+)
- E. 革兰阳性杆菌，氧化酶(+)，动力(-)

58. 紫外线杀菌的主要机制是

- A. 损伤细胞壁
- B. 破坏酶系统
- C. 干扰 DNA 的复制
- D. 干扰蛋白质的合成
- E. 损伤细胞膜

59. 破伤风的紧急预防应注射


- A. 破伤风减毒活疫苗
- B. 破伤风类毒素
- C. 百白破三联疫苗
- D. 破伤风抗毒素
- E. 丙种球蛋白

60. 一位非典型肺炎患者冷凝集素试验双价血清效价呈 4 倍以上增高，则怀疑引起感染的病原体是

- A. 肺炎链球菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 肺炎支原体
- D. 肺炎克雷伯菌
- E. 鹦鹉热衣原体

61. 下列哪种细菌可在 4℃ 生长

- A. 炭疽芽胞杆菌
- B. 霍乱弧菌
- C. 小肠结肠炎耶尔森菌
- D. 产气荚膜梭菌
- E. 破伤风梭菌



金英杰医学

JINYINGJIE.COM



62. 分枝杆菌抗酸染色阳性结果是

- A. 菌体呈蓝色
- B. 菌体呈红色
- C. 菌体呈绿色
- D. 菌体呈黄色
- E. 菌体呈紫色

63. 关于支原体生物学特性的叙述，正确的是

- A. 能通过滤菌器
- B. 对低渗不敏感
- C. 有返祖现象
- D. 有细胞壁
- E. 在人工培养基上不能生长

64. 关于立克次体的共同特征，下列说法错误的是

- A. 以节肢动物为传播媒介
- B. 对多种抗生素敏感
- C. 菌体内同时含有 DNA 和 RNA
- D. 大多仅引起人类致病
- E. 以二分裂方式进行繁殖

65. 下列不属于嗜神经病毒的是

- A. 脊髓灰质炎病毒
- B. 带状疱疹病毒
- C. 单纯疱疹病毒
- D. 麻疹病毒
- E. 狂犬病毒

66. 阴道鳞状上皮细胞核出现中度增大，不透明毛玻璃样外观，有时可见多核巨细胞，细胞核中心出现大的嗜酸性包涵体，包涵体周围有亮晕，可能是下列哪种微生物感染

- A. 人巨细胞病毒
- B. 人乳头瘤病毒
- C. EB 病毒
- D. 单纯疱疹病毒
- E. 柯萨奇病毒

67. 机体发生超敏反应的机制是

- A. 免疫监视功能过强
- B. 免疫防御功能过低
- C. 免疫防御功能过强
- D. 免疫监视功能过低
- E. 免疫自稳功能过强

68. 在控制有免疫原性的肿瘤细胞生长中，细胞介导的免疫应答起重要作用。下列是特异性直接杀伤肿



瘤细胞的是

- A. CD4+细胞
- B. CD8+T 细胞
- C. NK 细胞
- D. 树突状细胞
- E. D 细胞

69. 免疫功能表现为

- A. 免疫防御、免疫监视、免疫调节
- B. 免疫防御、免疫自稳、免疫监视
- C. 免疫防御、免疫监视、免疫耐受
- D. 免疫防御、免疫自稳、免疫调节
- E. 免疫监视、免疫调节、免疫耐受

70. 花粉引起的支气管哮喘属于

- A. I 型变态反应
- B. II 型变态反应
- C. III型变态反应
- D. IV型变态反应
- E. 非型变态反应

71. 人本主义学派实施心理治疗过程中，患者所做最多的是

- A. 倾听
- B. 信口开河
- C. 无条件积极关注
- D. 倾诉
- E 同感

72. 医学心理学的基本观点不包括

- A. 心身统一-的观点
- B. 被动调节的观点
- C. 认知评价的观点
- D. 情绪作用的观点
- E 社会影响的观点

73. 面对同样的应激源，有的人适应不良而患病，有的人则游刃有余而过关。这种现象形象地说明了医学心理学的基本观点是

- A. 个性特征的观点
- B. 认知评价的观点
- C. 情绪作用的观点
- D. 社会影响的观点
- E 心身统一-的观点

74. 认知评价的观点指的是心理社会因素能否影响健康或导致疾病，除了该因素的性质之外，更取决于



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



- A. 个体的情绪
- B. 社会的环境
- C. 个体的个性
- D. 个体的调节
- E. 个体的评价

75. 应激源作用于人体时，能够促进儿茶酚胺释放，增加心、脑、骨骼肌血流供应的神经内分泌系统是

- A. 下丘脑-垂体-甲状腺系统
- B. 下丘脑-垂体肾上腺皮质系统
- C. 下丘脑-交感-肾上腺髓质系统
- D. 下丘脑-垂体-性腺系统
- E. 下丘脑-垂体后叶系统

76. 女，63岁。近两周来感觉右手与右脚麻木，常常心烦意乱，目前工作、生活仍能进行。此时为辅助诊断，心理治疗师应选择心理测验是

- A. TAT 测验
- B. EPQ 问卷
- C. MPI 调查表
- D. HR. 成套测验
- E. 16PF 问卷

77. 人本主义治疗的主要技术不包括

- A. 真诚一致
- B. 无条件的积极关注
- C. 同感的了解
- D. 倾听
- E. 移情

78. 心理治疗师进入当事人的内心世界，不仅能理解当事人自己意识到的部分，甚至对当事人自己尚未察觉的潜意识层的部分也能觉察出来，并把这种理解传达给当事人本人，该技术属于

- A. 认知疗法
- B. 人本主义治疗
- C. 精神分析疗法
- D. 催眠疗法
- E. 行为主义治疗

79. 一位来访者单位的领导，向心理治疗师了解当事人心理动态和治疗状况，治疗师婉言谢绝，原因是

- A. 出于对来访者的尊重
- B. 保持客观中立的立场
- C. 不认识来访者的同事
- D. 心理治疗的关系限定原则
- E. 心理治疗的保密原则

80. 女大学生，23岁，因与男友断绝了恋爱关系，内心痛苦，有自杀念头，此时应寻求的最合适的心理



咨询方式是

- A. 门诊
- B. 电话
- C. 专题
- D. 信函
- E. 网络

81. 女, 34 岁, 接受心理治疗时舒适地躺在沙发上, 信口开河地表达头脑中涌现的一切想法, 不论其如何微不足道、荒诞不经, 治疗师从中捕捉其潜意识情绪或幼年的特殊事件。这种方法是

- A. 自我宣泄
- B. 移情
- C. 梦的解析
- D. 自由联想
- E. 投射

82. 能反映医疗卫生工作目的和医学本质特征的是

- A. 人才
- B. 技术
- C. 设备
- D. 管理
- E. 道德

83. 古人关于医德的论述, 正确的组合是

- A. 孙思邈: 人命至重, 有贵千金
- B. 扁鹊: 无恒德者不可以为医
- C. 张仲景: 大医精诚
- D. 华佗: 夫医者, 非仁爱之士不可托也
- E. 林逋: 医以救人为心

84. 当前我国医学伦理学的主要研究方向是

- A. 临床医学问题
- B. 生命科学的发展
- C. 公民道德问题
- D. 公共道德的学说和体系
- E. 医学实践中的道德问题

85. 下述关于道德权利的说法正确的是

- A. 道德权利是尽道德义务的前提
- B. 道德权利是法律权利的后盾
- C. 道德权利都是法律权利
- D. 道德权利与道德义务是对应的
- E. 道德权利是依法行使的权力和应享受的利益

86. 在下列权利中, 能够体现病人自主权的是



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



- A. 基本的医疗权
- B. 因病获得休息权
- C. 知情同意权
- D. 因病免除社会责任权
- E. 减免医疗费用权

87. 以下不属于医疗秘密的是

- A. 病人的体格畸形
- B. 医生及其家庭隐私
- C. 病人及其家庭隐私
- D. 病人患恶性疾病的诊断和不良预后
- E. 病人不希望他人知晓的疾病

88. 有关患者道德权利的论述正确的是

- A. 患者都有要求开假条休息的权利
- B. 患者享有随意免除社会责任的权利
- C. 医生在任何情况下都不能超越患者要求保密的权利
- D. 每名患者都享有稀有卫生资源分配的权利
- E. 知情同意是患者自主权的具体形式

89. 男，32岁。因车祸重伤入院，虽积极抢救，但不久即发生脑死亡。此时医生最适宜的处理措施应是

- A. 继续不惜一切代价地抢救，直至心脏停止跳动
- B. 终止病人的抢救，实施临终关怀
- C. 宣布病人死亡，放弃一切抢救
- D. 向家属说明患者情况，由家属做出决策
- E. 给患者实施安乐死

90. 按照我国人体器官移植的伦理准则，捐赠器官病人的抢救医生可以参与的是


- A. 摘取捐赠的器官
- B. 运送捐赠的器官
- C. 分配捐赠的器官
- D. 捐赠器官患者的死亡判定
- E. 接受器官移植患者的移植手术

91. 目前在医学技术上能够做到的

- A. 都是伦理学上应该支持的
- B. 都是伦理学上不应该支持的
- C. 在伦理学上不一定是应该做的
- D. 在伦理学上都是缺乏根据的
- E. 在伦理学上都是经过检验认证的

92. 不符合基因治疗伦理原则的是

- A. 社会责任和社会公正原则
- B. 优后原则



- C. 安全性原则
- D. 知情同意原则
- E. 优先原则

93. 进行人胚胎干细胞研究时，利用体外受精获得的囊胚，其体外培养期限自受精开始不得超过

- A. 7 天
- B. 14 天
- C. 28 天
- D. 8 周
- E. 12 周

94. 外国驻华领事馆疑有传染病疫情时，有权实施预防控制措施的机构是

- A. 我国卫生检验检疫机构
- B. 我国疾病预防控制机构
- C. 该国卫生检验检疫机构
- D. 该国疾病预防控制机构
- E. 国际疾病预防控制组织

95. 手足口病属于

- A. 甲类传染病
- B. 乙类传染病
- C. 丙类传染病
- D. “乙类甲管” 传染病
- E. 尚未列入传染病分类

96. 医疗机构执业时应悬挂于明显处所的信息不包括


- A. 诊疗科目
- B. 药品价格
- C. 执业许可证
- D. 诊疗时间
- E. 收费标准

97. 根据《医疗事故处理条例》，构成医疗事故主观方面的应是

- A. 技术水平欠缺所造成的技术过失
- B. 违反卫生法规和诊疗护理规范、常规的责任过失
- C. 违反法律法规和操作规程的故意
- D. 过于自信的过失
- E. 疏忽大意的过失

98. 对传染病患者住院时使用过的卫生洁具，医疗机构应当采取的措施是

- A. 彻底清洗
- B. 请防疫机构处理
- C. 请卫生行政部门处理
- D. 消毒和无害化处理



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM






E. 全部销毁

99. 为自愿接受艾滋病咨询、检测的人员免费提供咨询和初筛检测的医疗卫生机构应当由哪个部门指定

- A. 县级以上卫生行政部门
- B. 县级以上疾病预防控制机构
- C. 国务院卫生行政部门
- D. 所在地疾病预防控制机构
- E. 所在地医学会

100. 医疗机构发现突发公共卫生事件后，应当向当地卫生行政部门报告的时限为

- A. 1 小时内
- B. 2 小时内
- C. 4 小时内
- D. 6 小时内
- E. 8 小时内



1. 门静脉高压症的始动因素是

- A. 脾功能亢进
- B. 门静脉血流阻力增加
- C. 交通支扩张
- D. 肠系膜上、下静脉血液瘀滞
- E. 脾静脉血液瘀滞

2. 判断肝性脑病预后的检查是

- A. 脑电图
- B. 诱发电位
- C. 临界视觉闪烁频率
- D. 心理智能测验
- E. 血氨水平

3. 关于胆囊结石的说法错误的是

- A. 体位改变可诱发胆绞痛
- B. 胆囊积液可呈无色透明
- C. 胆囊结石一般很少引起黄疸
- D. 胆绞痛可向右肩胛部和背部放射
- E. 大多数患者呈现典型的胆绞痛症状

4. 约 85% 正常人群的胆囊动脉起源自

- A. 肝右动脉
- B. 胃十二指肠动脉
- C. 肝总动脉

金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



- D. 肝固有动脉
- E. 腹腔干

5. 对胆总管远端结石诊断最有价值的检查是

- A. X线平片
- B. 内镜超声
- C. 经皮肝穿刺胆管造影
- D. 内镜逆行胰胆管造影
- E. 腹部超声.

6. 急性胰腺炎患者发生腹胀的机制是因为

- A. 腹腔积液导致
- B. 腹腔积气导致
- C. 组织坏死液化继发感染形成胰腺脓肿导致
- D. 组织坏死液化包裹形成胰腺假性囊肿导致
- E. 腹腔神经丛受刺激产生肠麻痹导致

7. 女，45岁。胆囊结石病史12年。今日中午饱餐后突发上腹部剧痛10小时，向腰背部放射，呕吐后无缓解，弯腰抱膝位可减轻。查体：T37.7°C，上腹部腹肌紧张，压痛、反跳痛阳性。最具有诊断意义的检查是

- A. 血清淀粉酶
- B. B超
- C. 血清脂肪酶
- D. 立位腹部X线平片
- E. 胃镜

8. 胰头癌最主要的临床表现是下列哪项

- A. 上腹不适
- B. 消瘦乏力
- C. 腹泻
- D. 黄疸
- E. 腹水

9. 关于克罗恩病的治疗，叙述正确的是

- A. 轻度患者首选糖皮质激素
- B. 中、重度患者首选免疫抑制
- C. 活动期首选柳氮磺吡啶
- D. 治疗目标为黏膜愈合
- E. 手术可获根治

10. 溃疡性结肠炎患者诱发中毒性巨结肠的危险因素不包括

- A. 低钾
- B. 钡剂灌肠
- C. 服用抗胆碱药物



- D. 服用阿片类药物
- E. 结肠镜检查

11. COPD 特征性的病理生理变化是持续气流受限（不完全可逆的气流受限）引起

- A. 生理无效腔气量减少
- B. 肺通气功能障碍
- C. 通气/血流比例降低
- D. 弥散面积增大
- E. 肺内功能性分流减少

12. 女，21 岁。支气管哮喘急性发作入院。下列哪项提示患者为轻度哮喘

- A. 停止讲话
- B. 两肺散在哮鸣音
- C. 胸腹矛盾运动
- D. 心率 > 120 次/分
- E. 嗜睡或意识模糊

13. 男，19 岁。支气管哮喘急性发作急诊入院。患者不宜进行下列哪项检查

- A. 动脉血气分析
- B. 痰嗜酸性粒细胞计数
- C. 支气管激发试验
- D. 支气管舒张试验
- E. X 线胸片

14. 男，35 岁。间断咳嗽、咳痰伴咯血 20 年，最多一次咯血 200ml。行高分辨率 CT 检查示右肺中叶支气管囊状扩张，其余肺叶未见异常。今日再次咯血，量约 100ml，给予静脉滴注垂体后叶素治疗，效果欠佳。该患者宜选择的最佳治疗措施是

- A. 病变肺叶肺动脉栓塞
- B. 继续静脉滴注止血药
- C. 支气管镜下止血
- D. 换用酚妥拉明静脉滴注
- E. 手术切除病变肺叶

15. 下列关于肺炎链球菌肺炎的描述哪项不正确

- A. 未及时治疗可并发脓胸
- B. 毒素是细菌的主要致病因素
- C. 不易引起肺组织坏死或形成空洞
- D. 重症可并发发感染性休克
- E. 多见于健康青壮年或老年人

16. 男，56 岁。因“肺部感染、休克”入监护室治疗。血气分析提示该患者“代谢性酸中毒，I 型呼吸衰竭”。为保护患者组织灌注，此时不宜快速纠正酸中毒。其主要原因在于酸中毒时

- A. 组织氧摄取能力增加
- B. 血红蛋白结合氧增加



五英杰医学  
WUYINGJIE.COM



- C. 肺部获得更多的氧
- D. 组织氧耗量减少
- E. 氧解离曲线右移

17. 诊断肺结核常规首选、可发现早期轻微结核病变的检查方法是

- A. 痰涂片抗酸染色
- B. PPD 试验
- C. 痰结核分枝杆菌培养
- D. X 线胸片
- E. 胸部 CT

18. 女，22 岁。发热伴咳嗽 10 天，咳大量脓臭痰 1 天。2 周前曾有癫痫大发作史。胸部 X 线检查示右下肺大片边缘不清的浓密炎性阴影，阴影中可见透亮区及液平面。痰细菌培养示脆弱拟杆菌 (+)。不宜选用的抗生素是

- A. 甲硝唑
- B. 替硝唑
- C. 青霉素
- D. 林可霉素
- E. 克林霉素

19. 下列哪项是肺腺癌和肺小细胞癌的共同特点

- A. 多为中央型
- B. 多为周围型
- C. 血行转移早
- D. 淋巴转移早
- E. 生长缓慢转移晚

20. 在多器官功能障碍综合征的病理生理过程中，最易受累的是下列哪个器官

- A. 心
- B. 肝
- C. 肾
- D. 脑
- E. 肺

21. 参与支气管哮喘发作的主要细胞不包括

- A. CD4T 淋巴细胞
- B. CD8T 淋巴细胞
- C. 嗜酸性粒细胞
- D. 嗜碱性粒细胞
- E. 肥大细胞

22. 男，20 岁，3 天前受凉后出现咳嗽、咳白色黏痰，发热 39 °C，胸片示左下肺大片渗出影，予青霉素静点，如有效则最先出现的是

- A. 胸片示片状阴影消散



- B. 咳嗽好转
- C. 体温降至正常
- D. 痰色转黄
- E. 痰量减少

23. 慢性肺脓肿患者的临床表现不包括

- A. 口周单纯疱疹
- B. 咳脓臭痰
- C. 不同程度咯血
- D. 肺部听诊空瓮音
- E. 杵状指(趾)

24. 肺癌发生在段支气管至主支气管是

- A. 中央型肺癌
- B. 周围型肺癌
- C. 小细胞肺癌
- D. 大细胞肺癌
- E. 支气管肺癌

25. 在我国，急性呼吸窘迫综合征最常见的原因是

- A. 吸入性肺炎
- B. 大面积创伤
- C. 重症肺炎
- D. 重症胰腺炎
- E. 大面积烧伤

26. 胸腔闭式引流术治疗气胸时置管位置为

- A. 锁骨中线第2肋间
- B. 腋前线第2肋间隙
- C. 腋中线第2肋间隙
- D. 锁骨中线第6~8肋间隙
- E. 腋中线第6~8肋间隙

27. 关于“暖休克”的叙述正确的是

- A. 革兰阳性细菌感染引起的早期休克
- B. 低排高阻型
- C. 皮肤花斑样发绀
- D. 嗜睡
- E. 毛细血管充盈时间延长

28. 感染性休克治疗用糖皮质激素用于，维持用药不宜超过

- A. 12 小时
- B. 24 小时
- C. 36 小时



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



- D. 72 小时
- E. 48 小时

29. 深静脉血栓时进行溶栓治疗的“时间窗”是

- A. 6 小时以内
- B. 12 小时以内
- C. 7 天以内
- D. 72 小时以内
- E. 14 天以内

30. 可作为评定心衰进程和判断预后指标的是

- A. 精氨酸加压素
- B. 内皮素
- C. 转化生长因子- $\beta$
- D. 肿瘤坏死因子- $\alpha$
- E. 利钠肽

31. 男，56 岁。间断活动时憋喘 1 年余，近期加重，重体力活动即感喘憋，有夜间憋醒。既往高血压病 8 余年，糖尿病 4 余年，查体：BP 150/100 mmHg，双肺呼吸音清。心率 76 次/分，律齐。患者经药物治疗症状好转，为改善预后需要长期使用的药物是

- A. 洋地黄类药物
- B. 肾上腺素能受体激动剂
- C. 磷酸二酯酶抑制剂
- D. 利尿剂
- E. 血管紧张素转换酶抑制剂

32. 既可用于室上性心律失常又可用于室性心律失常的药物是

- A. 普罗帕酮
- B. 利多卡因
- C. 艾司洛尔
- D. 维拉帕米
- E. 腺苷

33. 对心肌梗死后伴有室性期前收缩的患者，能够降低猝死发生率、再梗死率和总病死率的药物是

- A. 比索洛尔
- B. 普罗帕酮
- C. 利多卡因
- D. 奎尼丁
- E. 丙吡胺

34. 经皮球囊二尖瓣成形术适用于

- A. 单纯二尖瓣狭窄患者
- B. 近 3 个月有血栓史的二尖瓣狭窄患者
- C. 伴中重度二尖瓣关闭不全的二尖瓣狭窄患者



- D. 伴左心房内血栓形成的二尖瓣狭窄患者
- E. 瓣叶或瓣下结构钙化、畸形的二尖瓣狭窄患者

35. 以下可导致急性二尖瓣关闭不全的疾病

- A. 风湿性心脏病
- B. 扩张型心肌病
- C. 感染性心内膜炎
- D. 肥厚性梗阻型心肌病
- E. 二尖瓣黏液样变性

36. 亚急性感染性心内膜炎最常发生于

- A. 先天性室间隔缺损
- B. 先天性房间隔缺损
- C. 主动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 法洛四联症

37. 肥厚型梗阻性心肌病超声心动图的 SAM 现象是指

- A. 二尖瓣前叶在收缩期后移
- B. 二尖瓣后叶在舒张期前移
- C. 二尖瓣后叶在收缩期前移
- D. 二尖瓣前叶在舒张期前移
- E. 二尖瓣前叶在收缩期前移

38. 在下列哪个导联中，窦性心律 P 波呈倒置形态

- A. aVF 导联
- B. aVL 导联
- C. I 导联
- D. aVR 导联
- E. II 导联

39. 以下哪种情况禁用药物 ACEI

- A. 高血压合并左心室肥厚
- B. 高血压合并糖尿病肾病
- C. 高血压合并心肌梗死
- D. 高血压合并高血钾
- E. 高血压患者测定血肌酐为 2mg/dl

40. 以下属于动脉粥样硬化危险因素除了哪一项

- A. 中、老年
- B. 男性
- C. 吸烟
- D. HDL-C 减低
- E. 酗酒



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



41. 急性心肌梗死最易合并房室传导阻滞的是

- A. 广泛前壁心梗
- B. 局限前壁心梗
- C. 高侧壁心梗
- D. 下壁心梗
- E. 前间隔心梗

42. 关于感染性心内膜炎行血培养，下列叙述错误的是

- A. 急性患者入院后 3 小时内，每隔 1 小时采血 1 次，共 3 次
- B. 必须在体温升高时采血送检
- C. 亚急性患者第一日间隔 1 小时采血 1 次，共 3 次
- D. 亚急性患者采血次日未见细菌生长，则重复采血 3 次后开始抗生素治疗
- E. 已用过抗生素者，停药 2~7 天后采血

43. 感染性心内膜炎患者，使用抗生素原则正确的是

- A. 经验治疗疗程 4~6 周
- B. 小剂量
- C. 短疗程
- D. 单药治疗
- E. 待分离出病原微生物后开始用药以减少耐药菌株形成

44. 主动脉瓣关闭不全伴左心室扩大但收缩功能尚正常的患者，为延迟或减少主动脉瓣手术应选用

- A. 洋地黄
- B. ACEI 类药物
- C.  $\beta$  受体阻滞剂
- D. 利尿剂
- E. 硝酸甘油

45. 不属于消化性溃疡所致腹痛特点的是

- A. 慢性
- B. 难治性
- C. 季节性
- D. 节律性
- E. 周期性

46. 男，38 岁。十二指肠溃疡病史 4 年。2 月来腹痛规律发生改变，呈顽固性持续性钝痛，且放射至背部。该患者最可能发生了

- A. 溃疡癌变
- B. 溃疡正在愈合
- C. 溃疡出血并形成血肿
- D. 弥漫性腹膜炎
- E. 后壁溃疡穿孔





47. 早期胃癌指的是

- A. 癌灶直径 $\leq 10\text{mm}$
- B. 癌灶面积 $\leq 5\text{cm}$
- C. 局限于黏膜或黏膜下层
- D. 局限于肌层
- E. 肝炎后性肝硬化

48. 消化性溃疡最主要的病因是

- A. 前列腺素合成增加
- B. 缺血缺氧
- C. 表皮生长因子合成减少
- D. 急性应激事件
- E. 幽门螺杆菌感染

49. 女, 50岁。间歇性右上腹痛伴皮肤巩膜黄染半年, 再次发作2天。查体: T 36.5°C, P 80次/分, R 18次/分, BP 120/80mmHg, 皮肤巩膜明显黄染, 未见肝掌、蜘蛛痣。右上腹压痛, 无明显肌紧张和反跳痛。B超检查示胆囊内多发泥沙样结石, 胆总管略扩张。最恰当的手术方式是

- A. 胆肠吻合术
- B. 胆囊切除、胆总管探查术
- C. 胆囊造瘘、胆总管探查术
- D. 胆囊造瘘术
- E. 腹腔镜胆囊切除术

50. 女, 50岁。2周前无明显诱因出现中上腹隐痛, 皮肤巩膜黄染, 小便呈浓茶样, 1周前腹痛缓解, 皮肤黄染减退, 无皮肤瘙痒。实验室检查: ALT 90U/L, 尿胆红素(+). 该患者最可能的疾病与胰头癌的鉴别诊断要点是

- A. 黄疸有无波动
- B. 血清淀粉酶改变
- C. 皮肤有无瘙痒
- D. 尿胆红素阳性
- E. 肝功能改变

51. 比较不同职业人群的冠心病患病率, 本例假设检验应计算的统计量为

- A. t
- B.  $\chi^2$
- C. S
- D. u
- E. P

52. 临床预防服务的主要内容不包括

- A. 健康咨询
- B. 筛查
- C. 药物治疗
- D. 化学预防
- E. 免疫接种



53. 20 例样本均数与已知总体均数  $\mu_0$  比较时, 适用的检验方法是

- A. u 检验
- B. 秩和检验
- C.  $\chi^2$  检验
- D. logistic 回归分析
- E. t 检验

54. 两样本均数差别的假设检验得出  $P \leq \alpha$ , 按  $\alpha$  检验水准作出统计推断为

- A. 两样本均数相差很大
- B. 两样本均数的差别具有应用价值
- C. 两总体均数有一定差别
- D. 两总体均数相差肯定很大
- E. 两样本均数的差别具有统计学意义

55. 某地区共有 80 万人口, 在结核病普查中共查出结核病患者 160 人。可计算出该地区结核病的分布指标是

- A. 续发率为 20/10 万
- B. 生存率为 20/10 万
- C. 患病率为 20/10 万
- D. 罹患率为 20/10 万
- E. 发病率为 20/10 万

56. 某企业 1 周内发生伤寒病人 24 例, 罹患率为 17%, 该疾病的流行强度属于


- A. 散发
- B. 流行
- C. 大流行
- D. 暴发
- E. 局部流行

57. 用于描述小范围、短时间内疾病频率的测量指标常用

- A. 发病率
- B. 罹患率
- C. 暴发率
- D. 患病率
- E. 感染率

58. 开展流行病学现况调查过程中, 系统抽样的方法是

- A. 按照就近原则抽取调查单位
- B. 按照随机原则抽取调查单位
- C. 按照一定顺序和间隔抽取调查单位
- D. 按照疾病所涉及的人体不同系统抽取调查单位
- E. 按照地区系统抽取调查单位



59. 女, 69 岁。咳嗽、咳痰 23 年, 气短 5 年, 1 周前受凉后症状加重。查体: 神志清楚, 口唇发绀, 半卧位; 桶状胸, 两肺呼吸音减弱, 左下肺可闻及干、湿性啰音。胸部 X 线片示两肺透亮度增加。动脉血气分析示: PaO<sub>2</sub>52mmHg, PaCO<sub>2</sub>36mmHg。该患者发生呼吸衰竭的最主要机制是

- A. 肺通气不足
- B. 氧耗量增加
- C. 肺内动-静脉分流
- D. 弥散功能障碍
- E. 通气/血流比例失调

60. 关于慢性阻塞性肺疾病的发病机制, 下述正确的是

- A. 蛋白酶增多
- B. 磷酸二酯酶减少
- C. 腺苷酸环化酶减少
- D. α<sub>1</sub>-抗胰蛋白酶增多
- E. 脂肪酶活性降低

61. 溃疡性结肠炎的常见并发症不包括

- A. 急性肠穿孔
- B. 肠痿形成
- C. 结肠大出血
- D. 直肠结肠癌变
- E. 中毒性巨结肠

62. 肠易激综合征最主要的临床表现是

- A. 黏液脓血便
- B. 睡眠中因腹痛而醒来
- C. 腹部不适伴排便习惯改变
- D. 排便或排气后不能缓解的腹痛
- E. 症状轻而体征重

63. 肠梗阻病人手术中寻找梗阻部位应在

- A. 肠壁上有出血点处
- B. 肠壁充血水肿处
- C. 暗红色肠管与紫黑色肠管交界处
- D. 蠕动肠管和不蠕动肠管交界处
- E. 扩张肠管和塌陷肠管交界处

64. 机械性肠梗阻应考虑有绞窄可能的情况是

- A. 阵发性剧烈腹痛
- B. 肠鸣音亢进
- C. 显著腹胀, 呈对称性
- D. 明显的腹膜刺激征
- E. 腹部 X 线示可随时间改变位置的孤立胀大肠袢



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



65. 结肠梗阻属于

- A. 粘连性梗阻
- B. 麻痹性梗阻
- C. 单纯性梗阻
- D. 绞窄性梗阻
- E. 闭袢性梗阻

66. 溃疡型肠结核患者不经常出现的临床表现是

- A. 低热
- B. 黏液脓血便
- C. 便秘
- D. 脐周疼痛
- E. 右下腹疼痛

67. 不容易并发肠梗阻的疾病是

- A. 克罗恩病
- B. 结核性腹膜炎
- C. 增生型肠结核
- D. 肿块型结肠癌
- E. 弥漫性腹膜炎

68. 不属于溃疡型肠结核特点的是

- A. 多继发于肺结核
- B. 病灶多位于回盲部
- C. 钡剂于病变肠段呈“跳跃征”
- D. 常有结核毒血症状
- E. 缓解与复发交替


69. 治疗直肠肛管周围脓肿的主要方法是

- A. 选用对革兰阳性球菌有效的抗生素
- B. 选用对革兰阴性杆菌有效的抗生素
- C. 温水坐浴和局部理疗
- D. 脓肿切开引流
- E. 口服缓泻剂

70. 按瘘管与括约肌的关系分类，肛瘘最多见的类型是

- A. 肛管括约肌上型
- B. 肛管括约肌外型
- C. 肛管括约肌间型
- D. 肛管括约肌下型
- E. 经肛管括约肌型

71. 痔的治疗原则正确的是



金英杰医学  
JINGJIE.COM



- A. 以非手术治疗为主
- B. 即使无症状也应积极治疗
- C. 治疗重在根治
- D. 宜早期手术治疗
- E. 血栓性外痔必须手术治疗

72. 上消化道出血患者出现氮质血症的主要原因是

- A. 肾前性肾功能不全
- B. 肾小球滤过功能受损
- C. 急性肾小管坏死
- D. 血红蛋白被胃酸酸化
- E. 血液蛋白质被消化吸收

73. 急性弥漫性腹膜炎病情恶化的重要标志是

- A. 出现腹膜刺激征
- B. 出现移动性浊音
- C. 腹胀加重
- D. 肠鸣音减弱
- E. 直肠前窝饱满、触痛

74. 正常情况下人体腹腔内液体应

- A.  $\leq 30\text{ml}$
- B.  $\leq 50\text{ml}$
- C.  $\leq 75\text{ml}$
- D.  $\leq 100\text{ml}$
- E.  $\leq 200\text{ml}$

75. 女, 40岁。因急性化脓性腹膜炎入院。查体:  $T38.9^{\circ}\text{C}$ ,  $P95$ 次/分,  $BP125/85\text{mmHg}$ , 腹膜刺激征明显, 肠鸣音减弱, 移动性浊音阳性。行非手术治疗应取体位是


- A. 平卧位
- B. 头低足高位
- C. 头、躯干和下肢各抬高  $20^{\circ}$
- D. 左侧卧位
- E. 半卧位

76. 结核性腹膜炎主要感染途径是

- A. 肺结核血行播散
- B. 结核性胸膜炎直接蔓延
- C. 腹腔内结核病灶直接蔓延
- D. 肺外结核血行播散
- E. 肠结核急性穿孔播散

77. 与股管构成无关的结构是

- A. 腹股沟韧带



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



- B. 大隐静脉
- C. 股静脉
- D. 腔隙韧带
- E. 耻骨梳韧带

78. 术后复发率最低的腹股沟疝修补方法是

- A. Bassini 法
- B. McVay 法
- C. Ferguson 法
- D. Halsted 法
- E. Shouldice 法

79. 腹部损伤患者入院观察期间禁用的处理措施是

- A. 补充血容量
- B. 注射广谱抗生素
- C. 肌注山莨菪碱
- D. 肌注哌替啶
- E. 诊断性腹腔穿刺

80. 肝脏损伤一般不会出现

- A. 腹膜刺激征
- B. 黑便
- C. 呕血
- D. 继发性肝脓肿
- E. 气腹征

81. 腹部损伤患者开腹探查最常选择的切口是

- A. 左肋缘下切口
- B. 右肋缘下切口
- C. 正中切口
- D. 左旁正中切口
- E. 右旁正中切口


82. 有关克罗恩病病变特点，以下正确的是

- A. 病变多位于左半结肠
- B. 全层连续性病变
- C. 干酪性肉芽肿
- D. 颗粒状溃疡
- E. 纵行溃疡和裂隙溃疡

(83~84 题共用题干)

男，32 岁。支气管哮喘 20 年，喘息加重 1 周，意识恍惚 1 天来急诊。查体：T 37.5℃，P 94 次/分。面色暗红，口唇发绀。可见胸腹矛盾运动。双肺呼吸音低，可闻及低调哮鸣音。

83. 该患者此时最可能出现的动脉血气变化是



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



- A. PaO<sub>2</sub> 降低、PaCO<sub>2</sub> 降低、pH 升高
- B. PaO<sub>2</sub> 降低、PaCO<sub>2</sub> 升高、pH 降低
- C. PaO<sub>2</sub> 降低、PaCO<sub>2</sub> 升高、pH 升高
- D. PaO<sub>2</sub> 降低、PaCO<sub>2</sub> 升高、pH 正常
- E. PaO<sub>2</sub> 降低、PaCO<sub>2</sub> 正常、pH 降低

84. 该患者首选的治疗措施是

- A. 大剂量糖皮质激素静脉点滴
- B. 气管插管、机械通气
- C. β<sub>2</sub> 受体激动剂雾化吸入
- D. 面罩吸氧
- E. 无创通气

(85~88 题共用题干)

男, 71 岁。反复咳嗽、咳痰、气短 36 年, 近 1 周受凉后咳嗽、咳痰加重, 咳脓性痰, 双肺底可闻及湿啰音。动脉血气分析示 pH7.22, PaCO<sub>2</sub> 82mmHg, PaO<sub>2</sub>50mmHg, HCO<sub>3</sub><sup>-</sup> 19.5mmol/L。

85. 该患者最可能的诊断是

- A. COPD, I 型呼吸衰竭
- B. COPD, II 型呼吸衰竭
- C. 支气管哮喘, I 型呼吸衰竭
- D. 支气管哮喘, II 型呼吸衰竭
- E. 支气管扩张, II 型呼吸衰竭

86. 患者的呼吸功能障碍主要为

- A. 通气功能障碍
- B. 换气功能障碍
- C. 通气/血流比例失调
- D. 弥散功能障碍
- E. 肺动-静脉分流增加

87. 患者的酸碱平衡失调类型是

- A. 呼吸性酸中毒
- B. 呼吸性碱中毒
- C. 代谢性酸中毒
- D. 呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒
- E. 呼吸性酸中毒合并代谢性碱中毒

88. 下列治疗措施中不恰当的是

- A. 高流量吸氧
- B. 抗炎
- C. 兴奋呼吸
- D. 维持酸碱平衡
- E. 机械通气

(89~91 题共用题干)

女, 65 岁。高血压病史 18 年。晨起突发剧烈头痛, 视力模糊。查体:BP190/130mmHg, 眼底检查见视盘水肿(IV 级眼底)。

89. 患者应诊断为




- A. 高血压急症
  - B. 高血压脑病
  - C. 恶性高血压
  - D. 高血压眼病
  - E. 高血压危象
90. 应采取首要治疗是
- A. 2~6 小时内迅速将血压降至正常水平
  - B. 使用强力利尿药降压
  - C. 使用快速起效的口服降压药
  - D. 使用 ACEI 类药物逆转靶器官病变
  - E. 控制性降压
91. 应禁用的药物是
- A. 硝酸甘油
  - B. 利血平
  - C. 硝普钠
  - D. 尼卡地平
  - E. 拉贝洛尔

(92~96 题共用题干)

男，59 岁。2 小时前突发胸骨后压榨样剧痛，伴心悸，自服硝酸甘油无缓解。ECG 示 I、aVL 导联 ST 段弓背向上抬高，T 波高耸，ST-T 段形成单相曲线。

92. 患者应诊断为
- A. 急性前间隔心肌梗死
  - B. 急性高侧壁心肌梗死
  - C. 急性局限前壁心肌梗死
  - D. 急性前侧壁心肌梗死
  - E. 急性下壁心肌梗死
93. 最可能发生闭塞的冠状动脉分支是
- A. 左冠状动脉主干
  - B. 左冠状动脉前降支
  - C. 左冠状动脉回旋支
  - D. 右冠状动脉
  - E. 左、右冠状动脉主干
94. 此时行血清心肌坏死标记物检查，升高的指标是
- A. 肌红蛋白
  - B. 肌酸激酶 CK
  - C. 肌钙蛋白 I
  - D. 肌钙蛋白 T
  - E. 肌酸激酶同工酶 CK-MB
95. 以下治疗措施最适宜的是
- A. 经皮冠状动脉介入治疗
  - B. rt-PA 溶栓治疗
  - C. 哌替啶 50mg 肌内注射
  - D. 硝酸酯类药物



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM





E.  $\beta$ 受体拮抗剂

96. 入院第3天患者突发喘憋，咯粉红色泡沫样痰，不能平卧。查体：心率110次/分，血压90/60mmHg，面灰唇绀，大汗淋漓，心尖部闻及4/6级收缩期吹风样杂音，双肺满布中小水泡音。患者最可能发生

- A. 感染性心内膜炎
- B. 自发性气胸
- C. 肺动脉栓塞
- D. 急性心包炎
- E. 乳头肌功能失调

(97~99题共用题干)

患者，男，40岁。因发热、胸痛伴心包摩擦音，曾用非激素类抗炎药。2周后，呼吸困难加重，心率110次/分，律齐，心音遥远，血压90/70 mmHg。肝脏肿大，下肢水肿。

97. 患者近2周出现的病情变化可能为

- A. 肾功能不全
- B. 心脏压塞
- C. 右心功能不全
- D. 黏液性水肿
- E. 肝硬化

98. 具有诊断价值的体征是下列哪项

- A. 水冲脉
- B. 短绌脉
- C. 奇脉
- D. 重搏脉
- E. 交替脉


99. 首选的治疗是

- A. 毛花苷
- B. 呋塞米
- C. 体外反搏
- D. 心包穿刺
- E. 抗生素

男，65岁。3小时前突发右上腹剧烈绞痛，伴恶心、呕吐，随后急起寒战、高热，1小时前嗜睡。发病后小便色深。查体：T39.5℃，P130次/分，R30次/分，BP85/55mmHg。神志不清，躁动，皮肤、巩膜明显黄染。右上腹肌紧张，压痛和反跳痛(+)。

100. 引起患者上述表现最可能的病因是

- A. 胆管寄生虫
- B. 胆管狭窄
- C. 胆管肿瘤
- D. 肝内胆管结石
- E. 肝外胆管结石



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

### 第三单元

更多免费资料领取在等你



1. 男，32岁。持续性头痛6天，自觉后枕部紧箍样疼痛，无恶心、畏声和畏光。查体：T36.5℃，BP 120/70mmHg，眼压无异常，张口颞颌关节无弹响，双颞肌和枕肌明显压痛，余神经系统检查无异常。脑MRI无异常。最可能的诊断是

- A. 颈椎病
- B. 血管性头痛
- C. 紧张性头痛
- D. 无先兆偏头痛
- E. 颞颌关节紊乱

2. 女，78岁。4小时前醒来发现失语，右上肢活动无力进行性加重，但意识清，脑脊液检查无异常。最有可能的诊断是

- A. 蛛网膜下隙出血
- B. 脑出血
- C. 脑栓塞
- D. 短暂性脑缺血发作
- E. 脑血栓形成

3. 高血压所致脑出血最容易破裂的血管为

- A. 大脑中动脉
- B. 大脑基底动脉脑桥支
- C. 豆纹动脉
- D. 内囊动脉
- E. 大脑后动脉丘脑支

4. 女，68岁。进行性记忆力下降5年。近半年多次因忘记关天然气而引起厨房着火，想不起常用日用品的名称。近日在家找东西，经家里弄得乱七八糟，并怀疑儿媳偷东西。既往体健，家族无类似疾病者，查体无阳性体征。辅助检查：头颅CT示：脑萎缩。HACHINSKI缺血指数表（HIS）评分：3分，患者最可能的诊断是

- A. 阿尔茨海默病
- B. 假性痴呆
- C. 妄想性障碍
- D. 血管性痴呆
- E. 精神分裂症

5. 以下可以提示红细胞破坏增加的检查是

- A. 网织红细胞计数升高
- B. 血清结合珠蛋白降低
- C. 外周血涂片可见有核红细胞
- D. 骨髓检查见红系增生旺盛
- E. 骨髓检查见粒红比例降低

6. 原位溶血多发生于

- A. 再生障碍性贫血



- B. 缺铁性贫血
- C. 遗传性球形红细胞增多症
- D. 蚕豆病
- E. 巨幼细胞贫血

7. 血管内溶血和血管外溶血最主要的鉴别是

- A. 有无黄疸
- B. 有无血红蛋白尿
- C. 有无头痛
- D. 有无血胆红素升高
- E. 有无网织红细胞计数升高

8. 对诊断遗传性球形红细胞增多症具有特异性的检查是

- A. 血红蛋白尿
- B. 黄疸，脾大
- C. 红细胞渗透脆性增加
- D. 抗人球蛋白试验(+)
- E. 冷热溶血试验(+)

9. 遗传性球形红细胞增多症首选治疗方法是

- A. 输注红细胞
- B. 脾切除
- C. 血浆置换
- D. 糖皮质激素
- E. 补充叶酸

10. 与阵发性睡眠性血红蛋白尿无关的试验结果是

- A. Ham 试验(+)
- B. Coombs 试验(+)
- C. 尿含铁血黄素试验(+)
- D. 蛇毒因子溶血试验(+)
- E. 蔗糖溶血试验(+)

11. 男，22岁。2周来发热，伴皮肤瘀点瘀斑。血常规示全血细胞减少；骨髓检查示增生极度活跃，幼红细胞50%，原始细胞占骨髓NEC的40%。诊断为急性白血病，其FAB分型是

- A. M3
- B. M4
- C. M5
- D. M6
- E. M7

12. 急性白血病最主要的死亡原因是

- A. 颅内出血
- B. 败血症



金英杰医学  
YINGJIE.COM



- C. 颅内感染
- D. 卡氏肺孢子菌病
- E. 消化道出血

13. 急淋联合化疗获得完全缓解后复发，最常见部位是

- A. 骨髓
- B. 睾丸
- C. 眼部
- D. 关节
- E. 中枢神经系统

14. 慢性粒细胞性白血病最显著的体征是

- A. 低热，盗汗
- B. 乏力，体重减轻
- C. 脾脏高度肿大
- D. 胸骨压痛
- E. 淋巴结肿大

15. 急性痛风性关节炎最常累及

- A. 第1掌指关节
- B. 第1跖趾关节
- C. 第1近端指间关节
- D. 单侧腕关节
- E. 单侧踝关节

16. 急性痛风性关节炎的确诊依据是


- A. 血尿酸水平 $>420\ \mu\text{mol/L}$
- B. 每日尿酸排出量 $>600\text{mg}$
- C. 发现泌尿系尿酸结石
- D. 关节红、肿、热、痛和功能障碍
- E. 关节液发现双折光针形尿酸盐结晶

17. 类风湿关节炎患者最早出现的症状多为

- A. 近端指间关节痛
- B. 远端指间关节痛
- C. 近端指间关节畸形
- D. 远端指间关节畸形
- E. 晨僵

18. Libman-Sack 心内膜炎常见于

- A 肥厚性心肌病
- B. 川崎病
- C. 系统性红斑狼疮
- D. 二尖瓣换瓣术后



金杰医学  
JINGJIE.COM



E. 类风湿关节炎

19. 女, 35 岁。半年前曾患急性肾盂肾炎。半年来反复发生低热、尿频、腰部酸痛, 1 月来夜尿增多。检查尿比重降低。行静脉肾盂造影见肾盂肾盏变形、缩窄。应诊断为

- A. 急性肾盂肾
- B. 慢性肾盂肾炎
- C. 急性肾炎
- D. 慢性肾炎
- E. 急进性肾小球肾炎

20. 输尿管结石可引起患者恶心、呕吐, 是因为

- A. 结石引发感染并在腹腔扩散
- B. 结石疼痛放射至中下腹部使胃肠痉挛
- C. 结石部位输尿管壁释放催吐因子
- D. 输尿管与肠有共同的神经支配
- E. 应激性胃肠痉挛

21. 男, 74 岁。因前列腺增生行经尿道前列腺切除术, 术后病理显示前列腺外周带局限性高分化癌, 癌组织体积 < 手术标本体积 5%, 直肠指检正常。该患者最适宜的治疗是

- A. 观察随访
- B. 前列腺部分切除术
- C. 根治性前列腺切除术
- D. 睾丸切除术
- E. 外放射治疗

22. 睾丸肿瘤组织学类型中对放疗比较敏感的是

- A. 畸胎瘤
- B. 胚胎癌
- C. 精原细胞瘤
- D. 绒毛膜癌
- E. 卵黄囊瘤

23. 男, 60 岁。1 月前从高处落下致腰部受伤, 后出现排尿困难、夜尿频多, 常有尿失禁。查体: 会阴部皮肤感觉减退。直肠指检未见前列腺增大。B 超检查, 可见膀胱残余尿量约 60ml, 双肾积水。静脉尿路造影显示: 上尿路扩张积水, 膀胱呈“圣诞树”形。血清 PSA 3.0ng/ml。最可能的诊断为

- A. 良性前列腺增生
- B. 前列腺癌
- C. 膀胱颈挛缩
- D. 尿道狭窄
- E. 神经源性膀胱功能障碍

24. 精索静脉曲张患者可能出现的体征是

- A. Eaton 试验(+)
- B. Coombs 试验(+)



- C. Burger 试验(+)
- D. Perthes 试验(+)
- E. Valsalva 试验(+)

25. 急性肾小管坏死少尿期表现包括

- A. 低血钠
- B. 高血钙
- C. 低血磷
- D. 低血钾
- E. 代谢性碱中毒

26. 急性肾小管坏死患者每日输液量约为

- A. 400~500ml
- B. 500~1000ml
- C. 1000~1500ml
- D. 1500~2000ml
- E. 前一日尿量加 500ml

27. 原发性与继发性精索静脉曲张的主要区别是

- A. 症状严重程度
- B. 卧位时静脉曲张是否消失
- C. 是否影响生精功能
- D. Valsalva 试验能否诱发静脉曲张
- E. B 超有无精索静脉管腔扩张改变

28. 腺垂体功能减退患者发生低血糖的主要原因是

- A. ADH 和 OXT 缺乏
- B. SS 和 MSH
- C. PRL 和 LH 缺乏
- D. GH 和 ACTH 缺乏
- E. GH 和 TSH 缺乏

29. 男, 35 岁。诊断为原发性腺垂体功能减退症, 使用糖皮质激素替代治疗 2 年。近 1 年来时有头痛, 头颅 MRI 示直径 1.8cm 垂体腺瘤, 拟行经蝶显微手术切除肿瘤。为防止发生垂体危象, 术前应注意的是

- A. 糖皮质激素剂量加倍
- B. 糖皮质激素生理量维持
- C. 停用糖皮质激素
- D. 加用短效胰岛素
- E. 加用左旋甲状腺素钠

30. 以 a 亚单位为肿瘤标志物的垂体肿瘤是

- A. 无功能垂体瘤
- B. 垂体大腺瘤
- C. 垂体微腺瘤



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



- D. 催乳素瘤
- E. 生长激素瘤

31. 关于垂体生长素瘤的说法，错误的是
- A. 持续发展可导致腺垂体功能减退
  - B. 过多 GH 可导致糖耐量降低和高胰岛素血症
  - C. 始于幼年期的生长素瘤常导致巨人症
  - D. 类胰岛素生长因子-1 可作为筛选和疾病活动性指标
  - E. 没有肿瘤压迫表现者不宜手术治疗


32. 肾上腺髓质嗜铬细胞瘤释放致病物质主要是
- A. 肾上腺素
  - B. 去甲肾上腺素
  - C. 异丙肾上腺素
  - D. 血管活性肠肽
  - E. P 物质

33. 肾上腺外嗜铬细胞瘤发病部位多在
- A. 肾门
  - B. 肝门
  - C. 腹主动脉旁
  - D. 卵巢门
  - E. 后纵隔

34. 下列哪项不属于桡神经损伤表现
- A. 垂腕
  - B. 前臂旋后障碍
  - C. 掌指关节不能背伸
  - D. 手背“虎口”处感觉消失
  - E. 手掌桡侧皮肤感觉减退

35. 前臂双骨折患者可进行前臂旋转活动的时间是
- A. 术后 2 周
  - B. 术后 4 周
  - C. 术后 6 周
  - D. 术后 8 周
  - E. 拍片证实骨折已愈合

36. 机体对创伤和感染代谢反应不同于禁食代谢反应的主要特点是
- A. 机体能量消耗减少
  - B. 处理葡萄糖的能力降低
  - C. 体内蛋白质分解缓慢
  - D. 尿氮减少
  - E. 脂肪动员减慢



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



37. 男, 45 岁。体重 80kg, 食管平滑肌瘤切除术后。每日能量摄入量应为

- A. 1600kcal
- B. 1800kcal
- C. 2000kcal
- D. 2200kcal
- E. 2400kcal

38. 肠内营养最严重的并发症是

- A. 腹痛
- B. 恶心、呕吐
- C. 误吸及吸入性肺炎
- D. 营养不良
- E. 腹胀、腹泻

39. 关于肠外营养途径的选择, 正确的是

- A. 周围静脉途径多选择上肢末梢静脉
- B. 短期(<2 周)肠外营养应首选中心静脉途径
- C. 中心静脉途径比周围静脉途径安全性高、并发症少
- D. 中心静脉途径最常用的血管是贵要静脉
- E. 长期肠外营养应首选周围静脉途径

40. 以下不属于特异性感染的是

- A. 结核病
- B. 丹毒
- C. 念珠菌病
- D. 气性坏疽
- E. 破伤风

41. 软组织化脓感染中, 较少发生组织坏死或化脓的是

- A. 疔
- B. 丹毒
- C. 急性蜂窝织炎
- D. 痈
- E. 甲沟炎

42. 女性, 46 岁, 左乳外上象限无痛性肿物 3 cm 直径, 与皮肤轻度粘连, 左腋下触及 2 个可活动的淋巴结, 诊断为“乳腺癌”。按 TNM 分期, 应为

- A. T1N0M0
- B. T1N1M0
- C. T2N0M0
- D. T2N1M0
- E. T2N2M0





43. 女, 45 岁。左乳房无痛性肿物 3 个月余。查体: 左乳外上象限有 1.5 cm×1.0 cm×1.0 cm 肿块, 表面不光滑, 界限不清, 活动度尚可。患者术后 3 年出现腰背部疼痛, 逐渐加重。为明确诊断, 首选的主要检查是

- A. PET-CT
- B. CEA
- C. CA153
- D. 同位素骨扫描
- E. 免疫指标检测

44. 男, 26 岁。因急性一氧化碳中毒入院, 治疗 1 周后症状消失出院, 2 个月后突然出现意识障碍。既往无高血压及脑血管病史。最可能的诊断是

- A. 脑出血
- B. 脑梗死
- C. 肝性脑病
- D. 中毒迟发型脑病
- E. 中间综合征

45. 中度有机磷杀虫药中毒患者, 血 ChE 活力值应为

- A. <30%
- B. 30%~50%
- C. 50%~70%
- D. 70%~100%
- E. 无特异性临床意义

46. 男性, 50 岁, 被家人发现其昏迷在浴室中。查体: 浅昏迷, 瞳孔正常大小, 皮肤潮红, 口唇樱桃红色。急查血 COHb 浓度为 35%, 应诊断为

- A. 急性 CO 中毒, 轻度
- B. 急性 CO 中毒, 中度
- C. 急性 CO 中毒, 重度
- D. 急性 CO 中毒, 极重度
- E. 未达 CO 中毒诊断标准

47. 7 月初, 6 岁小儿突发高热, 抽搐, 昏迷, 脑膜刺激征 (±), 初步诊为乙脑, 首先要和哪种疾病鉴别

- A. 中毒性菌痢
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 散发性脑炎
- D. 感染中毒性脑病
- E. 结核性脑膜炎

48. 患者女性, 15 岁, 因发热伴剧烈头痛、频繁呕吐、抽搐 2 天, 于 8 月 15 日来诊。家中住平房, 蚊子多, 周围有类似患者。查体: T39.8℃, P120 次/分, BP150/90mmHg, 意识不清, 皮肤无皮疹, 瞳孔等大等圆, 对光反射存在, 颈无抵抗, Kernig 征及 Babinski 征 (+)。实验室检查: 血 WBC15×10<sup>9</sup>/L, N0.75, CSF 检查: 压力 230mmH<sub>2</sub>O, 外观清亮, 有核细胞数 200×10<sup>6</sup>/L, 单核 0.9, 蛋白轻度升高, 糖、



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



氯化物正常。首先考虑的诊断是

- A. 钩端螺旋体病
- B. 肾综合征出血热
- C. 流行性脑脊髓膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 结核性脑膜炎

49. 男性, 36 岁。突然高热, 寒战, 头痛, 呕吐, 烦躁不安, 意识障碍, 查: T37.6°C, P100 次/分, BP10/8kPa, 心肺未见异常, 皮肤可见淤点和淤斑, 需要首先处置是

- A. 抗生素
- B. 补充血容量及纠正酸中毒
- C. 肾上腺皮质激素
- D. 升压药
- E. 脱水治疗

50. 9 岁, 学生。1 日前因突起高热、剧烈头痛、恶心伴非喷射性呕吐 1 次入院。体检: 神清, 全身皮肤散在淤点、淤斑, 颈项抵抗。心率 120 次/分, 两肺无异常, 腹软无压痛。化验检查: 血白细胞计数  $20 \times 10^9/L$ , 中性粒细胞 89%。淋巴细胞 5%, 单核细胞 6%。最可能的诊断是

- A. 伤寒
- B. 流行性脑脊髓膜炎
- C. 结核性脑膜炎
- D. 流行性乙型脑炎
- E. 病毒性脑炎

51. 3 岁小儿, 发热 3 天, 有头痛, 呕吐, 查: 皮肤有淤点, 淤斑, 及脑膜刺激症状 (+), 腰穿脑压升高, 外观混浊, 细胞数  $2000 \times 10^6/L$ , 糖和氯化物明显降低, 蛋白含量明显升高, 脑脊液直接涂片检菌阳性, 临床诊断

- A. 肺炎双球菌性脑膜炎
- B. 普通型流脑
- C. 结核性脑膜炎
- D. 脑膜脑炎型流脑
- E. 病毒性脑膜炎

52. 患者男性, 28 岁。腹泻半天, 于 8 月 15 日来诊。腹泻 30 多次, 开始为稀便, 后为水样便, 继之多次呕吐。查体: T36.5°C, P110 次/分, BP60/40mmHg, 神志清楚, 皮肤干燥, 弹性差。腹软, 无压痛。粪常规: 水样便, 镜检 WBC0~3/HP, RBC0~2/HP。最可能的诊断是

- A. 阿米巴痢疾
- B. 急性细菌性痢疾
- C. 霍乱
- D. 胃肠型细菌性食物中毒
- E. 溃疡性结肠炎

53. 患者男性, 38 岁, 船民, 昨晚进食海蟹一只, 晨起腹泻稀水便, 10 小时内排便 20 余次, 量多。水样, 无臭味, 中午呕吐 3~4 次, 初起水样, 后为米泔水样, 发病后无排尿, 就诊时呈重度脱水征, 意



识淡漠，BP80/50mmHg，下列检查对明确诊断无帮助的是

- A. 血清凝集试验
- B. 大便悬滴镜检
- C. 大便碱性蛋白胨增菌培养
- D. 血培养
- E. 大便涂片革兰染色镜检

54. 患者男性，35岁，因腹泻1天，于7月16日来诊，腹泻次数多不可数，为稀便和大量水样便，继之呕吐4次，尿少，无发热，无明显腹痛及里急后重。5天前去外地旅游，昨日归来。查体：T35.5℃，P120次/分，BP70/40mmHg，精神萎靡，烦躁，皮肤弹性差，口干，腹部凹陷，无肌紧张、压痛及反跳痛，肠鸣音活跃。实验室检查：血WBC $18 \times 10^9/L$ ，Hb170g/L。便常规检查：水样便，镜检WBC0~2个/HP。为明确诊断，最有价值的检查是

- A. 血生化
- B. 粪潜血实验
- C. 结肠镜检查
- D. 红细胞沉降率
- E. 粪便动力及制动试验

55. 35岁女性。因剧烈的呕吐和腹泻水样物1天入院，查BP80/60mmHg，P100次/分，腹部无压痛。心肺正常。首先需要处置的是

- A. 做血、便常规检查，以明确诊断
- B. 应用血管收缩剂
- C. 抗生素应用
- D. 补充液体
- E. 以上都不可以

56. 钩端螺旋体病人肌注80万U青霉素及链霉素0.5g后，3小时出现明显寒战，高热，头痛，全身痛，脉快，呼吸急促，肺有少许啰音，血压17.6/8kPa此种情况可考虑

- A. 链霉素过敏反应
- B. 青霉素过敏反应
- C. 青霉素的“治疗后加重反应”
- D. 重症钩端螺旋体病表现
- E. 钩端螺旋体病并发肺炎

57. 27岁农民，左侧上下肢体运动障碍，伴有语言发音困难1周，无头痛，无意识障碍或精神异常，左侧上下肢肌力重度，左侧鼻唇沟较右侧浅，伸舌偏右侧，未发现腹膜刺激症，巴氏征(+)，血象WBC $15.4 \times 10^9/L$ ，核左移，患者1个月前曾发热，肌肉痛6天，最可能的诊断

- A. 结核性脑膜炎
- B. 脑栓塞
- C. 脑动脉瘤
- D. 散发性病毒性脑炎
- E. 钩端螺旋体病，并发闭塞性脑动脉炎

58. 某患儿，因确诊伤寒，住院治疗10天，完全恢复出院。出院半个月后又开始发热，体温38.2~39.4℃，



医学精英网  
WWW.YINGJIE.COM



持续 8 天，食欲下降，腹胀腹泻，大便每天 2~3 次，稀无脓血。体检，肝肋下 2cm，脾肋下 3cm，血常规白细胞数  $5.4 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.80，血培养又出现伤寒菌生长。该病人的诊断是

- A. 伤寒迁延型
- B. 伤寒合并肺炎
- C. 伤寒反复感染
- D. 伤寒复燃
- E. 伤寒复发

59. 女孩，7 岁，因畏寒、发热 8 天，伴纳差、腹胀、腹痛，大便每天 1~2 次，略稀，当地医院用青霉素治疗热不退转来。体检：体温  $39.2^{\circ}C$ ，神志清，精神萎靡，表情淡漠，舌苔厚，心肺无异常，腹略胀，肝肋下 2cm，脾肋下 3cm，质软，经血培养证实为伤寒。关于伤寒，其典型的临床表现是

- A. 弛张热，脾肿大，玫瑰疹，间歇脉，白细胞降低
- B. 稽留热，脾肿大，玫瑰疹，奇脉，白细胞升高
- C. 持续发热，脾肿大，玫瑰疹，相对缓脉，白细胞计数减低
- D. 持续发热，脾肿大，瘀点，重脉，白细胞计数降低
- E. 不规则发热，脾肿大，瘀点、相对缓脉，白细胞计数升高

60. 中毒性细菌性痢疾的诊断中，不强调的是

- A. 反复惊厥，发生休克或呼吸衰竭
- B. 病情迅速恶化
- C. 急性起病伴高热
- D. 大便检查异常
- E. 脑膜刺激征阳性

61. 患儿女，7 岁，因发热 3 天，伴头痛及喷射性呕吐 3 次，反复抽搐 10 多次，于 8 月 1 日来院就诊。体检：体温  $40^{\circ}C$ ，神志欠清，双瞳孔 3mm，对光反应迟钝，颈有抵抗，心脏无异常，两肺呼吸音粗，腹壁及提睾反射未引出，膝反射减弱，克氏征、布氏征均阳性，诊断流行性乙型脑炎重型。下列抢救措施中错误的是

- A. 立即采用等张液体扩充血容量
- B. 立即注射 20%甘露醇
- C. 立即采用物理及药物降温
- D. 立即采用药物止痉
- E. 保持呼吸道通畅，吸氧，必要时气管插管，人工呼吸

62. 肾综合征出血热的“三大”主征

- A. 发烧，休克，少尿
- B. 出血，休克，肾损害
- C. 发烧，出血，肾损害
- D. 发烧，出血，“三痛”
- E. 休克，少尿，“三痛”

63. 肾综合征出血热少尿期治疗原则哪一项是错误的

- A. 稳定内环境
- B. 高蛋白饮食



- C. 促进利尿
- D. 导泻和放血
- E. 透析

64. 下列哪项不是肾综合征出血热出血原因

- A. 毛细血管脆性增加
- B. 毛细血管损伤
- C. 血小板减少
- D. 凝血机制障碍
- E. 血液浓缩

65. 肾综合征出血热休克期，下列哪种药物不宜首先使用

- A. 血管活性药物
- B. 碳酸氢钠
- C. 低分子右旋糖酐
- D. 平衡盐
- E. 高渗葡萄糖

66. 肾综合征出血热早期休克的主要原因

- A. 病毒血症
- B. 血浆外渗
- C. 心肌损害
- D. 微血管痉挛
- E. 电解质紊乱

67. 肾综合征出血热的传染源是

- A. 野生鼠类
- B. 猪
- C. 病毒携带者
- D. 犬
- E. 急性期病人



(68~70 题共用题干)

男，54 岁。外出途中突然头痛、眩晕，伴呕吐、走路不稳前来急诊。查体：BP180/105mmHg，心率 62 次/分，双眼向右水平眼震，右手指鼻不准，右侧跟膝胫实验阳性。

68. 最可能的诊断是

- A. 右小脑半球出血
- B. 脑桥出血
- C. 基底节区出血
- D. 右枕叶出血
- E. 右大脑梗死

69. 为进一步明确诊断，应采取的主要措施是

- A. 脑血管造影
- B. 详细追问有关病史



- C. 脑电图
  - D. 头颅 CT
  - E. 脑脊液检查
70. 首先应采取的处理措施是
- A. 快速静脉滴注地塞米松 10mg
  - B. 利血平降血压
  - C. 降低颅内压
  - D. 肌注苯巴比妥钠预防癫痫
  - E. 若 CT 示出血量达到 5ml 时, 手术治疗

(71~73 题共用题干)

男, 18 岁。低热、鼻出血 1 周。查体: T 37.5°C, 胸骨下段有压痛, 全身浅表淋巴结肿大, 肝脾轻度肿大。骨髓检查: 原始细胞比例为 54%, MPO(-), NSE(-), PAS (+)。

71. 该患者最可能的诊断为
- A. 急性淋巴细胞白血病
  - B. 急性早幼粒细胞白血病
  - C. 急性粒-单核细胞白血病
  - D. 急性单核细胞白血病
  - E. 急性巨核细胞白血病
72. 其首选诱导缓解治疗方案的基础用药是
- A. IA 方案
  - B. DA 方案
  - C. VP 方案
  - D. 全反式维 A 酸方案
  - E. ABVD 方案

73. 经上述治疗获得完全缓解一年后, 患者一侧睾丸呈无痛性肿大, 外周血复现白血病细胞, 查骨髓原始细胞比例为 10%。应予以治疗是

- A. 再次诱导化疗, 睾丸病变无需处理
- B. 单侧睾丸照射+全身化疗
- C. 单侧睾丸切除+全身化疗
- D. 双侧睾丸照射+全身化疗
- E. 双侧睾丸切除+全身化疗

(74~76 题共用题干)

男, 36 岁。低热、盗汗伴左上腹部坠胀感 1 年。查体: 脾肋下 6cm, 质地坚实, 无压痛。血象: Hb80g/L, WBC120X10<sup>9</sup>/L。骨髓象: 原始细胞 6%。Ph 染色体(+)

74. 该患者最可能的诊断是
- A. 结核性腹膜炎
  - B. 骨髓纤维化
  - C. 慢性髓系白血病
  - D. 慢性淋巴细胞白血病
  - E. 类白血病反应
75. 本病的特征性改变是
- A. Auer 小体



英杰医学  
YINGJIE.COM



- B. 结核结节
  - C. NAP 强阳性
  - D. BCR-ABL 融合基因
  - E. 绿色瘤
76. 治疗药物应首选
- A. 羟基脲
  - B. 异烟肼
  - C. 白消安
  - D. TNF- $\alpha$
  - E. 甲磺酸伊马替尼

(77~78 题共用题干) 男, 65 岁。发现无痛性肉眼血尿 2 月余。膀胱镜检查发现膀胱侧壁 4cm $\times$ 3.5cm 浸润性新生物。病理诊断为膀胱鳞癌, 浸润黏膜固有层。

77. 该患者膀胱癌病理分期应为

- A. Tis
- B. Ta
- C. T1
- D. T2
- E. T3

78. 最适宜的治疗是

- A. 经尿道膀胱肿瘤电切术
- B. 膀胱部分切除术
- C. 根治性膀胱全切除术
- D. 卡介苗膀胱灌注化疗
- E. 姑息性放射治疗

(79~81 题共用题干)

男, 29 岁, 父兄多人有尿石症史。1 小时前突发左腰部疼痛, 疼痛放射至左侧腹股沟, 同时伴恶心。呕吐。查体: 左腰部轻度压痛、叩击痛。实验室检查: 尿 RBC10/HP。拟诊断为输尿管结石。

79. 应首选的辅助检查是


- A. B 超
- B. X 线平片
- C. 静脉尿路造影
- D. 逆行肾盂造影
- E. 增强 CT

80. (假设信息) 患者行尿路 X 线平片检查未见异常, 则结石成分最可能为

- A. 草酸钙结石
- B. 磷酸镁铵结石
- C. 胱氨酸结石
- D. 磷酸钙结石
- E. 碳酸钙结石

81. 如上一题诊断成立, 临床检测结石直径为 0.5cm, 则首选治疗为

- A. 体外冲击波碎石治疗
- B. 经皮肾镜碎石取石术



金英杰医学网  
JINYINGJIE.COM



- C. 膀胱镜输尿管取石术
- D. 酸化尿液，排石治疗
- E. 碱化尿液，排石治疗

(82~85 题共用题干)女，48 岁，5 年前诊断为类风湿关节炎，间断理疗辅以非甾体类抗炎药，病情时好时坏。近半年来感双手各指关节疼痛逐渐加重。查体：双手第 2、3、5 近端指间关节和掌指关节肿胀，压痛明显；双腕关节肿胀，屈伸活动明显受限。双手 X 线平片示骨质疏松，双腕关节各骨融合，双手受累，关节面虫蚀样改变。

82. 患者行血清学检查，最可能呈阴性的抗体是

- A. AKA
- B. 抗 Sm 抗体
- C. RF
- D. APF
- E. 抗 CCP 抗体

83. 根据患者双手 X 线平片表现，其类风湿关节炎分期是

- A. I 期
- B. II 期
- C. III 期
- D. IV 期
- E. 0 期

84. 拟对患者行抗风湿治疗，首选用药是

- A. 糖皮质激素
- B. 柳氮磺吡啶
- C. 环磷酰胺
- D. 甲氨蝶呤
- E. 利妥昔单抗

85. 患者病程中出现发热、乏力食欲减退；查体：面色苍白、脾大；实验室检查示贫血、中性粒细胞减少、血小板减少。应诊断为

- A. 并发急性再生障碍性贫血
- B. 并发慢性粒细胞白血病
- C. HELLP 综合征
- D. Caplan 综合征
- E. Felty 综合征

(86~89 题共用题干)

女，45 岁。8 年前分娩后无乳汁分泌，月经始终未复潮，食欲、性欲减退，阴毛、腋毛脱落，渐有畏寒、乏力、嗜睡、厌食，面色苍白

86. 问诊时应了解的最重要病史是

- A. 月经史
- B. 分娩出血史
- C. 外伤出血史
- D. 感染史
- E. 结核病史

87. 最可能的诊断是



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM





- A. 腺垂体功能减退症
  - B. 甲状腺功能减退症
  - C. 肾上腺皮质功能减退症
  - D. 卵巢早衰
  - E. 神经性厌食症
88. 患者病变器官组织破坏至少
- A. 15%
  - B. 30%
  - C. 50%
  - D. 75%
  - E. 95%
89. 首选的治疗药物是
- A. 雄激素
  - B. 孕激素
  - C. 催乳素
  - D. 甲状腺激素
  - E. 糖皮质激素

(90~91 题共用题干)

女, 35 岁。阵发性高血压半年, 发作时血压可达 210/100mmHg, 伴面色苍白、大汗淋漓、心动过速, 发作时血钾 3.9mmol/L. 发作间期血压正常。 90. 对诊断最有价值的是

- A. ACTH 兴奋试验
  - B. 螺内酯试验
  - C. 头颅 MRI 检查
  - D. 尿甲氧基肾上腺素和甲氧基去甲肾上腺素测定
  - E. 尿香草基杏仁酸测定
91. 手术前降血压治疗应首选
- A. 哌唑嗪
  - B. 硝苯地平
  - C. 卡托普利
  - D. 普萘洛尔
  - E. 硝普钠

(92~93 题共用题干)

女, 52 岁。糖尿病病史 12 年。眼底检查见棉絮状软性渗出。24 小时尿蛋白总量 0.4g, 尿白蛋白排泄率持续在 160 μg/min. 肾穿刺病理检查见 GBM 增厚, 系膜基质明显增宽, 小动脉壁玻璃样变。

92. 该患者糖尿病肾病的分期是
- A. I 期
  - B. II 期
  - C. III 期
  - D. IV 期
  - E. V 期
93. 该患者糖尿病性视网膜病变的分期是
- A. I 期视网膜病变



- B. II 期视网膜病变
- C. III 期视网膜病变
- D. IV 期视网膜病变
- E. 增殖期视网膜病变

(94~97 题共用题干)

男，46 岁，腰痛伴右侧下肢放射痛 2 个月，来诊时上身向左侧弯曲，腰椎向右侧凸。查体：腰部活动受限，小腿前外侧和足内侧感觉减退；仰卧位右腿被动抬高 45° 时出现放射性痛。腰椎 X 线平片未见异常。

94. 最可能的诊断是

- A. 腰椎结核
- B. 腰椎肿瘤
- C. 腰椎间盘突出症
- D. 腰肌劳损
- E. 第三腰椎横突综合征

95. 最可能的病变节段是

- A. L1-2
- B. L2-3
- C. L3-4
- D. L4-5
- E. L5-S1

96. 推测患者病变与神经根的位置关系是

- A. 病变在神经根的上方
- B. 病变在神经根的下方
- C. 病变在神经根的内侧
- D. 病变在神经根的外侧
- E. 无法判断两者位置关系

97. 最适合的治疗方法是

- A. 卧床 3 周，骨盆牵引
- B. 卧床 3 月，牵引理疗
- C. 抗癆治疗，局部制动
- D. 休息理疗，局部封闭
- E. 择期手术，病灶摘除

(98~100 题共用题干)

男孩，5 岁。摔倒致左小腿皮肤擦伤，第 2 天发生寒战、高热，体温 39.6℃。右膝部剧烈疼痛，不敢活动，局部皮温增高，压痛明显，但无明显肿胀。血常规：WBC22x10<sup>9</sup>/L，N0.94。X 线检查未见异常。

98. 应首先考虑的诊断是

- A. 骨肿瘤
- B. 膝关节结核
- C. 急性血源性骨髓炎
- D. 急性化脓性关节炎
- E. 急性创伤后骨髓炎

99. 为明确病因，下列诊断方法最有意义的是



英杰医学  
YINGJIE.COM



- A. 血培养
- B. CT
- C. MRI
- D. 核素骨显像
- E. 局部分层穿刺

100. 选择抗生素治疗的方法是

- A. 立即选用 1 种广谱抗生素治疗
- B. 待检出致病菌后选择 1 种敏感抗生素
- C. 立即选用 2 种抗生素, 其一针对 G+球菌, 另一针对 G-杆菌
- D. 立即选用 2 种抗生素, 其一针对 G-球菌, 另一为广谱抗生素
- E. 立即选用 2 种抗生素, 其一针对 G+杆菌, 另一为广谱抗生素

## 第四单元



1. 下列关于婴儿期的特点叙述正确是

- A. 是新生儿期后的第二个生长发育高峰期
- B. 特别容易发生意外伤害
- C. 发生传染性疾病几率极低
- D. 是语言发育最迅速的时期
- E. 容易发生营养障碍性疾病

2. 体内来自母体的抗体数量逐渐减少消失的时期应该是

- A. 胎儿期
- B. 新生儿期
- C. 婴儿期
- D. 幼儿期
- E. 学龄前期

3. 新生儿在出生后生理性体重下降的正常范围是

- A. 5%~10%
- B. 1%~2%
- C. 3%~5%
- D. 3%~9%
- E. 10%~15%

4. 某幼儿园一男孩体检结果显示: 身高 114cm, 体重 20kg, 尚未开始换牙, 左手腕部 X 线骨片示头状骨、钩骨、下桡骨骺、三角骨、月骨、大小多角骨、舟骨骨化中心已出现。其最可能的年龄是

- A. 8 岁
- B. 7 岁
- C. 6 岁
- D. 5 岁
- E. 4 岁

金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



5. 一般 7~8 个月小儿，添加辅食食物性状应该是
- A. 菜泥
  - B. 水果
  - C. 烂面条末
  - D. 碎肉
  - E. 豆制品
6. 下列指标中，主要反映慢性长期营养不良的是
- A. 皮下脂肪层变薄
  - B. 消瘦
  - C. 血浆白蛋白水平降低
  - D. 生长迟缓
  - E. 体重低下
7. 下列哪种因素相对于其他因素，不容易导致维生素 D 缺乏性佝偻病的发生
- A. 纯母乳喂养的婴儿、户外活动较少者
  - B. 婴儿早期
  - C. 重度营养不良婴儿
  - D. 冬季出生的婴儿
  - E. 长期服用抗惊厥药物的婴儿
8. 维生素 D 缺乏性手足搐搦症患儿，突然出现面色青紫、呼吸困难，立即处置为
- A. 肌内注射安定
  - B. 迅速静注葡萄糖酸钙
  - C. 以 10%水合氯醛保留灌肠
  - D. 迅速补充维生素 D
  - E. 立即将舌头拉出口外
9. 早产儿出生后立即出现进行性呼吸困难，最可能发生的疾病是
- A. 先天性心脏病
  - B. 胎粪吸入综合征
  - C. 吸入性肺炎
  - D. 湿肺
  - E. 新生儿呼吸窘迫综合征
10. 出生后即有且终生存在的神经反射是
- A. 拥抱反射
  - B. 膝腱反射
  - C. 握持反射
  - D. 觅食反射
  - E. 腹壁反射
11. 超低出生体重新生儿的出生体重低于



- A. 1000 g
- B. 2500 g
- C. 1500 g
- D. 800 g
- E. 2000 g

12. 小儿结核病中最严重的类型是

- A. 结核性脑膜炎
- B. 结核性胸膜炎
- C. 结核性心包炎
- D. 原发型肺结核
- E. 急性粟粒性肺结核

13. 诊断小儿结核性脑膜炎最可靠的依据是

- A. 眼底检查
- B. 脑脊液成分检查
- C. 脑脊液涂片抗酸染色
- D. 脑脊液结核分枝杆菌培养
- E. 脑膜组织活检

14. 小儿胰酶最先出现的是

- A. 胰蛋白酶
- B. 糜蛋白酶
- C. 羧基肽酶
- D. 脂肪酶
- E. 淀粉酶

15. 婴儿期一般不会发生扁桃体炎的原因是


- A. 母体 IgG 的保护作用
- B. 口、咽、喉黏膜存在丰富的 sIgA
- C. 咽鼓管较宽呈水平位
- D. 腭扁桃体 1 岁末才逐渐发育增大
- E. 接触外界致病微生物的机会较少

16. 患儿，女，2 岁。因智力发育落后 1 年伴间断抽搐半年就诊。查体：皮肤色泽浅，头发呈黄色，肌张力较高。对明确诊断最有意义的检查是

- A. 染色体核型分析
- B. 血钙、磷、镁、碱性磷酸酶
- C. 尿有机酸分析
- D. 血甲状旁腺素
- E. 血 TSH、T4

17. 麻疹最常见的并发症为

- A. 结核病恶化



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



- B. 肺炎
- C. 脑炎
- D. 喉炎
- E. 心肌炎

18. 引起水痘的病原体是

- A. 水痘病毒
- B. 带状疱疹病毒
- C. EB 病毒
- D. 水痘-带状疱疹病毒
- E. 单纯疱疹病毒

19. 关于麻疹流行病学下述错误的是

- A. 麻疹患儿是唯一传染源
- B. 出疹前后 5 天均有传染性
- C. 病毒存在于眼结膜、鼻、口咽和气管等分泌物中
- D. 通过喷嚏、咳嗽等由飞沫传播
- E. 只能通过粪便传播

20. 患儿猩红热皮疹特点为

- A. 皮疹粗糙，鸡皮样疹
- B. 常有散在糠屑样脱皮
- C. 在腋窝、腹股沟等皮肤皱褶处皮疹密集
- D. 常在 24 小时内遍及全身
- E. 疹间皮肤亦呈红色

21. 以下主要由细菌感染导致的疾病是

- A. 手足口病
- B. 水痘
- C. 猩红热
- D. 麻疹
- E. 风疹

22. 最有效预防麻疹的措施是

- A. 应用免疫球蛋白
- B. 采用麻疹减毒活疫苗
- C. 应用胎盘球蛋白
- D. 应用成人血浆
- E. 应用维生素 A

23. 男婴，出生 3 天才排出胎便，此后一直顽固性便秘，6~8 天排便 1 次。昨日起患儿高热、呕吐、高度腹胀，排出恶臭并带血的稀便。最可能并发了

- A. 肠穿孔
- B. 肠伤寒



- C. 肠结核
- D. 小肠结肠炎
- E. 中毒性巨结肠

24. 以血压计袖带包裹小儿上臂，使血压维持在收缩压与舒张压之间，5 分钟之内该手出现痉挛症状，此为

- A. 巴彬斯基征 典型维生素 D 缺乏性手足抽搐症
- B. 布鲁辛基征 隐匿型维生素 D 缺乏性手足抽搐症
- C. 面神经征 典型维生素 D 缺乏性手足抽搐症
- D. 凯尔尼格征 隐匿型维生素 D 缺乏性手足抽搐症
- E. 陶瑟征 隐匿型维生素 D 缺乏性手足抽搐症

25. 新生儿已经发生呼吸道和消化道细菌感染的原因是

- A. sIgA 缺乏
- B. IgG 缺乏
- C. IgM 缺乏
- D. T 细胞免疫功能低下
- E. 胎盘屏障不健全

26. 下列不属于新生儿生理状态的是

- A. 马牙和螳螂嘴
- B. 生后 4~7 天出现乳腺肿大
- C. 生后 24 小时内出现黄疸
- D. 生后 1~2 天头部、躯干、四肢多形性斑丘疹.
- E. 女婴生后 5~7 天阴道流出少许血性分泌物

27. 早产儿生后护理不恰当的是

- A. 常规吸氧
- B. 低体温者应置于温箱中
- C. 连续 3 天肌内注射维生素 K
- D. 尽早母乳喂养
- E. 仰卧时在肩下放置软垫

28. 判断新生儿缺血缺氧性脑病严重程度的主要依据是

- A. 血清 CPK-BB
- B. 脑电图
- C. 颅脑超声
- D. 临床表现
- E. 头颅 CT

29. 以下不属于新生儿呼吸窘迫综合征发病高危因素的是

- A. 孕期曾用糖皮质激素
- B. 孕母患糖尿病
- C. 前置胎盘



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



- D. 早产儿
- E. 择期剖宫产

30. 女性, 30 岁, 已婚 3 年未孕, 月经规律, 4~5/(28~30) 天, 量中, 近 2 年痛经 (+)。妇科检查: 子宫后倾, 正常大小, 活动度差。左侧附件可扪及 8cm×7cm×6cm 囊性肿块, 轻压痛, 右附件 (-)。B 超检查: 左侧卵巢囊肿。诊断为左侧卵巢巧克力囊肿。该患者宜选用的治疗方法为

- A. 高效孕激素周期疗法
- B. 经期用消炎痛对症治疗
- C. 假孕疗法
- D. 假绝经疗法
- E. 行左侧巧克力囊肿切除术

31. 女, 45 岁。同房后阴道流血 3 个月, G5P5。妇科检查: 宫颈重度糜烂状, 下唇息肉样赘生物, 直径 2cm, 三合诊宫颈旁组织无异常, 取宫颈赘生物送病理, 提示宫颈鳞癌。首选的治疗方法是

- A. 根治性放疗
- B. 宫颈锥形切除术
- C. 广泛性子宫切除+盆腔淋巴结切除术
- D. 子宫颈切除+盆腔淋巴结切除术
- E. 筋膜外子宫切除术

32. 子宫肌瘤继发贫血最常见于

- A. 浆膜下子宫肌瘤
- B. 黏膜下子宫肌瘤
- C. 肌壁间子宫肌瘤
- D. 肌瘤红色变性
- E. 肌瘤玻璃样变

33. 绝经后阴道出血, 以下哪种疾病的可能性最小

- A. 萎缩性阴道炎
- B. 宫颈癌
- C. 子宫内膜癌
- D. 卵巢癌
- E. 子宫肌瘤

34. 产褥妇, 产后 3 天, 出现急性腹痛伴发热 2 天, 腹部包块增大, 曾诊断患“子宫肌瘤”。本例应考虑的诊断是

- A. 产褥感染
- B. 子宫肌瘤囊性变
- C. 子宫肌瘤玻璃样变
- D. 子宫肌瘤红色变
- E. 子宫肌瘤恶性变

35. 女, 55 岁。绝经 2 年, 阴道流血 1 个月。外阴、阴道萎缩不明显, 宫颈光滑, 子宫正常大小, 右侧触及 8cm×6cm×4cm 大小韧性椭圆形包块, 稍活动, 左附件正常。阴道细胞涂片提示雌激素水平高度影





响。行分段诊刮，子宫内膜病理活检为子宫内膜腺囊性增生，颈管内膜未见异常。首先应考虑为

- A. 功能失调性子宫出血
- B. 卵巢皮样囊肿
- C. 卵巢子宫内膜异位囊肿
- D. 卵巢颗粒细胞瘤
- E. 子宫内膜癌

36. 女, 23 岁。夜间排尿后突然右下腹剧痛, 随后恶心、呕吐。平时月经规律, 末次月经为 10 天前。妇科检查子宫右侧可触及手拳大小囊实性包块, 触痛, 推移后疼痛加剧。首先考虑

- A. 输卵管妊娠破裂
- B. 急性阑尾炎
- C. 卵巢囊肿蒂扭转
- D. 急性附件炎
- E. 卵巢黄体破裂

37. 好发于儿童及青少年的卵巢肿瘤是

- A. 性索间质肿瘤
- B. 生殖细胞肿瘤
- C. 上皮性肿瘤
- D. 转移性癌
- E. 非特异性间质肿瘤

38. 良性卵巢肿瘤伴右侧胸水形成可见于

- A. 浆液性囊腺瘤
- B. 黏液性囊腺瘤
- C. 卵泡膜细胞瘤
- D. 纤维瘤
- E. 皮样囊肿


39. 卵巢肿瘤发生蒂扭转的时候, 其扭转的蒂的组成是

- A. 子宫圆韧带、输卵管
- B. 子宫圆韧带、卵巢悬韧带
- C. 子宫圆韧带、输卵管和骨盆漏斗韧带
- D. 子宫圆韧带、输卵管和卵巢固有韧带
- E. 骨盆漏斗韧带、输卵管和卵巢固有韧带

40. 最易形成囊肿的部位是

- A. 阴阜
- B. 尿道旁腺
- C. 阴道前庭窝
- D. 前庭球
- E. 前庭大腺

41. 女性腹腔最低部位是



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



- A. 阴道前穹隆
- B. 阴道后穹隆
- C. 直肠子宫陷凹
- D. 膀胱子宫陷凹
- E. 膀胱直肠陷凹

42. 卵巢动脉通过的韧带是

- A. 主韧带
- B. 阔韧带
- C. 圆韧带
- D. 卵巢悬韧带
- E. 卵巢固有韧带

43. 下列组织中不随着卵巢的周期性变化的是

- A. 阴道粘膜
- B. 子宫内膜的前 2/3 层
- C. 输卵管粘膜
- D. 卵巢立方上皮组织
- E. 宫颈粘膜

44. 女，30 岁。停经 60 天，腹痛伴有大量阴道流血 2 天，心率 109 次/分；妇科检查：宫口容纳一指尖，有组织物堵塞宫颈口；子宫如妊娠 8 周大小。该患者的处理不包括

- A. 查血  $\beta$ -hCG
- B. 肌注黄体酮
- C. 查血常规
- D. 给予输液及止血药物
- E. 及时行吸宫术

45. 以下哪项是诊断早期妊娠最可靠的依据

- A. 晨起呕吐，厌食油腻，恶心
- B. 妇科检查子宫变软
- C. 尿频
- D. 妇科双合诊检查子宫增大变软，与停经月份相符
- E. 乳房出现蒙氏结节

46. 女，29 岁，平素月经规律，现停经 55 天，右下腹胀痛难忍 2 天，肛门坠胀 1 天，BP90/60mmHg。下列哪项与诊断无关的体征

- A. 宫颈光滑
- B. 后穹隆饱满
- C. 宫颈举痛，摇摆痛
- D. 子宫增大变软
- E. 宫颈软并着色

47. 关于枕先露的分娩机制，正确的是



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



- A. 胎头进入骨盆入口时以枕颞径衔接
- B. 宫缩和腹压促使胎头内旋转
- C. 胎头降至骨盆底时开始俯屈
- D. 分娩过程中，胎头呈进行性下降
- E. 当胎头在中骨盆是开始内旋转

48. 下列哪项不是胎心率变异减速的特征

- A. 胎心率下降快
- B. 发生于宫缩没有固定关系
- C. 持续时间长短不一
- D. 胎心率恢复迅速
- E. 胎心率恢复缓慢

49. 初产妇，30岁。妊娠38周，剧烈头痛并呕吐5次。查体BP175/115mmHg，尿蛋白(++)，双下肢中度水肿。无宫缩，枕左前位，胎心率140次/分，估计胎儿体重3000g。该患者应立即采取的措施是

- A. 立即行剖宫产术
- B. 滴注缩宫素
- C. 肌注派替啶
- D. 人工破膜
- E. 静滴硫酸镁及快速静滴甘露醇

50. 有关子宫内膜癌的治疗，错误的是

- A. I期有浅肌层浸润，术后常规应辅助放疗
- B. 高分化、无肌层浸润、要求保留生育功能的患者可用大剂量孕激素保守治疗
- C. 首选手术治疗
- D. II期应行广泛子宫切除加盆腔淋巴结切除术及腹主动脉旁淋巴结取样
- E. 晚期或复发癌可考虑化学治疗

51. 关于葡萄胎的叙述正确的是

- A. 出现卵巢黄素化囊肿意味着恶变
- B. 葡萄胎水泡来源于蜕膜细胞
- C. 完全性葡萄胎染色体核型常为46XX，均来源于精子
- D. 部分性葡萄胎染色体核型常为46XY，系由空卵受精
- E. 欧美国家发病率最高

52. 女，38岁，G2P0。3个月来月经欠规律，淋漓不止，1天前突然意识丧失，跌倒，失语，几秒钟后恢复。10年前曾流产刮宫。检查子宫稍大、软，附件区(-)。为迅速确诊应行

- A. 脑脊液检查
- B. 脑血管造影
- C. 血HCG测定
- D. 宫腔镜
- E. 分段诊刮

53. 女，30岁，诊断为葡萄胎。查体：子宫如16周妊娠大小。肺部CT无异常。最佳治疗方法是



- A. 清宫术
- B. 子宫全切术
- C. 先清宫后手术切除子宫
- D. 清宫后常规化疗
- E. 化疗

54. 葡萄胎排空后随访时最重要的检查项目是

- A. B超
- B. 阴道脱落细胞涂片
- C. 盆腔内诊
- D. X线胸片
- E. 血HCG

55. 诊断侵蚀性葡萄胎的可靠依据是

- A. 葡萄胎清宫后6周HCG仍阴性
- B. 葡萄胎清宫后1年出现阴道转移症状
- C. 葡萄胎清宫后5个月肺部出现转移灶
- D. 葡萄胎清宫后6个月仍未出现典型双相体温
- E. 葡萄胎清宫后1年出现脑部转移症状

56. 月经量多或经期延长，但周期基本正常，应首先考虑

- A. 子宫内膜癌
- B. 子宫颈癌
- C. 宫颈息肉
- D. 子宫肌瘤
- E. 有排卵性功能失调性子宫出血

57. 功血患者用性激素止血，下列哪项不正确

- A. 子宫内膜不规则脱落可用雌激素
- B. 内膜增生过长可用孕激素
- C. 更年期止血可用雄激素
- D. 青春期无排卵性功血可用雌激素
- E. 无排卵性功血有生育要求者可用克罗米芬促排卵

58. 女，28岁。婚后不孕伴痛经2年，月经不规则，每次需服止痛药。检查：子宫后位，稍活动，双侧卵巢约7cm×6cm×5cm大小，右侧骶韧带处有触痛硬结。病史中最重要的是

- A. 丈夫精液检查情况
- B. 月经初潮
- C. 服用何种止痛药
- D. 避孕方法
- E. 痛经情况

59. 经产妇，36岁，近半年经期8~10天，周期正常，经量多。妇科检查子宫前位，稍大，无压痛，双侧附件正常。基础体温双相。恰当处理应是



- A. 口服克罗米芬
- B. 人工周期疗法
- C. 肌注 HMG
- D. 经前 10~14 天肌注黄体酮
- E. 月经干净后肌注黄体酮

60. 足月自然分娩时胎儿肺液经产道挤压后，由口鼻排出约

- A. 1/4
- B. 2/3
- C. 1/5
- D. 3/4
- E. 1/3

61. 女婴出生时体重 2kg，生后第 2 天，为了维持其体温正常所需的代谢率和耗氧量最低时的环境温度应为

- A. 33° C
- B. 34° C
- C. 35° C
- D. 36° C
- E. 37° C

62. 阴道正常微生物群不包括

- A. 乳杆菌
- B. 沙眼衣原体
- C. 非溶血性链球菌
- D. 支原体
- E. 假丝酵母菌

63. 对老年性阴道炎患者，最恰当的处理措施是

- A. 口服乙烯雌酚
- B. 碱性溶液冲洗阴道后置入乙烯雌酚
- C. 酸性溶液冲洗阴道后置入乙烯雌酚
- D. 碱性溶液冲洗阴道后置入甲硝唑
- E. 酸性溶液冲洗阴道后置入甲硝唑

64. 以下不属于子宫颈癌发病高危因素的

- A. 初次性生活<16 岁
- B. 多产密产
- C. 大量饮酒
- D. 配偶患前列腺癌
- E. 尖锐湿疣病史

65. 行子宫颈活组织检查，不能提高确诊率的方法是

- A. 分段诊刮



金青木医学  
JINQINGJIE.COM



- B. Schiller 试验阴性区域取材
- C. 醋酸白试验白色区域取材
- D. 转化区多点取材
- E. 阴道镜下取材

66. 女, 33 岁。G2P1, 白带增多伴有血丝 4 个月。宫颈活检病理学诊断为 CINIII。下一步处理应采取

- A. 宫颈激光治疗
- B. 子宫切除术
- C. 宫颈锥形切除术
- D. 根治性子宫切除术
- E. 根治性宫颈切除术

67. 50 岁女性患者。妇科体检时细胞学检查为 HSIL。宫颈上皮病理学检查示下 1/3 层细胞核增大, 核质比例略增大, 核染色稍加深, 核分裂象少, 细胞极性正常。阴道镜检查不满意。应行治疗是

- A. 观察随访
- B. 物理治疗
- C. 子宫颈锥切术
- D. 全子宫切除术
- E. 全子宫、双附件切除术

68. 初产妇, 26 岁。宫口开全 1 小时 40 分, 先露+1, 枕右后位, 宫缩由强转弱 50 分钟, 宫缩间隔由 2 分钟延长为 6~8 分钟。本例最可能的原因是

- A. 骨盆出口狭窄
- B. 中骨盆狭窄
- C. 产妇乏力、肠胀气
- D. 骨盆入口狭窄
- E. 原发性子宫收缩乏力

69. 妇女, 43 岁。白带增多, 均匀稀薄, 有臭味, 阴道黏膜无明显充血, 阴道 pH 值 5。最可能的诊断是

- A. 急性淋病
- B. 细菌性阴道病
- C. 滴虫性阴道炎
- D. 念珠菌性阴道炎
- E. 老年性阴道炎

70. 属于盆腔炎性疾病诊断特异性标准的是

- A. 宫颈举痛或子宫压痛或附件区的压痛
- B. 实验室证实的宫颈淋病奈瑟菌或衣原体阳性
- C. 阴道分泌物生理盐水涂片见大量分泌物
- D. 宫颈或阴道异常粘液脓性分泌物
- E. 经阴道超声或磁共振检查显示输卵管增粗, 输卵管积液

71. 以下疾病无需性伴侣共同治疗的是

- A. 滴虫阴道炎



- B. 淋病
- C. 沙眼衣原体感染致急性子宫颈炎
- D. 外阴阴道假丝酵母菌病
- E. 梅毒

72. 女, 30 岁, 人工流产后 5 天, 高热伴右下腹痛 2 天。妇检: 白带脓性, 宫颈举痛, 宫体如孕 6 周, 右附件区有明显压痛。本例最可能的诊断是

- A. 急性阑尾炎
- B. 宫外孕
- C. 急性盆腔炎
- D. 卵巢巧克力囊肿破裂
- E. 以上都不是

73. 女, 28 岁。婚后 2 年未孕, 平素月经不规律。妇科检查: 子宫正常大, 双附件正常。以下哪种检查不能评价卵巢功能

- A. 基础体温测定
- B. 基础激素水平测定
- C. B 超
- D. 黄体期子宫内膜活检
- E. Schiller 试验

74. 女, 49 岁。放置宫内节育器 10 年, 近 6 个月出现不规则阴道流血。妇科检查: 宫颈光滑, 宫体正常大, 表面光滑, 附件区未触及包块。宫颈细胞学检查无异常, 对症治疗无明显改善。首选的处理措施是

- A. 止血药治疗
- B. 抗生素治疗
- C. 取出宫内节育器。
- D. 人工周期治疗
- E. 取出宫内节育器+分段诊刮

75. 妊娠 60 天时终止妊娠, 最常用的方法是

- A. 药物流产
- B. 负压吸引术
- C. 静脉滴注催产素
- D. 钳刮术
- E. 利凡诺羊膜腔内注射

76. 女, 30 岁。妊娠 38 周。G2P1 规律宫缩 6 小时, 宫口开大 4cm。胎膜完整, S+2。胎心率 135 次/分。此时正确处置是

- A. 人工破膜
- B. 立刻送产房待产
- C. 温肥皂水灌肠加速产程
- D. 嘱产妇屏气使用腹压
- E. 开始保护会阴



77. 关于产褥期血液系统的变化，正确的是

- A. 产褥早期血液处于低凝状态
- B. 红细胞沉降率于产后 1 周降至正常
- C. 血红蛋白水平于产后 1 周左右回升
- D. 循环血量于产后 72 小时内迅速通过褥汗等途径下降
- E. 淋巴细胞增多

78. 女，29 岁，停经 11 周，早孕反应消失。阴道少许流血 2 天，妇科检查：宫口闭，子宫为非孕时 2 倍大小，质软，双侧附件区未触及异常，该患者最可能的诊断是

- A. 先兆流产
- B. 难免流产
- C. 不全流产
- D. 完全流产
- E. 稽留流产

79. 以下异位妊娠各类型中后果最严重的是

- A. 输卵管壶腹部妊娠流产
- B. 输卵管峡部妊娠破裂
- C. 输卵管间质部妊娠破裂
- D. 陈旧性宫外孕
- E. 继发性腹腔妊娠

80. 男，24 岁，既往有 Graves 病史。患者今日受凉后突发双下肢迟缓性瘫痪，最可能原因是

- A. 血氯过低
- B. 血糖过低
- C. 血钠过低
- D. 血钾过低
- E. 血钙过低

81. 患者女性，65 岁，现出现左上睑下垂，左眼内收及上下视受限，左瞳孔散大，直接，间接对光反射均消失，考虑病变部位是

- A. 视神经
- B. 展神经
- C. 动眼神经
- D. 三叉神经
- E. 滑车神经

82. 真性球麻痹与假性球麻痹最有意义的区别是

- A. 有无声音嘶哑
- B. 有无吞咽困难
- C. 有无饮水呛咳
- D. 有无咽反射亢进
- E. 有无呼吸困难





83. 患者，71 岁，晨起出现肢体偏瘫，头颅 MRI 提示左侧内囊后肢受损，还可能出现的症状是

- A. 嗅觉丧失
- B. 左侧肢体运动障碍和左侧半身感觉丧失
- C. 双眼右侧半视野偏盲
- D. 右侧半身痛温觉丧失而触觉存在
- E. 左耳听觉丧失

84. 女，32 岁，跌落外伤后，行腰椎 MRI 检查提示腰 1 节段左侧半横断，损伤平面以下会出现

- A. 左侧痛温觉丧失
- B. 左侧粗略触觉丧失
- C. 左侧本体感觉丧失
- D. 右侧本体感觉丧失
- E. 右侧肢体随意运动丧失

85. 脑神经中支配咀嚼肌的是

- A. 舌咽神经
- B. 舌下神经
- C. 迷走神经
- D. 三叉神经
- E. 面神经

86. 区别吉兰巴雷综合征与急性横贯性脊髓炎最有意义的是

- A. 有无前驱感染史
- B. 有无感觉障碍
- C. 有无尿便障碍
- D. 有无运动障碍
- E. 有无脑脊液蛋白含量升高

87. 脊髓外病变导致脊髓压迫症的特点是

- A. 起病较快，病程较短
- B. 多有肌萎缩表现
- C. 易出现括约肌功能障碍
- D. 感觉和运动障碍多自远端开始向心发展
- E. MRI 示脊髓梭形膨大

88. 女，35 岁。车祸后头部落地。查体：左侧鼻唇沟变浅，鼻出血，左耳听力下降，左外耳道流出淡血性液体。首先应考虑诊断

- A. 脑震荡
- B. 颅前窝骨折
- C. 颅中窝骨折
- D. 颅后窝骨折
- E. 颅盖凹陷骨折

89. 男，55 岁。起床走路时头晕，走路不稳，饮水呛咳。声音嘶哑。查体：右侧 Horner 征，右面部痛觉



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM



减退，右侧咽反射消失，悬雍垂左偏，右侧指鼻试验和跟-膝胫试验差，左侧肢体痛觉减退。病灶定位应在

- A. 脑桥基底部穿支动脉
- B. 右小脑后下动脉
- C. 右大脑后动脉
- D. 右颈内动脉主干
- E. 双侧椎动脉

90. 女，23岁。近半年来患者出门时常用耳塞堵住耳朵。问其何故，患者称：“走在街上，只要听到汽车喇叭响，就同时听到还有一个女的骂我是流氓，这个声音是从汽车喇叭里传出来的。”患者的表现属于

- A. 真性幻觉
- B. 假性幻觉
- C. 心因性幻觉
- D. 反射性幻觉
- E. 功能性幻觉

91. 男，27岁。入院后，患者见人就打招呼，并自我介绍说：“我叫马林，马是美国总统奥巴马的马，林是民族英雄林则徐的林，他们的优良特性在我身上也得到了充分体现，勇敢、……医生问其家庭住址，患者答：“西南山区。”随即唱到：“我家住在黄土高坡，大风从坡上刮过……看到一位女医生过来，患者立即上前赞美道：“我一看就知道你有福，长睫毛，高鼻梁，身材好，皮肤……患者的表现应判断为

- A. 思维散漫
- B. 病理性赘述
- C. 思维奔逸
- D. 象征性思维
- E. 逻辑倒错性思维

92. 以下哪项不属于妄想的特征？

- A. 与事实不相符，但仍坚信不疑
- B. 有浓厚个人特色，但无时代色彩
- C. 与患者本人有利害关系
- D. 与患者文化背景和经历有关
- E. 有个体独立性，非集体信念

93. 女，35岁。患者称：“我的大脑被外星人用电磁波控制了，他们让我想什么我就得想什么，让我笑我就得笑，让我哭我就得哭，我就像一个机器人一样，一点自由也没有。”这种表现是

- A. 内心被揭露感
- B. 夸大妄想
- C. 被害妄想
- D. 物理影响妄想
- E. 强制性思维

94. 男，19岁，自述3个月来脑海里总是在回荡“你去死吧”的声音，有时候很清晰，有时候不清晰。



该患者最可能的症状是

- A. 记忆障碍
- B. 错觉
- C. 真性幻觉
- D. 感知障碍
- E. 假性幻觉

95. 某精神分裂症患者在描述自己被人跟踪、投毒等妄想性体验时表现出愉快的表情，听到亲人去世时放声高歌。这种表现属于

- A. 情感高涨
- B. 欣快
- C. 情感淡漠
- D. 情感不稳
- E. 情感倒错

96. 阿尔茨海默病患者最常见的妄想是

- A. 嫉妒妄想
- B. 自罪妄想
- C. 疑病妄想
- D. 非血统妄想
- E. 被窃妄想

97. 下述关于谵妄患者的说法，正确的是

- A. 晨重夜轻
- B. 主要是意识范围障碍
- C. 常有恐怖性视幻觉但内容常模糊不清
- D. 突然变得安静，说明病情可能加剧
- E. 不会产生被害妄想

98. 女，15岁。近1年来不去上学，不主动洗澡、换衣服，对家人、同学、朋友态度冷淡、孤僻离群，对与自己有关的各种事情无动于衷。最可能的诊断是

- A. 创伤后应激障碍
- B. 精神分裂症
- C. 抑郁症
- D. 焦虑症
- E. 人格障碍

99. 精神分裂症的临床症状一般没有

- A. 明显的行为障碍
- B. 明显的思维障碍
- C. 明显的情感障碍
- D. 明显的智能障碍
- E. 明显的自知力障碍




精英医学  
JINGYINGJIE.COM



100. 以下属于非经典抗精神病药物的是

- A. 氯氮平
- B. 氟哌啶醇
- C. 舒必利
- D. 氯丙嗪
- E. 奋乃静



金英杰医学  
JINYINGJIE.COM

更多免费资料领取在等你

