

临床助理医师资格考试

模考密卷

第一单元

【A1 型题】答题说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1.三酰甘油合成的基本原料是

- A.甘油
- B.胆固醇酯
- C.胆碱
- D.鞘氨醇
- E.胆固醇

2.下列不参与肝生物转化第二相反应的酶是

- A.硫酸基转移酶
- B.谷胱甘肽 S-转移酶
- C.肽基转移酶
- D.葡萄糖醛酸基转移酶
- E.甲基转移酶

3.有关 DNA 碱基组成规律的叙述，错误的是

- A.适用于不同种属
- B.嘌呤与嘧啶分子相等
- C.与遗传特性有关
- D.主要由腺嘌呤组成
- E.不受年龄与营养状态影响

4.多肽链中肽键的本质是

- A.磷酸二酯键
- B.二硫键
- C.糖苷键
- D.酰胺键
- E.疏水键

5.关于 DNA 变性概念的叙述，错误的是

- A.变性后 260nm 波长吸收不改变
- B.变性时两条链解离
- C.变性时二级结构被破坏
- D.变性不伴有共价键断裂
- E.加热可导致变性

6.磷酸戊糖途径的主要产物之一是

- A.NADPH
- B.FMN
- C.CoQ
- D.cAMP
- E.ATP

7.有关同工酶概念的叙述，错误的是

- A.同工酶常由几个亚基组成
- B.不同器官的同工酶谱不同
- C.同工酶的理化性质不同
- D.同工酶催化不同的底物反应
- E.同工酶的免疫学性质不同

8. α -酮酸可转变生成的物质是

- A. CO_2 和 H_2O
- B. 营养必需脂肪酸
- C. 维生素 A
- D. 营养必需氨基酸
- E. 维生素 E

9.琥珀酸氧化呼吸链不含有的组分是

- A. FMN
- B. CoQ
- C. Cyt c
- D. Cyt b
- E. Cytaa₃

10.主要调节甲状旁腺激素分泌的因素是

- A. 血镁
- B. 血钙
- C. 血磷
- D. 血 $1,25\text{-(OH)}_2\text{-维生素 D}_3$
- E. 降钙素

11.下列属于正氮平衡的情况是

- A. 创伤
- B. 饥饿
- C. 妊娠
- D. 出血
- E. 贫血

12.帕金森患者可出现的症状是

- A. 静止性震颤
- B. 意向性震颤
- C. 运动共济失调
- D. 骨骼肌张力降低
- E. 皮肤感觉迟钝

13.在继发性主动转运过程中，驱动小管液葡萄糖进入肾小管上皮细胞的直接动力是

- A. 膜内外两侧的电位差
- B. 钠泵活动造成的膜两侧 Na^+ 浓度差
- C. 钠泵水解 ATP 释放的能量
- D. 由同向转入细胞的物质提供能量
- E. 由同向转运体水解 ATP 释放的能量

14.肺换气的驱动力是

- A. 呼吸膜两侧气体分压梯度

- B.呼吸膜气体交换面积
 - C.呼吸膜通透性
 - D.气体分子与血红蛋白亲和力
 - E.气体分子溶解度
- 15.在突触传递过程中，触发神经末梢释放的关键因素是
- A.末梢内囊泡数量增加
 - B.Ca²⁺进入末梢内
 - C.末梢膜发生超极化
 - D.末梢膜上 K⁺通道激活
 - E.末梢内线粒体数量增加
- 16.血浆蛋白浓度降低所致水肿的原因是
- A.血浆胶体渗透压降低
 - B.动脉血压升高
 - C.毛细血管壁通透性增加
 - D.淋巴回流量减少
 - E.组织液静水压升高
- 17.与 CO₂ 呼出量关系最密切的肺功能指标是
- A.肺通气量
 - B.肺活量
 - C.肺泡通气量
 - D.最大通气量
 - E.用力呼气量
- 18.用酒精给高热病人擦浴的散热方式是
- A.蒸发散热
 - B.辐射散热
 - C.不感蒸发散热
 - D.传导散热
 - E.对流散热
- 19.因毛细血管通透性增加而致胸腔积液的疾病是
- A.肾病综合征
 - B.肝硬化
 - C.类风湿关节炎
 - D.左心衰竭
 - E.缩窄性心包炎
- 20.肠道病毒一般不引起的疾病是
- A.尿道炎
 - B.手足口病
 - C.脊髓灰质炎
 - D.无菌性脑膜炎
 - E.心肌炎
- 21.结核分枝杆菌对下列哪项理化因素敏感
- A.碱
 - B.酸
 - C.紫外线

D.干燥

E.寒冷

22.可以引起菌血症的细菌是

A.肉毒梭菌

B.霍乱弧菌

C.白喉棒状杆菌

D.破伤风梭菌

E.伤寒沙门菌

23. II 型超敏反应导致的疾病是

A.青霉素过敏休克

B.新生儿溶血病

C.接触性皮炎

D.食物过敏性腹泻

E.花粉过敏性哮喘

24.主要由自身反应性 T 细胞介导的自身免疫性疾病是

A.链球菌感染后肾小球肾炎

B.系统性红斑狼疮

C.肝出血-肾炎综合征

D.血小板减少性紫癜

E.多发性硬化

25.不参与 ADCC 作用的免疫分子是

A.补体

B.Fc 受体

C.免疫球蛋白

D.颗粒酶

E.穿孔素

26.诊断羊水栓塞的主要病理依据是.

A.肺泡腔内透明膜形成

B.肺泡腔内有胎粪小体

C.肺泡腔内广泛出血

D.肺血管内有角化上皮

E.微循环内透明血栓

27.免疫标记降钙素阳性的甲状腺肿瘤是

A.梭形细胞癌

B.滤泡腺癌

C.髓样癌

D.巨细胞癌

E.乳头状癌

28.符合良性高血压血管病变的是

A.小动脉外膜纤维增生

B.小动脉玻璃样变性

C.细动脉胶原纤维增生.

D.小动脉平滑肌增生

E.细动脉玻璃样变性

29.关于慢性肾盂肾炎大体描述正确的是

- A.肾弥漫性颗粒状
- B.肾肿大、苍白
- C.肾表面散在出血点
- D.肾不对称性缩小
- E.肾弥漫性肿大

30.不会出现肉芽肿性病变的疾病是

- A.结节病
- B.细菌性痢疾
- C.结核病
- D.血吸虫病
- E.伤寒

31.符合早期胃癌诊断条件的是

- A.肿瘤仅限于胃窦
- B.癌未累及肌层
- C.肿瘤直径小于 0.5cm
- D.黏膜皱襞消失
- E.肿瘤直径小于 1cm

32.地塞米松的临床应用不包括

- A.风湿性心肌炎
- B.感染中毒性休克
- C.过敏性紫癜
- D.骨质疏松
- E.系统性红斑狼疮

33.吗啡和哌替啶的共同作用不包括

- A.体位性低血压
- B.止泻
- C.抑制呼吸
- D.镇痛
- E.成瘾性

34.某心理治疗师婉拒了一位正在接受治疗患者请其吃饭的邀请。这一行为所遵循的心理治疗原则是

- A.保密原则
- B.关系限定原则
- C.真诚原则
- D.客观中立原则
- E.回避原则

35.属于影响行为的倾向因素是

- A.态度
- B.资源
- C.政策
- D.法律
- E.责任

36.某人做事总是风风火火，速度很快，脾气暴躁，缺乏耐性，而且时不时会出些错误。其

气质类型属于

- A.胆汁质
- B.多血质
- C.黏液质
- D.多动质
- E.抑郁质

37.《医疗机构从业人员行为规范》提出的医疗机构从业人员执业的价值目标是

- A.为人民健康服务
- B.发扬人道主义精神
- C.树立大医精诚理念
- D.以患者为中心
- E.救死扶伤、防病治病

38.属于医务人员自我道德评价方式的是

- A.习惯
- B.内心信念
- C.传统习俗
- D.名誉
- E.社会舆论

39.医生在诊疗过程中经常对患者使用医学专业术语，使患者难以理解，容易造成误解。这种医患交流的问题属于

- A.回忆不良
- B.沟通障碍
- C.信息缺乏
- D.同情不够
- E.依从性差

40.医患关系的实质是

- A.具有经济性质的商业关系
- B.具有契约性质的信托关系
- C.具有法律性质的契约关系
- D.具有市场性质的交换关系
- E.具有宗教性质的文化关系

41.适用于“主动-被动型”医患关系模式的患者群体中一般不包括

- A.昏迷患者
- B.婴幼儿患者
- C.焦虑症患者
- D.痴呆患者
- E.精神分裂症缺乏自知力患者

42.对疑似甲类传染病患者给以隔离所体现的公共卫生伦理原则是

- A.互相协同原则
- B.社会公正原则
- C.社会公益原则
- D.信息公开原则
- E.全社会参与原则

43.医疗机构使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作应给予罚款处罚，其最高金额是

A.5 千元

B.8 千元

C.2 千元

D.1 万元

E.3 千元

44.有助于患者记忆的信息沟通方式不包括

A.规范使用医学缩略术语

B.指导问题力求具体

C.重要医嘱首先提出

D.语言表达通俗易懂

E.归纳总结医嘱内容

45.相对于一般契约关系而言，医生在医患关系负有更重的义务，但这些义务中不包括

A.监督义务

B.保密义务

C.披露义务

D.注意

E.忠实义务

46.抗菌药物的细菌耐药率超过一定百分比时，应当慎重经验用药。该百分比是

A.50%

B.20%

C.10%

D.40%

E.30%

47.目前我国提倡的活体供体器官方式是

A.自由买卖

B.推定民意

C.自愿捐献

D.家属决定

E.政府决定

48.依据《精神卫生法》，给予吊销精神科医师执业证书处罚的情形是

A.未及时对有伤害自身危险的患者进行检查评估的

B.精神障碍患者对再次诊断结论有异议的

C.故意将非精神障碍患者诊断为精神障碍患者的

D.对实施住院治疗的患者未根据评估结果作出处理的

E.拒绝对送诊的疑似精神障碍患者作出诊断的

49.有权对收受药物经营企业财务的医务人员做出没收违法所得的处罚单位是

A.卫生计生行政部门

B.公安机关

C.食品药品监督管理部门

D.医师协会

E.工商行政管理部门

50.医疗机构临床用血管理的第一责任人是

A.临床用血的医师

B.血站

- C.临床用血所在科室的负责人
- D.临床用血医师的上级医师
- E.医疗机构法定代表人

51.医务人员必须经过省级卫生计生行政部门考核并取得相应合格证书方可从事的母婴保健服务项目是

- A.结扎手术
- B.家庭接生
- C.产前诊断
- D.婚前医学检查
- E.终止妊娠手术

52.依据《侵权责任法》，医务人员实施手术前应当向患者说明的事项是

- A.医疗纠纷处理方式
- B.隐私保密要求
- C.替代医疗方案.
- D.承担赔偿责任的情形
- E.复印病例资料范围

53.负责向全社会发布突发公共卫生事件信息的法定单位是

- A.县级人民政府
- B.省级人民政府
- C.国务院卫生计生行政部门
- D.国务院新闻办公室
- E..设区的市级人民政府.

54.环境污染物危险度评价中的暴露评价可以统计出

- A.某化学物在环境介质中的浓度
- B.某化学物对机体产生危害程度
- C.某化学物是否对机体产生危害
- D.危险物特征
- E.人群对某化学物暴露的强度

55.我国卫生事业的性质是

- A.政府实行福利政策的事业
- B.政府通过购买形式为人民提供服务的事
- C.政府许可的盈利性事业
- D.政府实行一定福利政策的社会公益事业
- E.政府实行的社会公益事业

56.关于流行病学，下列说法正确的是

- A.从个体的角度研究疾病和健康状况及其影响因素
- B.侧重研究传染病的流行特征和防制措施
- C.研究人群中疾病和健康状况的分布及其影响
- D.研究疾病在时间、空间和人间的存在方式及其发生、发展规律
- E.侧重研究慢性病的流行特征和防制措施

57.临床预防服务的主要内容不包括

- A.化学预防.
- B.筛查
- C.健康咨询

D.免疫接种

E.药物治疗

58.计算患病率的分子是

A.观察期间某病的暴露人口数

B.观察期间某病的新旧病例数

C.观察期间某病的新发病例数

D.观察开始之前某病的患病人数

E.观察期间所有人口数

59.反映均数抽样误差大小的指标是

A.变异系数

B.标准误

C.均数

D.标准差

E.全距

60.某地区成年人的首位死因是心脏病，下列各项措施中不属于该地区优先防治策略的是

A.通过媒体倡导居民增加身体活动

B.在社区人群中开减少心脏病危险因素咨询

C.加强公共场所与工作场所的控烟

D.大力发展心脏专科医院，为病人提供心脏介入治疗

E.以高胆固醇血症和家族史为指标

61.呈对数正态分布的数值变量资料，用来描述集中趋势的指标最好选用

A.几何均数

B.众数

C.算术均数

D.调和均数

E.中位数

62.医疗保险制度的资金来源主要是

A.个人、保险公司、政府

B.个人、集体、国家

C.职工、雇主、保险公司

D.职工、雇主、保险公司

E.个人、单位、保险公司

63.下列食物未煮熟时易导致食物中毒的是

A.赤豆

B.豌豆

C.荷兰豆

D.绿豆

E.四季豆

64.健康促进的核心策略包括

A.保护环境

B.职业卫生

C.倡导、增权、协调

D.疾病控制

E.学校卫生

65.免疫缺陷患者不可接种的疫苗是

- A.灭活脊髓灰质炎疫苗
- B.流行性出血热疫苗
- C.麻疹活疫苗
- D.多糖疫苗
- E.重组乙型肝炎疫苗

66.流行病学研究的观察法与实验法的根本区别在于

- A.盲法
- B.是否有人为干预
- C.统计学检验
- D.设立对照组
- E.不设立对照组

67.“无论是致病、治疗，还是预防和康复都应把人视为一个整体，需要考虑各方面因素的交互作用，而不能机械地将他们分割开”。此观点所反映的医学模式是

- A.自然哲学的医学模式
- B.生物-心理-社会医学模式
- C.神灵主义的医学模式
- D.机械论医学模式
- E.生物医学模式

68.选定暴露和未暴露于某种因素的两种人群，追踪其各自的发病结局，比较两者发病结局的差异，从而判断暴露因素与发病有无因果关联及关联程度，该研究为

- A.病例对照研究
- B.现场干预试验
- C.队列研究
- D.临床试验研究
- E.现况

69.关于经济因素对健康的影响，不正确的说法是

- A.经济因素对健康的影响是多方面的
- B.单纯注重经济增长将危害人类的健康
- C.人群收入的绝对水平决定着经济对健康的影响程度
- D.经济的发展应与社会发展及促进人类健康水平同步
- E.人群的健康水平影响经济的发展

70.提高人群肺癌筛查检出率的首选方法是

- A.血清肿瘤标志物
- B.高分辨 CT
- C.PET-CT
- D.低剂量 CT
- E.痰细胞学检查

71.属于支气管扩张手术治疗禁忌证的是

- A.合并反复感染
- B.双下肺均存在局限性支气管扩张病变
- C.窦性心动过慢，阿托品试验（+）
- D.合并肺源性心脏病
- E.合并大咯血

72.造成气流受限的病因中，最常出现肺脏弹性回缩力减弱的是

- A.弥漫性泛细支气管炎
- B.支气管扩张
- C.慢性支气管炎
- D.慢性纤维空洞型肺结核
- E.阻塞性肺气肿

【A2 型题】答题说明：每一道试题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

73.男，72 岁。乏力、走路不稳 3 个月。查体：肌张力减低，共济失调，意向性震颤，指鼻试验阳性。该患者最可能的病变部位是

- A.小脑
- B.皮层运动区
- C.脑干
- D.基底神经节
- E.脊髓

74.男，45 岁。右利手。因头痛和言语障碍 6 月余就诊。头颅 MRI 显示左侧中央前回底部前方有占位性病变，脑膜瘤可能性大。该患者的言语障碍最可能是

- A.失写
- B.失读
- C.感觉性失语
- D.传导性失语
- E.运动性失语

75.男，18 岁。因终末肾脏病行肾脏移植手术，其母亲为其供肾者，这种移植类型是

- A.同基因移植
- B.同种异体移植
- C.异种移植
- D.同系移植
- E.自体移植

76.男，48 岁。右季肋区疼痛 3 月。既往有乙型病毒性肝炎病史 10 年。B 超检查见肝右叶巨大肿块。血 AFP 增高。符合该肿瘤病理学特点的是

- A.肿瘤组织间质较多
- B.癌细胞呈腺管状排列
- C.癌细胞分泌黏液且血管少
- D.癌细胞与肝细胞类似
- E.发生于肝内胆管上皮最多见

77.小李，男，25 岁。硕士研究生毕业后参加工作。半年来对上级领导布置的任务总感觉不能胜任，屡屡出错，受到多次批评后内心受挫，选择了辞职。小李的这种选择在应激反应属于

- A.认知反应
- B.生理反应
- C.情绪反应
- D.行为反应
- E.防御反应

78.女，45 岁。大学教授。因车祸导致颅脑损伤，智力测验显示其智商为 85 分。同时有一位

农民测得智商也是 85 分。心理治疗师认为前者的智力出现了问题，而后者正常。这一判断所遵循的原则是

- A.客观性原则
- B.中立性原则
- C.操作性原则
- D.保密性原则
- E.标准化原则

79.一位服用了 60 多片安定的精神病患者被送到医院急救，患者父母表示无力承担抢救费用。按照急救伦理的要求，医生应该选择的处理措施是

- A.在家属和院内上级领导的同意下，赶快救治
- B.在征得患者父母同意的情况下，放弃治疗
- C.放弃治疗，让患者父母将其接回家
- D.向民政部门反映，争取社会支持，并由他们决定是否抢救
- E.仅给予患者家庭能够承受费用的支持疗法

80.主治医师邱某经过抗菌药物临床应用知识和规范化管理培训并考核合格后，被授予限制使用级抗菌药物处方权。但不久，邱某因违反《抗菌药物临床应用管理办法》的相关规定，受到医院警告并限制其上述处方权。医院处理邱某的依据是

- A.多次使用非限制使用级抗菌药物
- B.使用价格相对较高的抗菌药物
- C.在紧急情况下越级使用抗菌药物
- D.无正当理由开具抗菌药物超常处方 3 次以上
- E.在门诊使用限制使用级抗菌药物

81.某人因病住院 20 天，治疗费用共 53000 元，结算费用时被告知其中 50000 元以下的部分由医保支付，另外 3000 元需个人支付，该案例中的 50000 是

- A.起付线
- B.封顶线
- C.自付线
- D.共同付费
- E.封底线

82.某医师从医院辞职到一家药品生产企业从事营销工作，后因事业不顾，想重回医院工作，但因其中止执业活动已满法定期限被卫生行政部位注销注册。该法定期限是

- A.2 年
- B.3 年
- C.4 年
- D.1 年
- E.6 个月

83.某中年男性因突发急症在大街上摔倒并昏迷，由路人送至附近医院，被确诊为脑出血，急需手术，但医务人员无法联系到其亲属。在此情况下，可以决定为其急诊手术的人员是

- A.医院所在地民政部门负责人
- B.医院所在地派出所负责人
- C.为其接医师的上级医师
- D.院长或其授权人
- E.目击者

84.若用统计图直观地表示某城市在 8 年中肝炎的发病率随时间的变化情况，宜选择

- A.圆图
- B.直条图
- C.普通线图
- D.直方图
- E.散点图

85.某糖尿病患者为了控制血糖，在医生的建议下准备和营养师一起定制一份饮食计划。她虽然知道饮食控制的好处，但总认为无法管住自己，计划难以实施。对于这样患者的干预重点是

- A.要提高其自身效能
- B.培养行为能力
- C.提高结果预期
- D.提供社会支持
- E.建立支持性环境

86.已知某省山区、丘陵、湖区婴幼儿体格发育有较大的差异，现需制定该省婴幼儿体格发育有关指标的参考值范围，抽样方法最好采取

- A.分层抽样
- B.整群抽样
- C.系统抽样
- D.机械抽样
- E.单纯随机抽样

87.某煤矿职工医院欲探讨二、三期矽肺患者肺部的阴影密度级别（+、++、+++、++++）间是否不同，可选择

- A.线性回归
- B.成组设计比较的秩和检验
- C.直线相关
- D.两样本 t 检验
- E.四格表 X² 检验

88.某医师为评价某新药对流感的治疗效果，共收治了 100 例流感病人，一周后治愈的有 90 例，由此认为该新药对流感疗效显著。针对此实验，正确的观点是

- A.结论正确，因为治愈率达 90%
- B.结论不能肯定，因为未作重复试验
- C.结论不能肯定，因为未设对照组
- D.结论不能肯定，因为未作统计学处理
- E.结论不能肯定，因为实验样本含量较少

89.女，43 岁。发热、咳嗽、少量脓痰 2 周。既往健康。查体未见明显异常。血常规大致正常，ESR45mm/h。胸部 X 线片示右上肺渗出性病变伴不规则空洞，无液平。为明确诊断，宜首选的检查是

- A.痰细菌培养+药敏
- B.支气管镜肺活检
- C.痰涂片抗酸染色
- D.痰涂片革兰染色
- E.PPD 皮试

90.男，75 岁。慢性阻塞性肺疾病急性加重反复出现，抗感染治疗时，为覆盖铜绿假单胞菌，下列抗菌药物中宜首选的是

- A.莫西沙星
- B.阿米卡星
- C.头孢他啶
- D.阿奇霉素
- E.阿莫西林

91.男, 56岁。因“肺部感染、休克”入监护室治疗。血气分析提示该患者“代谢性酸中毒, I型呼吸衰竭”为保护患者组织, 此时不宜快速纠正酸中毒, 其主要原因在于酸中毒时

- A.组织氧摄取能力增加
- B.血红蛋白结合氧增加
- C.肺部获得更多的氧
- D.组织氧耗量减少
- E.导致氧离曲线右移

92.女, 79岁。咳嗽、咳痰20年, 气促10年, 加重5天, 查体: 桶状胸, 呼气相延长, 血气分 $pH7.0, PaO_2 55mmHg, PaCO_2 54mmHg$, 该患者的发病机制, 下列不包括

- A.阻塞性肺通气功能障碍
- B.弥散功能障碍
- C.无效腔增加
- D.限制性通气功能障碍
- E.通气/血流比例失衡

93.女, 37岁。因阵发性室上性心动过速行射频消融治疗, 术中患者突然出现胸闷、烦躁、呼吸困难。查体: $BP80/70Hg$, 颈静脉怒张, 两肺呼吸音清, 心界向两侧扩大。心率120次/分, 律齐。各瓣膜听诊区未闻及杂音, 奇脉(+). 导致其临床表现的机制是

- A.心排血量增加, 静脉压升高
- B.心排血量不变, 静脉压升高
- C.心排血量下降, 静脉压降低
- D.心排血量增加, 静脉压降低
- E.心排血量下降, 静脉压升高

94.男, 16岁。阵发性心悸1年余, 突发突止, 发作期间心电图正常, 10分钟前再次发作, 心电图示快速、规则的QRS波群, 形态正常, 未见明显P波。急诊医师在患者右胸锁乳突肌内缘甲状软骨水平按摩数秒钟后, 心律突然恢复正常。该治疗手法的作用机制是

- A.减弱心迷走神经紧张
- B.加强心迷走神经冲动
- C.加强心交感神经冲动
- D.原因不明
- E.兴奋颈动脉体

95.男, 55岁。反复活动时胸痛, 快步行走及上楼梯可诱发, 休息可缓解。冠状动脉造影见前降支阻塞80%。血管病变的始动环节是

- A.糖尿病
- B.高血压
- C.上皮细胞受损及功能失调
- D.内皮细胞受损及功能失调
- E.内皮下脂质沉积

96.男, 40岁。上腹部不适伴纳差1个月。既往体健。胃镜检查结果为黏膜相关性淋巴样组织淋巴瘤。与该病发生密切相关的病原体是

- A.军团菌
- B.粪肠球菌
- C.幽门螺杆菌
- D.产气肠杆菌
- E.大肠埃希菌

97.男, 70 岁。上腹痛一年, 进食后加重, 大便 10 次/天, 可见脂肪滴。查体: 上腹中部压痛(+). 腹部 B 超: 胰腺多发钙化灶。需要给予

- A.钙通道阻滞剂
- B.质子泵抑制剂
- C.抗胆碱药物
- D.胰酶制剂
- E.H₂ 受体拮抗剂

98.男, 72 岁。反酸、烧心 36 年。呼吸困难的, 乏力 2 个月。间断口服质子泵抑制剂治疗, 起初有效, 近 2 个月效果不佳。胃镜检查示: 食管下段及贲门区隆起溃疡性病变, 质脆、易出血。最有可能的活组织检查为

- A.淋巴瘤
- B.神经内分泌肿瘤
- C.胃肠间质瘤
- D.鳞癌
- E.腺癌

99.男, 33 岁。消化性溃疡反复发作并出血 3 年。再出血 1 周, 内科治疗无效, 行手术治疗。术中见胃皱襞显著增厚, 组织病理学检查发现明显的壁细胞增生。最可能导致该病变的内源性物质是

- A.转化生长因子 α
- B.促胃液素
- C.促胰液素
- D.生长抑素
- E.乙酰胆碱

100.男, 68 岁。恶心、上腹隐痛、呕吐少量咖啡样液体 2 天。高血压、血脂异常病史 2 年, 长期口服阿司匹林 100mg/d。胃镜检查可见胃窦黏膜多发糜烂, 表面附着血性黏液。最适应的治疗药物是

- A.多潘立酮
- B.奥美拉唑
- C.枸橼酸铋钾
- D.硫糖铝
- E.法莫替丁

101.女, 70 岁。冠心病、高血压、糖尿病患者。近 1 个月调整用药为阿司匹林、比索洛尔、辛伐他汀、二甲双胍。近 3 天双下肢无力及疼痛, 双侧足背动脉搏动一致。实验室检查: 血 CK2200U/L, cTnI0.01ng/ml, 血肌酐 368 μ mol/L。出现双下肢无力及疼痛的最可能原因是

- A.糖尿病病足
- B.主动脉夹层
- C.间歇性跛行
- D.横纹肌溶解,
- E.腰椎间盘突出症

102.糖尿病患者，女，65岁，家庭主妇，初中文化程度。医生给予的饮食建议，容易理解和执行的说法是

- A. “您每天摄入热量不能超过 1200 千卡。”
- B. “您必须严格控制饮食，要低盐、低脂、低糖饮食。”
- C. “每顿饭主食 2 两，少吃油腻的”。
- D. “不吃甜食。稀饭、甘蔗、西瓜、甜饮料，少吃肉、油，可吃点粗粮”
- E. “您一定要管住自己的嘴，原来爱吃的都不能吃了。”

103.某心外科医生在实施一例先天性心脏病手术之前的晚上，在自己脑海中反复想象手术的过程、路径以及手术以外的应对措施等，这种思维方式是

- A.聚合思维
- B.形象思维
- C.发散思维
- D.抽象思维.
- E.创造思维

104.男，41岁。腹泻1天。1天前进食海产品后出现腹泻。大便30余次，为米泔样便。查体：P110次/分，BP80/50mmHg，皮肤干皱，弹性稍差，眼窝凹陷。血常规：Hb162g/L,WBC13.7×10⁹/L,N0.85,PLT142×10⁹/L。该患者腹泻的发生机制是

- A.肠黏膜细胞内 cAMP 水平升高，过度分泌水及电解质
- B.胆汁分泌减少引起胃肠功能紊乱
- C.主要由于结肠、乙状结肠肠管麻痹
- D.主要由于脏器的实质性损害
- E.与致病菌引起的侵袭性病变有关

105.女，18岁。持续发热10天，于9月2日来诊，体温逐日升高，伴乏力，纳差。查体：T39.8℃，P80次/分，精神萎靡，.腹部可见6个充血性皮疹，腹部胀气，脾肋下可及。实验室检查：血 WBC3.7×10⁹/L。此患者所患疾病的主要病理特点是

- A.基本病变是小血管炎
- B.全身单核-吞噬细胞系统增生性反应
- C.小肠黏膜苍白、水肿
- D.主要病变在淋巴结和胸腺
- E.肠黏膜呈弥漫性纤维蛋白渗出性炎症

106.男，40岁。右下肢肿胀、剧痛3小时。1天前用粪便在农田施肥时，右足被扎伤，半夜感胀裂样痛，症状加重，出现下肢肿胀，皮肤由紫红变成黑紫、水肿有水疱。查体：局部皮下有捻发音，伤口处有的血性浆液渗出。最可能的致病菌是

- A.乙型溶血性链球菌
- B.大肠埃希菌
- C.表皮葡萄球菌
- D.梭状芽孢杆菌
- E.结核种菌

107.女，50岁。右乳头皮肤脱屑、结痂半年。去除痂皮可见糜烂样创面，刮片细胞学检查：可见大而异型、胞质透明的肿瘤细胞。这种细胞称为

- A.镜影细胞
- B.L&H型细胞
- C.陷窝细胞
- D.Paget细胞

E.多核瘤巨细胞

108.男,70岁。右侧肢体动作迟缓伴震颤半年。查体:右侧肢体静止性震颤,肌张力齿轮样增高。病变可能的部位是

- A.大脑皮质
- B.黑质
- C.小脑
- D.内囊
- E.脑桥

109.女,30岁。腹痛、腹泻伴里急后重3天。最初为稀便,2天后为黏液脓血便,偶见片状灰白色膜状物排出。此病变最可能的炎症类型是

- A.纤维素性炎
- B.变质性炎
- C.浆液性炎
- D.出血性炎
- E.化脓性炎

110.女,19岁。因急性白血病接受骨髓移植治疗,术后被安置于无菌病房中,根据病情,需限制亲属探视,在此期间患者常常出现心情烦躁、不安,针对此情况,心理治疗师指导其采用冥想结合深呼吸的方法来改善自己的情绪,这种应对方式属于

- A.取得社会支持
- B.消除应激来源
- C.调整认知评价
- D.心理防御机制
- E.自我调节放松

111.某电视台编辑求助于一家心理治疗中心,希望在该电视台上播放韦氏智力测验的具体内容,以引起公众对心理学的兴趣,但被心理中心的工作人员婉言拒绝,该工作人员遵循的原则是

- A.保密原则
- B.稳定性原则
- C.标准化原则
- D.回避原则
- E.客观原则

112.男,56岁。上腹胀痛不适10年,常于进食后半小时加重,可自行缓解。近3个月来体重减轻5kg,胃镜检查示胃小弯侧直径3cm溃疡病灶,取活组织标本行病理检查。能够诊断溃疡病灶属恶性的病理形态学依据是

- A.细胞质出现空泡
- B.胞质黏液明显增多
- C.细胞核大小一致
- D.核仁清楚
- E.细胞异型性明显

113.男,13岁,学生。持续畏寒、发热1周,神志不清半天。病前有右足刺伤史。查体:T39.5℃,P123次/分,BP65/45mmHg,右足跟部红肿,血常规WBC 24.3×10^9 ,N0.89,10.11。导致本病最可能的病原体是

- A.革兰阴性菌
- B.真菌

- C.革兰阳性菌
- D.病毒
- E.寄生虫

114.女, 40 岁。右上腹胀痛伴畏寒、发热 2 天, 巩膜黄染 1 天。查体: T39°C,P100 次/分, 右上腹部压痛、反跳痛及肌紧张明显, 肝区叩击痛阳性, 血 WBC18.2×10⁹/L,N0.85。B 超示胆囊及胆总管结石, 该患者最可能感染的致病菌是

- A.草绿色链球菌
- B.大肠埃希菌
- C.金黄色葡萄球菌
- D.铜绿假单胞菌
- E.肺炎链球菌

115.某村卫生室私自从“不法药贩”处购人药品用于患者的治疗, 险些造成患者死亡。事发后, 经有关部门调查检测, 认定该药品为假药。该认定依据的事实是

- A.药品标签未标明有效期
- B.药品擅自添加着色剂
- C.直接接触药品的包装材料未经批准
- D.药品超过有效期
- E.药品所含成分与国家药品标准规定的成分不符

【A3/A4 型题】答题说明: 以下提供若干个病例, 每个病例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(116~117 题共用题干)

男, 18 岁。双下肢及颜面水肿 1 周。尿沉渣镜检: RBC0-2 个/HP,尿蛋白定量 12.2g/d。血 ALB18g/L,Scr79 μmol/L,ANA(-),乙型肝炎病毒标志物均 (-)。

该患者最可能的肾脏病理类型是

- A.毛细血管内增生性肾小球肾炎
- B.微小病变型肾病
- C.膜性肾病
- D.膜增生性肾小球肾炎
- E.局灶节段性肾小球硬化

117.如果经足量糖皮质激素治疗 12 周无效, 其病理类型最可能是

- A.毛细血管内增生性肾小球肾炎
- B.微小病变型肾病
- C.膜性肾病
- D.膜增生性肾小球肾炎
- E.局灶节段性肾小球硬化

(118~120 题共用题干)

用钼靶 X 线摄片检查方法做乳腺癌的筛检试验, 分别检查了 100 名经活检确诊的乳腺癌妇女和 100 名未患乳腺癌的妇女, 结果如下表:

活检确诊结果			
筛检结果	乳腺癌	非乳腺癌	合计
阳性	64	16	80
阴性	36	84	120
合计	100	100	200

118.此项筛检试验中灵敏度为

- A.16%
- B.84%
- C.64%
- D.36%
- E.74%

119.此项筛检试验中特异度为

- A.16%
- B.84%
- 64%
- D.36%
- E.74%

120.此项筛检试验的粗一致率为

- A.36%
- B.16%
- C.84%
- D.74%
- E.64%

(121~123 题共用题干)

连某因患严重的躁狂抑郁障碍，正在精神病专科医院住院治疗。因病情恶化，患者出现伤人毁物等行为，医院在没有其他可替代措施的情况下，对其实施了约束身体的措施，但实施后没有及时通知连某的监护人。连某的父亲作为监护人探视时，看到儿子被捆绑在病床上非常气愤。

121.依照《精神卫生法》对患者连某实施的约束行为的性质属于

- A.治疗性措施
- B.惩罚性措施
- C.保护性医疗措施
- D.诊断性措施
- E.警告性措施

122.对患者连某实施身体约束而未告知其监护人的做法，侵犯的患方权利是

- A.生命权
- B.健康权
- C.认知权
- D.知情权
- E.名誉权

123.该案例中所形成的医患关系模式是

- A.主动-被动型
- B.指导-合作型
- C.契约许可型
- D.指导参与型
- E.共同参与型

(124-125 题共用题干)

男，40岁。体检发现空腹血糖升高2个月。2次查空腹血糖分别为7.8mmol/L、7.4mmol/L，无口干、多饮、多食、多尿、体重下降。查体：身高170cm，体重90kg，BMI31.1，余无异

常。实验室检查：HbA1c7.8%。

124.该患者首选的治疗药物是

- A.罗格列酮
- B.胰岛素
- C.阿卡波糖
- D.二甲双胍
- E.格列苯脲

125.药物治疗 2 个月后，空腹血糖降至 6.2mmol/L，餐后 2 小时血糖 9~10mmol/L，拟采用药物联合治疗，首选的治疗药物是

- A.罗格列酮
- B.格列苯脲
- C.胰岛素
- D.二甲双胍
- E.阿卡波糖

【B 型题】答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(126~127 题共用备选答案)

- A.阿卡波糖
- B.胰岛素
- C.格列美脲
- D.比格列酮
- E.二甲双胍

126.主要减少肝糖输出的药物是

127.属于过氧化物酶增殖体活化因子受体 γ 激动剂的是

(128~130 题共用备选答案)

- A.散点图
- B.圆图
- C.直条图
- D.直方图
- E.线图

128.用于描述连续型变量资料频率分布的统计图是

129.可用于描述两连续型变量之间相关关系的统计图是

130.描述事物内部各组成部分所占比重宜使用

(131~132 题共用备选答案)

- A.支气管哮喘
- B.血清病
- C.药物过敏性休克
- D.接触性皮炎
- E.自身免疫性溶血性贫血

131.属于 II 型超敏反应的疾病是

132.属于 III 型超敏反应的疾病是

(133~135 题共用备选答案)

- A.主要为收缩压升高

B.收缩压与舒张压均升高

C.主要为舒张压升高

D.收缩压降低，舒张压升高

E.收缩压升高，舒张压可降低

133.严重甲状腺功能亢进患者的动脉血压变化特点是

134.正常老年人动脉血压的生理性变化特点是主要为

135.以小动脉硬化为主的患者动脉血压变化特点是

(136~137 题共用备选答案)

A.列兵样排列

B.形成管状结构

C.形成乳头状结构

D.有角化珠

E.有假菊形团结构

136.最符合小细胞癌组织学特点的是

137.最符合高分化鳞癌组织学特点的是

(138~139 题共用备选答案)

A.氧化与磷酸化的偶联

B.CO 对电子传递的影响

C.能量的贮存与利用

D. $2H^+$ 与 $1/2O_2$ 的结合

E.乳酸脱氢酶催化的反应

138.与 ADP 和 ATP 相互转变相关的过程是

139.与 ATP 生成有关的主要过程是

(140~141 题共用备选答案)

A.直肠息肉形成

B.脾脏白色锥形病灶

C.回盲部肠腔狭窄

D.胃壁溃疡形成

E.肝脏肿大

140.肺外结核病最常引起的形态改变是

141.慢性肺淤血可引起脏器改变是

(142~143 题共用备选答案)

A.丙酮酸羧化

B.乙酰 CoA 缩合

C.糖原分解

D.黄嘌呤氧化

E.糖原合成

142.生成酮体的中间反应是

143.三羧酸循环中草酰乙酸的来源是

(144~145 题共用备选答案)

A.开具抗菌药物处方牟取不正当利益

B.发生抗菌药物不良事件

C.出现开具抗菌药物超常处方 3 次以上且无正当理由

D.因紧急情况越级使用抗菌药物

E.使用的抗菌药物明显超出规定用量

144.医疗机构对医师提出警告并限制其特殊使用级抗菌药物处方权的情形是

145.医疗机构取消医师抗菌药物处方权的情形是

(146~148 题共用备选答案)

A.勇担成险，团结协作

B.掌握手术指征，动机纯正

C.以健康、稳定的情绪影响患者

D.对症下药，剂量安全

E.减轻痛苦，加速康复

146.手术后治疗的伦理要求是

147.心理治疗的伦理要求是

148.临床急救的伦理要求是

(149~150 题共用备选答案)

A.抗-HBs

B.抗-HBcIgM

C.抗-HBcIgG

D.抗-HBe

E.抗-HDV

149.乙型肝炎的保护性抗体是

150.提示体内乙型肝炎病毒处于复制状态的抗体是

第二单元

【A1 型题】答题说明：每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 中央型肺癌伴纵隔、肺门多发淋巴结肿大最常见于

- A. 鳞癌
- B. 大细胞癌
- C. 小细胞癌
- D. 腺癌
- E. 类癌

2. 属于非二氢吡啶类钙通道阻滞剂的是

- A. 硝苯地平
- B. 氨氯地平
- C. 非洛地平
- D. 吲达帕胺
- E. 维拉帕米

3. 不符合慢性肺源性心脏病心电图表现的是

- A. 电轴右偏
- B. $SV_1 + RV_5 \geq 1.05mV$
- C. 右束支传导阻滞
- D. V1 和 V2 导联出现 QS 波
- E. 肺型 P 波

4. 结核性胸膜炎患者，除抗结核治疗外，减轻胸膜肥厚最重要的措施是

- A. 反复胸腔穿刺抽液
- B. 胸腔内注入抗结核药物
- C. 胸腔内注射糜蛋白酶
- D. 口服糖皮质激素
- E. 胸腔内注射尿激酶

5. 诊断支气管扩张首选的检查是

- A. 胸部超声
- B. 胸部高分辨 CT
- C. 支气管造影
- D. 胸部 X 线片
- E. 胸部磁共振

6. 目前用于判断慢性阻塞性肺疾病严重程度的肺功能指标是

- A. FEV1 占预计值百分比
- B. FVC 占预计值百分比
- C. RV/TLC(残总比)
- D. MVV 占预计值百分比
- E. FEV1/FVC(一秒率)

7. 急性呼吸窘迫综合征所致顽固性低氧血症的最主要机制是

- A. 限制性通气功能障碍
- B. 弥散功能障碍
- C. 通气/血流比例失衡

D.分流率增加

E.呼吸功增加

8.有关气道高反应性（AHR)的描述正确的是

A.AHR 是哮喘发病的重要神经机制

B.气道炎症是导致 AHR 的重要机制

C.AHR 检测阳性者可诊断支气管哮喘

D.肺泡巨噬细胞激活后可降低 AHR

E.AHR 不受遗传因素的影响

9.急性肺水肿最特异的临床表现为

A.肺动脉瓣区第二心音亢进

B.心尖区收缩期杂音

C.咳大量粉红色泡沫痰

D.左肺底湿啰音

E.气促、发绀

10.支气管哮喘患者发作时禁用的药物是

A.吗啡

B.氨茶碱

C.泼尼松

D.肾上腺素

E.沙丁胺醇

11.仅对细胞外碱性环境中的结核菌有杀菌作用的药物是

A.乙胺丁醇

B.利福平

C.异烟肼

D.吡嗪酰胺

E.链霉素

12.肺癌空洞的典型 X 线表现是

A.薄壁空洞，形状不规则

B.厚壁空洞，内壁光滑

C.薄壁空洞，内壁光滑

D.厚壁空洞，内壁凹凸不平

E.厚壁空洞，内有液平

13.慢性阻塞性肺疾病的慢性气道炎症最主要的效应细胞是

A.嗜酸性粒细胞

B.树突状细胞

C.巨噬细胞

D.中性粒细胞

E.淋巴细胞

14.最易引起急性心力衰竭的心律失常是

A.窦性心动过缓

B.一度房室传导阻滞

C.偶发室性期前收缩

D.快速心房颤动

E.偶发房性期前收缩

- 15.能改善稳定型心绞痛患者临床预后的是
- A.尿激酶
 - B.阿司匹林
 - C.速效救心丸
 - D.硝酸甘油
 - E.利多卡因
- 16.治疗心室停搏的首选药物是
- A.胺碘酮
 - B.利多卡因
 - C.多巴酚丁胺
 - D.肌苷
 - E.肾上腺素
- 17.恶性高血压的病理特征是
- A.肾毛细血管纤维样坏死
 - B.大、中动脉粥样硬化
 - C.微血管炎
 - D.肾脏纤维化
 - E.肾小动脉纤维样坏死
- 18.右心衰竭时水肿形成的主要机制是
- A.血浆胶体渗透压降低
 - B.小动脉壁通透性增高
 - C.毛细血管流体静压升高
 - D.黏多糖在组织间隙内沉积
 - E.淋巴液回流受阻
- 19.病毒性心肌炎的诊断有赖于
- A.血肠道病毒核酸阳性
 - B.血清柯萨奇 B 组病毒 IgG1:640
 - C.心肌组织内病毒的检出
 - D.血 C 反应蛋白水平增高
 - E.血清柯萨奇 B 组病毒 IgM1:320 以上
- 20.左心衰竭患者合并右心衰竭后，可能减轻左心衰竭时的临床表现是
- A.恶心
 - B.喘憋
 - C.肝肿大
 - D.颈静脉充盈
 - E.下肢水肿
- 21.扩张型心肌病典型的超声心动图改变是
- A.收缩期心尖部向外膨出
 - B.瓣膜增厚、钙化、僵硬、瓣口开放受限
 - C.心腔扩大，室壁运动弥漫减弱，瓣口开放小
 - D.收缩期二尖瓣前叶向前运动
 - E.舒张期室间隔厚度与左室后壁之比 ≥ 1.3
- 22.心尖区触及舒张期震颤提示存在
- A.主动脉瓣狭窄

- B. 动脉导管未闭
 - C. 主动脉瓣关闭不全
 - D. 二尖瓣狭窄
 - E. 二尖瓣关闭不全
23. 急性肾小球肾炎水肿的主要机制为
- A. 肾小球滤过率下降，水钠潴留
 - B. 低蛋白血症
 - C. 毛细血管通透性增加
 - D. 继发性醛固酮增多症
 - E. 抗利尿激素增加
24. 最易发生血栓合并症的肾病综合征病理类型是
- A. 微小病变肾病
 - B. 系膜增生性肾炎（非 IgA 肾病）
 - C. 系膜增生性 IgA 肾病
 - D. 膜性肾病
 - E. 局灶节段性肾小球硬化
25. 协助诊断肾挫伤，首要的检查是
- A. 血肌酐
 - B. 尿常规
 - C. 静脉尿路造影
 - D. 腹部 CT 平扫
 - E. 血细胞比容
26. 老年人无痛性肉眼血尿，首先应考虑
- A. 泌尿系肿瘤
 - B. 泌尿系畸形
 - C. 泌尿系感染
 - D. 泌尿系结石
 - E. 泌尿系结核
27. 鹿角形结石引起泌尿道的病理生理改变，最严重的后果是
- A. 尿路梗阻
 - B. 尿路感染
 - C. 尿路上皮恶性变
 - D. 肾积水
 - E. 尿毒症
28. 下列有关急进性肾小球肾炎的描述，正确的是
- A. II 型多伴循环免疫复合物阳性
 - B. III 型多伴血清抗肾小球基底膜抗体阳性
 - C. 病理改变特征为系膜细胞重度增生
 - D. 光镜下改变是分型的主要依据
 - E. I 型多伴血清抗中性粒细胞胞浆抗体阳性
29. 前列腺癌筛查最常用的方法是
- A. 盆腔 CT
 - B. 盆腔 MRI
 - C. 前列腺特异性抗原检测

- D.前列腺穿刺
 - E.直肠指检
- 30.前列腺增生患者最重要的症状是
- A.尿潴留
 - B.排尿困难
 - C.尿失禁
 - D.无痛性肉眼血尿
 - E.尿频、尿急、尿痛
- 31.前列腺癌（T1b、T2期）的最佳治疗方法是
- A.应用促黄体释放激素类似物（LHRH-A）缓释剂
 - B.睾丸切除
 - C.根治性前列腺切除
 - D.抗雄激素治疗
 - E.化疗
- 32.慢性肾小球肾炎，GFR65ml/min，.最主要的治疗是
- A.应用 β 受体阻滞剂
 - B.应用 α -酮酸
 - C.低蛋白饮食
 - D.应用包醛氧化淀粉
 - E.应用ACEI
- 33.有关糖尿病的诊断，正确的是
- A.空腹血糖升高是重要的诊断指标
 - B.空腹血糖正常可排除糖尿病
 - C.两次OGTT仍不能诊断时应作第3次
 - D.糖耐量减低是糖尿病的一个亚型
 - E.尿糖阴性可排除糖尿病
- 34.可选择放射性核素治疗的疾病是
- A.肾上腺皮质功能减退症
 - B.原发性甲状旁腺功能亢进症
 - C.原发性甲状腺功能亢进症
 - D.原发性甲状腺功能减退症
 - E.特发性中枢性尿崩症
- 35.下列提示糖尿病微血管病变的是
- A.足部溃疡
 - B.高血压
 - C.脑卒中
 - D.眼底出血
 - E.心肌梗死
- 36.无功能性垂体腺瘤可能分泌的是
- A. α -亚单位
 - B.黄体生成素
 - C.促甲状腺激素
 - D.泌乳素
 - E.生长激素

37.慢性骨髓炎的治疗原则不包括

- A.摘除死骨
- B.清除瘢痕和肉芽
- C.消灭无效腔
- D.改善局部血液循环
- E.切除新生包壳

38.对肱骨外上髁炎有诊断意义的检查是

- A.Mills 征
- B.Thomas 征
- C.Spurling 试验
- D.Dugas 征
- E.“4”字试验

39.肱骨髁上骨折后出现手指不能内收、外展，夹纸试验阳性，最可能损伤的神经是

- A.腋神经
- B.正中神经
- C.桡神经
- D.肌皮神经
- E.尺神经

40.骨折愈合过程中，属于血肿机化演进期表现的是

- A.多出现软骨内化骨
- B.出现无菌性炎症反应
- C.可形成环状骨痂、髓内骨痂
- D.可形成内骨痂、外骨痂
- E.出现膜内化骨

41.胫骨中下段多段闭合性骨折功能复位后发生骨不愈合，最可能的原因是

- A.骨折端血液供应差
- B.未用促骨折愈合药物
- C.未达到解剖复位
- D.功能锻炼不够
- E.骨折端软组织嵌入

42.骨关节炎镇痛治疗首选

- A.口服阿司匹林
- B.口服氨基葡萄糖
- C.关节内注射透明质酸钠
- D.关节内注射激素
- E.口服对乙酰氨基酚

43.Allen 试验主要用于检查

- A.手部肌腱损伤情况
- B.手指末端血运情况
- C.神经损伤后的恢复情况
- D.手部神经损伤程度
- E.桡尺动脉的通畅和相互吻合情况

【A2 型题】答题说明：每一道考题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

44.男, 35 岁。2 周前发热、咳嗽、咳黄痰, 经抗炎治疗后好转。现再次高热、咳嗽、胸闷, 查体: T39.5℃, P115 次/分, R24 次/分, 气管右移, 左侧语颤减弱, 叩诊实音, 呼吸音消失, 血常规 WBC22×10⁹/L。最有效的治疗措施是

- A.胸腔闭式引流
- B.胸廓成形术
- C.胸膜剥脱术
- D.静脉点滴广谱抗生素.
- E.胸腔内注入抗生素.'

45.女, 58 岁。发热、左胸痛 3 天。查体: T37.5℃, BP150/90nunHg。左下肺呼吸音减弱, 可闻及双相摩擦音。心率 100 次/分。该患者最可能的诊断是

- A.肺炎
- B.自发性气胸
- C.心肌梗死
- D.肺栓塞
- E.胸膜炎

46.女,34 岁。寒战、高热、咳血痰 1 周。2 周前干农活时右小腿外伤。查体: T39.7℃。神志清楚, 精神差。双肺未闻及干湿性啰音, 右外踝上方可见小脓痂。血常规 WBC17×10⁹/L,N0.95, 胸部 X 线片发现右下肺、左上肺类圆形阴影, 其内可见空洞及液平。该患者最可能的诊断是 ‘

- A.血源性肺脓肿
- B.真菌性肺炎
- C.吸入性肺脓肿
- D.肺结核
- E.革兰阴性杆菌肺炎

47.男, 37 岁。1 周来咳嗽、寒战、高热, 最高体温 40℃。血 WBC15.2×10⁹/L, N0.91,经阿莫西林抗感染治疗后体温下降不明显, 逐渐出现呼吸急促。半月前颈部皮肤疖肿, 自行结痂。胸部 X 线片示双肺可见多发直径 2~3cm 的边缘模糊的类圆形阴影, 其内可见空洞。下列检查对明确诊断意义最大的是

- A.痰涂片革兰染色
- B.支气管镜
- C.动脉血气分析
- D.胸部 CT
- E.血培养

48.男, 50 岁。咳嗽、间断咯血 3 个月, 咳大量脓痰伴发热 1 周来诊。吸烟史 30 年, 胸部 X 线片示左下肺阴影伴空洞, 洞壁厚薄不一, 有液平, 诊断为肺脓肿, 该患者应首先考虑的基础疾病是

- A.肺结核
- B.肺血管炎
- C.支气管肺癌
- D.支气管扩张
- E.支气管囊肿

49.男, 45 岁。间断咳嗽 2 年, 每年均于秋季出现, 干咳为主, 夜间明显, 伴憋气, 常常影响睡眠, 白天症状常不明显。使用多种药物抗感染治疗无效, 持续 1~2 个月后症状可自行消失。本次入秋后再次出现上述症状, 体格检查未见明显异常。胸部 X 线片未见明显异常,

肺通气功能正常。为明确诊断，宜采取的进一步检查措施是

- A.支气管镜
- B.睡眠呼吸监测
- C.胸部 CT
- D.支气管激发试验
- E.血气分析

50.男，18岁，学生。咳嗽、发热1月余，多为干咳，下午3时发热，体温38.0℃，可自行退热，无咯血。发病以来体重下降3kg。胸部X线片：右肺门处可见密度增高的团块影。青霉素治疗半月未见好转。查体：T37.3℃；消瘦，双肺未闻及干湿啰音。该患者最可能的诊断是

- A.结节病
- B.肺门淋巴结结核
- C.右肺脓肿
- D.肺部真菌感染
- E.淋巴瘤

51.男，20岁。突发右侧胸痛伴气短1天人院。体检示右胸叩诊呈鼓音。该患者最可能出现的胸部X线片表现是

- A.膈疝
- B.气胸
- C.少量胸腔积液
- D.肺气肿
- E.巨大肺大疱

52.女，35岁，间断咳嗽、咳痰伴咯血20年，行HRCT检查示右中叶支气管囊状扩张，其余肺叶未见异常。今日再次咯血，量约200ml，给予静脉滴注垂体后叶素治疗，效果欠佳。该患者宜选择的最佳治疗措施为

- A.静脉滴注鱼精蛋白
- B.换用酚妥拉明静脉滴注
- C.支气管动脉栓塞
- D.支气管镜下止血
- E.手术切除病变肺叶

53.男，67岁，咳嗽、咳痰20年，加重伴气短1周。查体：T36.8℃，双肺呼吸音减弱，语音震颤减弱，叩诊呈过清音。该患者最可能的诊断是

- A.气胸
- B.心力衰竭
- C.慢性阻塞性肺疾病
- D.支气管扩张
- E.支气管哮喘

54.男，20岁。持续喘息发作24小时来急诊，既往哮喘病史12年。查体：端坐呼吸，大汗淋漓，发绀，双肺布满哮鸣音。动脉血气分析示：pH7.21，PaCO₂70mmHg，PaO₂55mmHg。此时应紧急采取的治疗措施是

- A.机械通气
- B.使用广谱抗生素
- C.静脉滴注糖皮质激素
- D.静脉注射氨茶碱

E.补充液体

55.女, 58岁。咳嗽、痰中带血、左胸痛1个月, 胸部X线片示左侧大量胸腔积液。查体: 左侧呼吸音消失、语颤减弱。有助于明确诊断的检查不包括

- A.胸水细胞学及生化
- B.胸部CT
- C.胸膜活检
- D.支气管镜
- E.肺功能

56.女, 24岁。近2个月来四肢关节疼痛, 伴皮肤结节、红斑。10天前发热($T38^{\circ}\text{C}$;)、咳嗽, 咳少量痰, 胸部X线片示右上肺斑片状影伴空洞形成。该患者最可能的诊断是

- A.支气管肺癌
- B.细菌性肺炎
- C.肺囊肿继发感染
- D.肺脓肿
- E.肺结核

57.男, 68岁。反复咳嗽、咳痰20年, 气短10年喘息加重2天。吸烟30年, 每日约1包。查体: 神志清楚, 呼吸急促, 端坐位, 口唇发绀。桶状胸, 左下肺呼吸音明显减弱, 右肺可闻及哮鸣音和湿啰音。 $\text{WBC}6.3 \times 10^9/\text{L}$, $\text{N}0.85$ 。为进一步诊治, 首选的检查是

- A.肺功能
- B.血气分析
- C.痰培养
- D.心电图
- E.胸部X线片

58.男, 69岁。反复咳嗽、咳痰、喘息20年, 加重2周, 嗜睡1周。无发热、咯血。既往吸烟30年, 每日约1包。查体: $T36.8^{\circ}\text{C}$, $\text{BP}160/95\text{mmHg}$, 昏睡状, 口唇发绀, 颈静脉充盈, 肝颈静脉回流征阳性, 双肺可闻及哮鸣音和细湿啰音, 心率130次/分, $\text{P}_2 > \text{A}_2$, 双下肢水肿, 病理征(-)。该患者肺动脉高压形成的最主要机制是

- A.缺氧、 CO_2 潴留致血管收缩
- B.原位血栓形成
- C.肺毛细血管静水压升高
- D.肺小动脉结构重塑
- E.血红蛋白浓度升高

59.女, 32岁。反复胸痛半年, 进行性活动后呼吸困难2个月, 否认慢性咳嗽、咳痰及心脏病史。查体: $\text{BP}120/80\text{mmHg}$, 双肺呼吸音低, 未闻及干湿啰音, $\text{P}_2 > \text{A}_2$, 三尖瓣区可闻及3/6级收缩期杂音, 剑突下可见心脏搏动。右下肢水肿。为确定诊断最有意义的检查是

- A.CT肺动脉造影
- B.胸部X线片
- C.肺通气功能
- D.血气分析
- E.超声心动图,

60.男, 68岁。活动后心悸、气短4年。突发喘憋1小时来诊。高血压病史10年余, 平时血压波动于(130~150)/(70~90)mmHg, 查体: $\text{BP}230/100\text{mmHg}$, 端坐位, 双肺底可闻及少许湿性啰音, 心率114次/分。该患者最适宜的治疗是

- A.口服阿替洛尔

- B.口服硝苯地平
- C.口服哌唑嗪
- D.肌内注射利血平
- E.静脉滴注硝普钠

61.女, 34 岁。胸闷、气促 1 月余, 伴干咳。查体:R22 次/分, BP90/80mmHg。端坐位, 颈静脉怒张, 双肺未闻及干湿啰音, 心率 90 次/分, 律齐, 心音低而遥远, P2 无亢进, 肝肋下 3cm, 肝颈静脉回流征阳性, 双下肢水肿。其心浊音界最可能为

- A.靴形
- B.梨形
- C.烧瓶样
- D.向左扩大
- E.普大心

62.男, 72 岁。10 年前因急性心肌梗死住院。5 年前出现活动后气喘, 夜间憋醒。近 1 年双下肢水肿。少尿。查体: BP140/90mmHg,颈静脉怒张。双下肺可闻及细湿啰音。心界向两侧扩大, 心率 110 次/分, 肝肋下 3cm, 质中, 压痛(+), 双下肢水肿, 该患者最可能的诊断为

- A.右心衰竭
- B.全心衰竭
- C.心功能III级 (NYHA 分级)
- D.左心衰竭
- E.心功能III级 (Killip 分级)

63.女, 76 岁。持续性心房颤动 2 年, 有脑血栓和糖尿病病史, 查体: BP120/65mmHg, 心率 87 次/分, 心脏各瓣膜区未闻及杂音, 该患者最适宜的抗栓治疗措施是

- A.皮下注射低分子肝素
- B.静脉滴注肝素
- C.口服阿司匹林
- D.口服氯吡格雷
- E.口服华法林

64.男, 56 岁。2 年来间断出现活动时胸闷, 休息后可缓解, 近 4 个月无胸闷发作, 查体: BP130/80mmHg,心率 73.次/分, 心脏各瓣膜区未闻及杂音, 最有助于明确诊断的检查是

- A.放射性核素静态心肌显像
- B.动态心电图
- C.超声心动图
- D.心电图运动负荷试验
- E.胸部 X 线片

65.女, 43 岁。诊断风湿性心脏瓣膜病 20 余年。查体: 心前区未触及震颤, 胸骨左缘第 3 肋间可闻及舒张期叹气样杂音, 心尖部可闻及舒张早中期杂音, S1 减弱。最可能的诊断是

- A.主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣器质性狭窄
- B.主动脉瓣关闭不全伴二尖瓣相对性狭窄
- C.主动脉瓣器质性狭窄伴二尖瓣器质性狭窄
- D.主动脉瓣相对性狭窄伴二尖瓣相对性狭窄
- E.主动脉瓣相对性狭窄伴二尖瓣器质性狭窄

66.男, 49 岁。发作劳力性胸痛 2 月余, 每次持续 5~10 分钟, 休息 2~3 分钟可自行缓解。查体: BP140/90mmHg,心率 110 次/分, 律齐。心电图示窦性心律。为控制心率宜首选的药物是

- A.地高辛
- B.胺碘酮
- C.普罗帕酮
- D.维拉帕米
- E.美托洛尔

67.男, 55 岁, 突发持续胸痛 4 小时。查体: BP110/50mmHg, 心率 30 次/分, 律齐, 心电图示急性下壁、右室心肌梗死, 三度房室传导阻滞。为提高心室率应立即采取的治疗措施是

- A.静脉滴注异丙肾上腺素
- B.静脉滴注多巴酚丁胺
- C.静脉注射肾上腺
- D.同步直流电复律
- E.植入临时性心脏起搏器

68.女, 68 岁。1 年前于坐位早餐时无明显诱因突感心悸, 随之意识丧失跌倒, 数分钟后意识恢复。无大汗、肢体抽搐、口吐白沫和大小便失禁。1 年来反复发作上述症状 3 次。发作与体位和运动无关。查体: BP130/70mmHg, 心率 48 次/分。心电图示二度 II 型房室传导阻滞。该患者意识丧失最可能的原因是

- A.低血糖
- B.心律失常
- C.癫痫发作
- D.体位性低血压
- E.迷走神经张力增高

69.男, 60 岁, 突发意识丧失, 心电监护示心电波形、振幅与频率均不规则, 无法辨认 QRS 波群、ST 段与 T 波。该患者应首选

- A.利多卡因 1~1.5mg/kg 静脉注射
- B.美托洛尔 5mg 静脉注射
- C.胺碘酮 150mg 静脉注射
- D.阿托品 0.1mg 静脉注射
- E.360J 直流电除颤

70.男, 19 岁。约 2 周前曾咳嗽, 流涕, 近 3 天感心悸。查体: 心界不大, P2>A2, 心率 96 次/分, 可闻及频发期前收缩。心脏各瓣膜区未闻及杂音和附加音。心电图示, 室性期前收缩, 血清肌钙蛋白升高。该患者最可能的诊断是

- A.感染性心内膜炎
- B.扩张型心肌病
- C.急性心肌梗死
- D.急性心包炎
- E.病毒性心肌炎

71.男, 35 岁。发现高血压 7 个月, 未服药, 改善生活行为后血压为 (140-150)/(90~95)mmHg, 心率 56 次/分。该患者治疗首选的药物是

- A.维拉帕米
- B.哌唑嗪
- C.利血平
- B.培哌普利
- E.比索洛尔

72.女, 40 岁。因持续胸痛 1 天就诊。10 天前曾发热伴咳嗽。查体: BP120/70mmHg, 心界不

大，心率 84 次/分，律齐，胸骨左缘第 3、4 肋间可闻及性质粗糙、高音调、与心搏一致的双期搔抓样音，与呼吸无关。该患者最可能的诊断是

- A.限制型心肌病
- B.病毒性心肌炎
- C.急性心包炎
- D.肥厚型心肌病
- E.急性胸膜炎

73.男，38 岁。1 年来活动后气促，伴腹胀及双下肢水肿。自述既往无不适，生活工作正常。查体：BP100/60mmHg，颈静脉怒张，双肺底可闻及湿性啰音，心界向两侧扩大，S1 减弱，心尖部可闻及 3/6 级收缩期杂音，肋下 3cm，双下肢凹陷性水肿。该患者最可能的诊断是

- A.扩张性心肌病
- B.风湿性心脏病
- C.缩窄性心包炎
- D.冠心病
- E.肥厚型心肌病

74.男，75 岁，进行性吞咽困难 3 月余，目前能进半流食。胃镜检查：食管距门齿 20cm 处发现一长约 6cm 菜花样肿物，病理报告为鳞状细胞癌。其最佳治疗方法为

- A.食管癌根治术
- B.姑息食管癌切除术
- C.化疗
- D.胃造瘘术
- E.放疗

75.女，70 岁。蛋白尿 1 个月，尿蛋白 6g/L。蛋白电泳显示以小分子蛋白为主，呈单峰。其蛋白尿的性质应该为

- A.组织性蛋白尿
- B.溢出性蛋白尿
- C.肾小管性蛋白尿
- D.分泌性蛋白尿
- E.肾小球性蛋白尿

76.男，60 岁，发现全程肉眼血尿条状血凝块 1 周。无尿频、尿急、尿痛。B 超检查显示左肾实质占位，肿块直径 55mm，为明确肿块性质，进一步检查首选

- A.尿细胞学检查
- B.肾动脉造影
- C.静脉尿路造影
- D.腹部 CT 平扫+增强
- E.尿路平片

77.女，25 岁，妊娠 7 个月，发热，腰痛伴恶心、呕吐、尿频、尿急、尿痛 1 天。查体：T38.5℃，左肾区叩击痛阳性。血常规：WBC11.9×10⁹/L,N0.82,尿常规：RBC5~8 个/HP,WBC30~35 个/HP。尿蛋白 (+-)。最可能的诊断是

- A.急性胰腺炎
- B.急性肾小球肾炎
- C.急性膀胱炎
- D.急性肾盂肾炎
- E.急性胃肠炎

78.女, 25 岁。乏力 3 个月。查体: BP70/105mmHg。化验检查: Hb84g/L, 尿常规: 蛋白(++), 颗粒管型 2~3 个/低倍视野, 血 BUN12.3mmol/L,Scr276.8 μ mol/L。针对该患者不应采取的措施是

- A.低磷饮食
- B.控制血压
- C.根据尿量适当限水
- D.高蛋白饮食
- E.低钠饮食

79.男, 65 岁。右侧阴囊逐渐增大 5 年, 无疼痛。查体见右侧阴囊肿大, 大小约 15cm×10cm, 呈囊性, 未触及睾丸, 透光试验阳性, 首先应考虑的诊断是

- A.睾丸炎
- B.精索静脉曲张.
- C.腹股沟斜疝
- D.睾丸肿瘤
- E.睾丸鞘膜积液

80.男, 47 岁, 水肿 6 个月。查体: BP120/70mmHg。尿蛋白定量 2.5g/d,尿红细胞 20~30 个/HP, .血白蛋白 32g/L,血肌酐 141 μ mol/L。临床诊断为

- A.急性肾小球肾炎
- B.慢性肾小球肾炎
- C.急进性肾小球肾炎
- D.无症状性蛋白尿和(或)血尿
- E.肾病综合征

81.男, 35 岁。镜下血尿伴蛋白尿 3 年, 辅助检查: 尿 RBC20~25 个/HP,为异形红细胞, 尿蛋白定量 1.5g/d,血肌酐 90 μ mol/L,B 超示双肾大小正常。为明确诊断需要进一步采取的检查是

- A.肾活检.
- B.尿培养.
- C.肾盂造影
- D.ANCA
- E.腹部 X 线平片

82.男, 20 岁。跨栏比赛时会阴部受伤。伤后会阴部疼痛、青紫, 尿道出血, 不能自行排尿。应考虑的诊断是

- A.尿道球部损伤
- B.耻骨骨折
- C.后尿道损伤.
- D.睾丸损伤
- E.膀胱破裂

83.女, 35 岁。闭经 2 年, 体检发现双侧乳房触发溢乳, 首选检测的指标是

- A.PRL
- B.FSH
- C.ACTH
- D.GH
- E.TSH

84.女, 64 岁, 2 型糖尿病 10 年, 口服降糖药治疗, 近 2 个月出现头昏, 视物模糊。查体:

BP170/100mmHg,双肺呼吸音清晰,心界不大,肝脾未触及。双下肢水肿。空腹血糖 9.6mmol/L,餐后血糖 14.2mmol/L,血肌酐 $96 \mu\text{mol/L}$,尿蛋白定量 0.7g/d,目前应诊断为糖尿病肾病

- A.IV 期
- B.V 期
- C.II 期
- D.III 期
- E.I 期

85.女,40岁,闭经、溢乳半年,磁共振发现垂体 1.5cmx1.0cm 占位病变,需做激素检查。下列无助于诊断的检查是

- A.泌乳素
- B.生长激素
- C.促肾上腺皮质激素
- D.血管加压素
- E.促甲状腺激素

86.男,45岁。进行性少尿4天。既往体健,查体:BP160/90mmHg,心率120次/分,双下肢水肿,血 BUN 18.9mmol/L ,Scr $655.6 \mu\text{mol/L}$ 。动脉血气分析:pH7.31,PaO₂65mmHg,PaCO₂33mmHg,BE-8.5mmol/L。急需采取的最主要治疗措施是

- A.透析治疗
- B.利尿治疗
- C.降压治疗
- D.口服泼尼松
- E.纠正酸毒

87.男,46岁。消瘦、乏力、头晕、食欲减退3年,近5个月早晨有时出现精神症状。进食后缓解。查体:BP80/60mmHg,皮肤色素沉着,心率60次/分,血糖2.7mmol/L,血钠124mmol/L,血钾5.2mmol/L。最可能的病因是

- A.原发性慢性肾上腺皮质功能减退症
- B.胰岛素瘤
- C.营养不良
- D.2型糖尿病
- E.自主神经功能紊乱

88.男,30岁。发作性头晕、头痛,伴面色苍白、心悸、冷汗9个月。每次持续20分钟左右,发作时BP(180~220)/(110~140)mmHg,平素血压正常,查体:BP120/80mmHg,体型偏瘦,心率90次/分,律齐,四肢末梢凉对明确诊断最有帮助的是在发作时检测

- A.血皮质醇
- B.血醛固酮
- C.血儿茶酚胺
- D.血电解质
- E.血浆肾素活性

89.女,68岁。高血压病史5年,药物治疗后血压波动于(140-170)/(50-80)mmHg。既往糖尿病病史。该患者的收缩压控制目标应低于

- A.140mmHg
- B.130mmHg
- C.125mmHg
- D.120mmHg

E.110mmHg

90.女, 50 岁。糖尿病肾病伴高血压, BP170/100mmHg, 心率 54 次/分, 血肌酐 $158 \mu\text{mol/L}$ 。最适宜的治疗药物组合是

- A.氢氯噻嗪、吲达帕胺
- B.氢氯地平、缬沙坦
- C.美托洛尔、维拉帕米
- D.普萘洛尔、卡托普利
- E.螺内酯、福辛普利

91.女, 32 岁。购物时感头晕、恶心、乏力, 随即意识丧失, 摔倒在地, 约 1 分钟自行苏醒, 无大小便失禁, 无遗留意识或肢体功能障碍。其意识丧失最可能的病因为

- A.分离(转换)障碍
- B.低血糖症
- C.迷走神经张力异常增高
- D.短暂性脑缺血发作
- E.心律失常

92.女, 21 岁。左胫骨下段横形骨折, 经手法复位石膏固定后复查 X 线片, 符合功能复位的是

- A.断端旋转 5°
- B.断端重叠 2cm
- C.骨折向外侧成角 5°
- D.断端分离 1cm
- E.骨折向前方成角 5°

93.男, 41 岁。2 周前搬重物时出现腰部疼痛, 排便时加重, 并向左下肢放射, 逐渐出现左小腿皮肤感觉减退。查体: 腰部活动受限, 左侧直腿抬高 40° 出现左下肢放射性疼痛, 腰椎 X 线片未见异常。最可能的诊断是

- A.腰椎间盘突出症
- B.腰椎肿瘤
- C.腰椎管狭窄症
- D.强直性脊柱炎
- E.腰扭伤

94.女, 65 岁, 摔伤致右髌关节疼痛、功能障碍。X 线片示右股骨颈头下骨皮质连续性中断。Pauwels 角 60° 。该股骨颈骨折属于

- A.不完全骨折
- B.关节外骨折
- C.外展骨折
- D.稳定性骨折
- E.内收骨折

95.女, 78 岁。跌倒时左肩部着地受伤。既往脑梗死病史 8 年, 遗留左侧肢体偏瘫。查体: 左肩部肿痛, 活动受限。X 线片检查示左肱骨大结节与肱骨干交界处可见多个骨碎块, 对线尚可, 略有侧方移位。首选治疗方法是

- A.尺骨鹰嘴外展位骨牵引
- B.手法复位、外固定
- C.小夹板固定、皮牵引
- D.切开复位内固定

E.三角巾悬吊、对症治疗

96.女, 38 岁。低热 2 个月, 左大腿根部肿物 10 天。查体: 左腹股沟处可触及 5cmx5cm 质软圆形肿物, 轻度压痛。B 超显示为低回声肿物。腰椎 X 线片上见腰大肌阴影增宽, L2、L3 椎体边缘骨质破坏, L2-3 椎间隙狭窄。首选应考虑的诊断是

- A.转移性骨肿瘤
- B.类风湿关节炎
- C.骨髓炎
- D.骨结核
- E.骨巨细胞瘤

97.女, 45 岁。不慎被汽车撞伤左下肢。查体: 左膝部及小腿瘀血、肿胀、疼痛, 膝关节屈伸受限, 足背动脉触诊不清, 足背屈、外翻功能障碍。其中符合腓总神经损伤的表现是

- A.小腿疼痛、活动受限
- B.足背屈、外翻功能障碍
- C.小腿瘀血、肿胀
- D.足背动脉触诊不清
- E.膝关节屈伸受限

98.女, 78 岁。跌倒右髌受伤 2 小时, 局部疼痛, 活动受限, 患肢缩短, 轴向叩击痛 (+)。X 线片显示右股骨颈基底部骨皮质连续性中断, 断端嵌插, Pauwels 角 25° 。一般状态差, 既往高血压, 肺源性心脏病、糖尿病病史 30 余年, 心功能 IV 级。最佳治疗方案是

- A.闭合复位内固定
- B.切开复位内固定
- C.下肢中立位皮牵引 6~8 周
- D.转子间截骨矫正力线
- E.人工关节置换术

99.女, 3 岁。被牵拉前臂后, 出现肘部疼痛。不愿用手取物, 桡骨近端压痛。X 线片检查未见骨折征象。最适宜的治疗方法是

- A.肩肘固定带悬吊
- B.外敷药物
- C.石膏固定
- D.手法复位
- E.切开探查

100.男, 35 岁, 机器碾压致腕部、手部受伤, 手掌部皮肤严重缺损, 肌腱外露, 手指均不能屈曲, 感觉消失, X 线示: 2~3 掌骨骨折。不正确的处理是

- A.在止血带下清创
- B.行皮瓣移植术
- C.肌腱、神经损伤必须同时行一期修复
- D.影响血供的血管损伤应立即修复
- E.骨折必须复位固定

101.男, 38 岁。因车祸致骨盆、股骨骨折急诊手术。术后 1 天逐渐出现憋气, 烦躁不安, 经皮血氧饱和度 (SPO₂) 监测示: 由 98% 逐渐下降至 87%, 经面罩给氧 (5L/min) 后 SpO₂ 增加至 89%, 但症状缓解不明显。查体: T37.2℃, P103 次/分, R32 次/分, BP90/60mmHg, 意识清楚, 口唇发绀, 双肺呼吸音对称, 双肺闻及少许湿啰音, 该患者最可能的诊断是

- A.气胸
- B.肺血栓栓塞

- C.腹腔内出血
- D.急性左心衰竭

E.急性呼吸窘迫综合征

102.男, 20 岁, 高空坠落, 下腹部疼痛。骨盆分离和挤压试验阳性, 会阴部淤血。首先应考虑的诊断是

- A.髌关节脱位
- B.尾骨骨折
- C.耻骨骨折
- D.骶骨骨折
- E.腰椎骨折

103.男, 21 岁。车祸致左髌关节受伤, 出现左髌部疼痛、外展、外旋、屈曲畸形, 弹性固定, 正确的诊断是

- A.股骨颈骨折
- B.髌关节后脱位
- C.骨盆骨折
- D.髌关节中心性脱位
- E.髌关节前脱位

【A3/A4 型题 | 答题说明: 以下提供若干个病例, 个病例下设若干道考题。请根据答案所提供的信息, 在每一道考题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案。

(104~105 题共用题干)

男, 70 岁, 间断咳嗽 30 余年, 加重伴意识障碍 2 天人院。查体: T38.0°C, P102 次/分, R21 次/分, BP120/80mmHg, 烦躁不安, 球结膜充血水肿, 口唇发绀。桶状胸, 双肺可闻及哮鸣音, 双下肺少量湿性啰音。

104.对诊断最有意义的检查是

- A.心电图
- B.脑电图
- C.痰细菌培养
- D.动脉血气分析
- E.胸部 CT

105.该患者禁忌使用的药物是

- A.甲泼尼龙
- B.地西洋
- C.氨茶碱
- D.地塞米松
- E.头孢曲松

(106~107 题共用题干)

女, 48 岁, 胸闷不适半年, 近来出现进行性四肢无力。胸部 X 线片发现右前上纵隔阴影。

106.该患者首先考虑的诊断是

- A.食管囊肿
- B.胸腺瘤
- C.神经源性肿瘤
- D.胸内甲状腺
- E.支气管囊肿

107.该患者首选的治疗措施是

- A.介入治疗
- B.射频治疗
- C.化疗
- D.放疗
- E.手术治疗

(108~109 题共用题干)

男, 45 岁。发热、咳脓痰 1 周, 胸部 X 线片示右下叶背段浸润阴影。用头孢呋辛治疗体温稍下降, 但痰量增多, 为脓血痰, 有臭味。1 周后复查胸部 X 线片示: 大片浸润阴影中出现空洞。

108. 治疗中需加用的药物是

- A.阿米卡星
- B.左氧氟沙星
- C.甲硝唑
- D.红霉素
- E.万古霉素

109. 治疗 2 周后, 患者临床症状明显改善, 胸部 X 线片示空洞缩小。抗感染的总疗程应为

- A.8~12 周
- B.6~8 周
- C.3~6 周
- D.2~4 周
- E.7~10 周

(110~111 题共用题干)

男, 72 岁。4 小时前因情绪激动突发极度气急,咳嗽,咳粉红色泡沫痰。出冷汗,焦虑不安。既往 COPD 史 20 年,高血压病 25 年。查体: T36.2℃,P120 次/分,R34 次/分,BP220/130mmHg,神志模糊,端坐位,口唇发绀。无颈静脉怒张。双肺可闻及细湿啰音及哮鸣音。心率 120 次/分,律齐,心尖区可闻及舒张早期奔马律及 2/6 级收缩期杂音,腹软,双下肢无水肿。血气分析: pH7.28,PaO₂60mmHg,PaCO₂60mmHg

110. 该患者突发气急的最可能原因是

- A.肺动脉栓塞
- B.COPD 合并右心衰竭
- C.高血压合并肺部感染
- D.COPD 急性加重
- E.高血压合并急性左心衰竭

111. 该患者不适宜的抢救措施是

- A.静脉滴注氨茶碱
- B.静脉注射呋塞米
- C.静脉注射吗啡
- D.静脉滴注硝普钠
- E.静脉注射毛花苷丙

(112~114 题共用题干)

女, 70 岁。突发胸闷、喘憋 10 小时入院。既往高血压病史 12 年,糖尿病病史 5 年。查体: BP160/90mmHg,端坐呼吸。双肺可闻及广泛湿啰音及散在哮鸣音。心率 128 次/分,心律齐,心脏各瓣膜听诊区未闻及杂音。ECG 示: V1~V6 导联 ST 段抬高。动脉血气分析: pH7.35, PaO₂71mmHg,PaCO₂40mmHg

112.该患者目前喘憋最可能的病因是

- A.肺动脉栓塞
- B.支气管哮喘
- C.糖尿病酮症酸中毒
- D.急性心肌梗死
- E.肺部感染

113.最恰当的药物治疗是

- A.口服华法林
- B.静脉滴注糖皮质激素
- C.静脉推注毛花苷 C
- D.静脉滴注硝酸甘油
- E.静脉滴注抗生素

114.患者经治疗后好转。入院 5 天，患者突发呼吸困难、咳嗽、咳粉红色泡沫痰，查体：BP150/90mmHg,心尖部可闻及 4/6 级收缩期杂音。该患者突发呼吸困难的最可能原因为

- A.肺栓塞进展为肺梗死
- B.再次发生肺栓塞
- C.急性乳头肌功能不全
- D.哮喘急性发作
- E.肺部感染加重

(115-116 题共用题干)

男，15 岁。全身水肿 1 周。查体：BP120/70mmHg,腹部移动性浊音阳性。尿蛋白定量 6.5g/d,沉渣 RBC0~2/HP。血白蛋白 22g/L,胆固醇 8mmol/L,BUN6.5mmol/L,Scr98 μ mol/L。ASO 升高，血补体 C30.88g/L(正常值 0.8~1.5g/L)。

115.最可能的临床诊断是

- A.原发性肾病综合征
- B.狼疮性肾炎
- C.急进性肾小球肾炎
- D.急性肾小球肾炎
- E.慢性肾小球肾炎

116.最可能的肾脏病理类型是

- A.新月体型肾炎
- B.膜性肾病
- C.微小病变肾病
- D.重度系膜增生性肾炎
- E.系膜毛细血管性肾炎

(117~119 题共用题干)

男，40 岁。双下肢水肿 1 个月。查体：BP150/100mmHg,尿红细胞 3~5/HP,尿蛋白 5g/d,血白蛋白 20g/L,血肌酐 70 μ mol/L。近 3 天腰痛，尿量减少。复查尿常规：尿红细胞 30~50/HP。

B 超示右肾增大。

117.血尿加重最可能的原因是

- A.急性过敏性间质肾炎
- B.肾静脉血栓形成
- C.合并泌尿系统肿瘤
- D.进展为新月体肾炎

E.尿路感染

118.为明确诊断，最重要的检查是

A.肾血管彩超检查

B.肾活检

C.测尿钠排泄分数及尿渗透压

D.尿培养

E.ANCA 及抗 GBM 抗体检查

119.该患者首选的降血压药物是

A.氨氯地平

B.美托洛尔

C.哌唑嗪

D.氢氯噻嗪

E.氯沙坦

(120~121 题共用题干)

男，38岁。会阴部不适，双侧睾丸疼痛1年。社区医院按“前列腺炎”治疗效果不明显，近期症状加重，出现血精。查体：睾丸正常，左侧附睾尾部肿大，质地偏硬，左输精管增粗，呈“串珠状”改变。直肠指检：前列腺略大，有大小不等的结节，无压痛。

120.最可能的诊断是

A.前列腺癌

B.附睾、输精管炎

C.精囊炎

D.慢性前列腺炎

E.生殖系结核

121.为协助诊断，需补充的最重要的病史是

A.不洁性生活史

B.泌尿系感染史

C.附睾炎病史

D.睾丸炎病史

E.结核病史

(122~123 题共用题干)

男，70岁。进行性排尿困难10年，夜尿3~4次。从未药物治疗。直肠指检：前列腺体积增大，中央沟消失，表面尚光滑，质地中等。B超：双肾无积水，输尿管未见扩张。最大尿流率10ml/s。

122.首先考虑的疾病是

A.膀胱结石

B.膀胱颈部挛缩

C.前列腺癌

D.前列腺增生

E.神经源性膀胱

123.首选的治疗方法是

A.膀胱造瘘

B.根治性前列腺切除术

C.口服多沙唑嗪+非那雄胺

D.经尿道前列腺切除术(TURP)

E.膀胱切开取石

(124~126 题共用题干)

女, 45 岁, 脸圆、变红 1 年, 体重增加、月经稀发 6 个月。查体: BP160/100mmHg, 向心性肥胖, 皮肤薄, 面部痤疮较多, 下颌小胡须, 全身毳毛增多。腹部、大腿根部可见宽大紫纹。血钾 1.1mmol/L, 空腹血糖 15.4mmol/L。

124. 该患者最可能的诊断是

- A. 原发性醛固酮增多症
- B. 原发性高血压
- C. 女性男性化
- D. 库欣综合征
- E. 糖尿病

125. 定性诊断最主要的检查是

- A. 大剂量地塞米松试验
- B. 血 ACTH 测定
- C. 小剂量地塞米松试验
- D. 血皮质醇测定
- E. 血醛固酮测定

126. 有助于了解其病因或病变部位的检查是

- A. 大剂量地塞米松试验
- B. OGTT
- C. 小剂量地塞米松试验
- D. 皮质醇测定
- E. 血醛固酮测定

(127~129 题共用题干)

男, 45 岁。体检发现血糖升高, 空腹血糖 7.6mmol/L, 餐后 2 小时血糖 13.6mmol/L, HbA1c 7.8%。查体: BP150/100mmHg, BMI 28, 心、肺、腹查体未见明显异常。

127. 该患者 HbA1c 控制目标应小于

- A. 7.5%
- B. 6.5%
- C. 5.5%
- D. 6.0%
- E. 8.0%

128. 在控制饮食和运动基础上首选的降血糖药物是

- A. 二甲双胍
- B. 阿卡波糖
- C. 那格列奈
- D. 吡格列酮
- E. 格列苯脲

(129~131 题共用题干)

男, 12 岁, 1 个月前无明显诱因出现左胫骨近端肿痛, 逐渐加重, 皮肤表面静脉怒张, 皮温增高。X 线片见左胫骨近端呈溶骨性破坏, 伴有骨膜日光放射表现。

129. 确诊该病的检查方法是

- A. CT
- B. MRI

C.组织活检

D.B 超

E.核素扫描

130.最可能的诊断是

A.骨囊肿

B.骨巨细胞瘤

C.骨髓炎

D.骨肉瘤

E.骨结核

131.最适宜的治疗方法是

A.刮除植骨

B.对症治疗

C.单纯截肢术

D.放疗

E.化疗+保肢治疗

【B 型题】答题说明：以下提供若干组考题，每组考题共用在前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案，某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(132~133 题共用备选答案)

A.肺炎克雷伯杆菌

B.大肠埃希菌

C.铜绿假单胞菌

D.金黄色葡萄球菌

E.流感嗜血杆菌

132.上述病原体中，最常见于社区获得性肺炎的是

133.上述病原体中，血浆凝固酶 (+)的是

(134~135 题共用备选答案)

A.螺内酯

B.氨氯地平

C.氢氯噻嗪

D.维拉帕米缓释剂

E.美托洛尔

134.高血压伴支气管哮喘患者禁用

135.高血压伴高钾血症禁用

(136~137 题共用备选答案)

A.胸部 X 线片

B.心肌核磁显影

C.冠状动脉 CT 造影

D.心电图

E.超声心动图

136.女，65 岁，心尖部可闻及 3/6 级收缩期杂音，最有助于明确诊断的检查是

137.男，55 岁，突发胸痛伴大汗 3 小时，有吸烟史，首选的检查是

(138~139 题共用备选答案)

A.上皮细胞管型

- B.白细胞管型
- C.颗粒管型
- D.红细胞管型
- E.脂肪管型

138.对急性肾盂肾炎诊断有意义的尿常规检查是

139.对急性肾小球肾炎诊断有意义的尿常规检查是

(140~141 题共用备选答案)

- A.草酸盐结石
- B.尿酸结石
- C.混合型结石
- D.碳酸盐结石
- E.磷酸盐结石

140.腹部平片不显影的结石是

141.感染性结石的性质是

(142-143 题共用备选答案)

- A.皮质醇
- B.泌乳素
- C.肾上腺素
- D.血管加压素
- E.促甲状腺激素释放激素

142.腺垂体分泌的激素是

143.神经垂体储存的激素是

(144~145 题共用备选答案)

- A.椎动脉型颈椎病
- B.脊髓型颈椎病
- C.交感神经型颈椎病
- D.神经根型颈椎病
- E.复合型颈椎病

144.手指麻木伴上肢放射痛，压头试验阳性，最可能的颈椎病类型是

145.手足无力、括约肌功能障碍、脚踩棉花感，最可能的颈椎病类型是

(146-147 题共用备选答案)

- A.饮食管理
- B.双胍类
- C.磺脲类
- D.磺脲类+双胍类
- E.胰岛素

146.女，45岁，体重75kg,身高169cm，2个月来发现糖尿病；胃纳食欲良好，经饮食管理及体育锻炼未能使增高血糖下降，需加用药物，首选为

147.女，25岁，妊娠4个月。经葡萄糖耐量试验证实为糖尿病，空腹血糖10mmol/L。其最恰当的治疗应选择为

(148-150 题共用备选答案)

- A.上腹刀割样痛伴肌紧张
- B.上腹烧灼痛伴反酸
- C.上腹钻顶样痛

D.右上腹绞痛

E.中上腹持续性剧痛

148.十二指肠球部溃疡的表现是

149.胆道蛔虫的表现是

150.内脏穿孔的表现是