

彩虹计划——中医外科学

张雨老师

一、总论

1. 致病因素:

①外感, 最常见“热毒”、“火毒”;

②感受特殊之毒(化学)

③外来伤害(物理)

2. 发病机理: 邪正盛衰, 气血凝滞, 经络阻塞, 脏腑失和

3. 阴证: 肿势平塌下陷, 根盘散漫, 柔软如馒, 坚硬如石

阳证: 肿势高突, 根盘收束, 软硬适度,

4. 部位辨证

上部: 风——风温、风热;

中部: 气郁、火郁;

下部: 湿——寒湿、湿热。

5. 经络辨证:

多气多血——阳明; 多血少气——太、厥阴; 多气少血——少阳、阴; 太阴

引经药

阳明——白芷, 石膏 少阳——柴胡 太阳——羌活 少阴——细辛 厥阴——吴茱萸

6. 辨肿:

热肿: 肿而色红, 皮薄光泽。焮热疼痛, 肿势急剧

寒肿: 肿而不硬。皮色不泽, 苍白或紫暗。皮肤清冷常伴有酸痛, 得暖则舒

风肿: 发病急骤, 漫肿宣浮, 或游走不定, 不红微热, 轻微疼痛

湿肿: 皮肉重垂胀急, 深按凹陷, 如烂棉不起, 浅则光亮如水疱, 破流黄水, 浸淫皮肤(水)

痰肿: 肿势软如棉, 或硬如馒, 大小不一形态各异, 无处不生, 不红不热, 皮色不变(无水)

气肿: 皮紧内软, 按之凹陷。放手复原, 不红不热。随喜怒消长

瘀血肿: 肿而胀急, 色初暗褐。后转青紫。逐渐变黄室消退

脓肿: 肿势高突, 焮红灼热, 剧烈跳痛, 按之应指。

7. 辨痒

风胜: 走窜不定, 遍体作痒, 多为干性

湿胜：黄水淋漓，多为**湿性**

热胜：**焮红灼热**

虫：似**虫行**皮中，易传染

血虚：皮肤变厚，**干燥，脱屑**

8. 确认成脓方法：接触法、透光法、点压法、穿刺法、B超（x线和切开不可确认成脓）

9. 辨溃疡形态：化脓性：**口大底小**，内有少量脓性分泌物

疮疡性（结核性）：脓水稀薄，败絮状物

岩性：翻花如岩穴

梅毒性：边缘整齐、坚硬削直**如凿**

压迫性（缺血性）：褥疮

10. 内治法

消：没有脓，初期

托：化脓——**正虚：补托**

——**正不虚：透托**

补：溃后

11. 外治法

（1）膏药（薄贴、硬膏）：**太乙膏、千锤膏**用于**阳证**疮疡。适用于：所有阶段

（2）油膏（软膏）

金黄玉露治阳证

冲和膏治疗半阴半阳

回阳玉龙膏——阴证

溃疡后生肌——生肌玉红膏、红油膏、生肌白玉膏

12. 箍围药（敷贴）——防止扩散（紧箍咒），以**醋调**，可以**散瘀解毒**

13. 掺药：消散药——**红灵丹**——治阳证

溃疡期生肌——**红油膏**

提脓去腐药（去腐肉）——带数字的，**对升丹过敏者：黑虎丹**

腐蚀药：**白降丹**

生肌收口药：生肌散、八宝丹

14. 切口选择：脓腔**最低点**或**最薄弱处**进

循经直切：一般疮疡

放射：①乳房②低位肛周脓肿（高位肛周脓肿，弧形切开）

沿皮肤纹理：面部脓肿

侧切：手指（任何地方）

避免越过关节：关节区脓肿（横切、弧形、“S”形）

15. 砭镰法：用三棱针或刀锋放血——治急性阳证疮疡——下肢丹毒、红丝疔等

挑治法：肛门疾病

引流法：引流不畅

垫棉法：急性期不能用

冷冻疗法：皮肤留有痣

疮疡

一、疔（单个毛囊炎）

1. 特征：3 厘米，跟脚浅，属阳证

2. 临床表现

有头疔：中心有一脓头

无头疔：无脓头

蝼蛄疔：儿童头部，头皮窟空（十字切开，彻底清疮，加压垫棉）。

疔病：此起彼伏，好发于项后发际、背部、臀部。

暑天发作：暑疔（暑季的病一般用——清暑汤）

3. 辨证论治

热毒蕴结证——五味消毒饮和黄连解毒汤（吾皇）

暑热浸淫——清暑汤

体虚毒恋，阴虚内热——仙方活命饮合增液汤

体虚毒恋，脾胃虚弱——五神汤合参苓白术散

二、疔（急性化脓性淋巴结炎）

1. 特征：3-6 厘米，跟脚深且硬

2. 颜面部疔疮——易走黄（脓毒血症、败血症）——病机：火毒炽盛

3. 手足部疔疮

蛇眼疔：甲沟炎——侧切

蛇腹疔：指腹炎——侧切

蛇头疔：指头炎——侧切

托盘疔：手掌化脓——沿着掌横纹切

4. 红丝疔（四肢内侧，一条红线）

急性淋巴管炎——砭镰法（寸寸挑断，贴太乙膏掺红灵丹）

5. 内治法：清热解毒

三、痈

1. 特征：6~9 厘米

2. 颈痈：颈部淋巴结炎，一个小球

腋痈：腋部淋巴结炎

脐痈：脐腹部皮肤软组织感染

委中毒：腠窝淋巴结炎

锁喉痈：不是痈，是发

3. 治疗：

火毒凝结证（初期、未化脓）——仙方活命饮

热胜肉腐证（化脓）——仙方活命饮合五味消毒饮

气血两虚证（溃后）——托里消毒散

4. 四痈：

颈痈（鸡卵）——牛蒡解肌汤

腋痈——柴胡清肝汤（肝）

脐痈（黄四）：湿热火毒证——黄连解毒汤合四苓散

脾气虚弱证——四君子汤

委中毒（与血瘀有关）：气滞血瘀证——活血散瘀汤

湿热蕴阻证——活血散瘀汤合五神汤（湿热）

气血两亏证——八珍汤

四、发（急性蜂窝组织炎）

1. 特征：边界不清，大到无边

2. 锁喉痈（绕喉）：痰热蕴结证（未化脓）——普济消毒饮

热胜肉腐证（化脓）——仙方活命饮

热伤胃阴证（溃后）——益胃汤

3. 臀痈（针毒结块）：湿火蕴结证——黄连解毒汤合仙方活命饮（黄仙）

湿痰凝滞证——桃红四物汤合仙方活命饮

气血两虚证——八珍汤

五、有头疽（一片毛囊炎）

1. 特征：>9~12cm（大者 30cm）+粟粒样脓头+溃烂后如莲蓬、蜂窝

好发于：项后、背部的有头疽

2. 有头疽易发生内陷（脓毒血症、败血症）——病机：火毒炽盛+正虚

颜面部疔疮易走黄（脓毒血症、败血症）——病机：火毒炽盛

3. 火毒凝结证——黄连解毒汤合仙方活命饮

湿热壅滞证——仙方活命饮

阴虚火炽证——竹叶黄芪汤

气虚毒滞证——八珍汤合仙方活命饮

六、流注

余毒攻窜证——黄连解毒汤合犀角地黄汤

七、丹毒

1. 特征：得病快，一片红，边界清楚

2. 诱因：足癣，可导致丹毒反复发作

3. 辨证：

抱头火丹——风热毒蕴证（头）——普济消毒饮

内发丹毒——肝脾湿火证（躯干）——柴胡清肝汤、龙胆泻肝汤或化斑解毒汤

流火——湿热毒蕴证（下肢）——五神汤合草薢渗湿汤

赤游丹——胎火蕴毒证（新生儿）——犀角地黄汤合黄连解毒汤

4. 外治：砭镰法放血泄毒（下肢复发性丹毒）——禁用：赤游丹毒、抱头火丹

八、走黄与内陷

1. 辨别要点：正气虚不虚

走黄：火毒炽盛，（疔疮）

内陷：火毒炽盛+正气内虚

2. 内陷分类

火焰：火

干陷：虚+火

虚陷：虚

乳房疾病

一、乳房疾病

1. 乳头（男、女）：肝
2. 男乳房——肾；女乳房——胃
3. 触诊顺序：内上，外上，外下，内下；时间：月经来潮的 7-10 天

二、乳痈（急性乳腺炎）

1. 病因：乳汁郁积 金黄色葡萄球菌
2. 见于产后 3~4 周哺乳期妇女
3. 辨证：气滞热壅证（初期，未化脓）——瓜蒌牛蒡汤
热毒炽盛证（成脓）——透脓散
正虚毒恋证（溃后）——托里消毒散
4. 切口按乳络方向

三、粉刺型乳痈（不在哺乳期）——位于乳晕部

四、乳漏——有瘻管

五、乳癖（乳腺良性增生）

1. 表现：与月经周期有关，形态不一，边界不清（不圆），质地软，活动度好（无黏连）。
2. 好发于：25~45 岁的中青年
3. 辨证：肝郁痰凝证——随喜怒变化——逍遥萎贝散
冲任失调证——腰酸——二仙汤合四物汤（冲任二仙）

六、乳核（乳腺纤维腺瘤，良性肿瘤）

1. 好发于：20~25 岁青年，圆球
2. 辨证：肝气郁结证——肿块较小，发展缓慢——逍遥散
血瘀痰凝证——逍遥散合桃红四物汤

七、乳岩（乳腺癌）

1. 硬，有粘连
2. 治疗首选：手术
3. 好发于：40~60 岁
4. 辨证：肝郁痰凝证——神效瓜蒌散合开郁散
冲任失调证——二仙汤合开郁散
正虚毒炽证——八珍汤（八宝山）
气血两亏证——放化疗后乏力，面色萎黄——人参养荣汤

脾虚胃弱证——放化疗后食欲不振——参苓白术散或理中汤

瘰

一、气瘰

1. 单纯性甲状腺肿——弥漫性肿大
2. 治疗：肝郁气滞证——四海舒郁丸

二、肉瘰（甲状腺腺瘤或囊肿）

1. 颈前喉结一侧或两侧肉团（小肉球），随吞咽动作而上下移动（不黏连）
2. 辨证：气滞痰凝证——逍遥散合海藻玉壶汤

气阴两虚证（甲亢的表现）——生脉散合海藻玉壶汤

三、瘰疬（甲状腺炎）

1. 特点：红肿热痛，多有感冒、咽痛病史，引至耳后枕部
2. 风热痰凝证（热）——牛蒡解肌汤（颈痛、瘰疬——牛脖子）

气滞痰凝证——柴胡舒肝汤

四、石瘰（甲状腺癌）

1. 坚硬如石，推之不移（黏连）
2. 治疗：手术
3. 甲状腺同位素 ^{131}I 扫描：**癌——凉结节**
良性——热结节

瘤、岩

一、脂瘤（皮脂腺囊肿）

1. 特点：**粗大毛孔+挤出臭味的粉渣样物**
2. 辨证：痰气凝结——二陈汤合四七汤
痰湿化热——龙胆泻肝汤合仙方活命饮
3. 治疗：**脂瘤完整手术切除**

二、血管瘤（血管瘤）

1. 毛细血管瘤：红色丘疹或小的红斑
海绵状血管瘤：色深、色暗，有较大的**压缩性**（像海绵一样）
2. 辨证：心肾火毒证——芩连二母丸合凉血地黄汤
肝经火旺证——丹栀逍遥散合清肝芦荟丸
脾统失司证——出血+脾虚——顺气归脾丸

3. 治疗：手术切除；小面积可用五妙水仙膏

三、肉瘤（脂肪瘤）：分支状+软似棉，肿似馒

四、失荣（颈部淋巴结转移癌）

1. 硬，与肝胆关系密切

2. 辨证：气郁痰结证——化痰开郁方

 阴毒结聚证——肿块坚硬，不痛不胀——阳和汤

 瘀毒化热证——五味消毒饮合化坚二陈丸

 气血两亏证——八珍汤合四妙勇安汤

皮肤及性传播疾病

一、热疮（单纯性疱疹）

1. 好发部位：皮肤与粘膜交界处

2. 辨证：肺胃热盛证——辛夷清肺饮合竹叶石膏汤

 湿热下注证——龙胆泻肝汤

 阴虚内热证——增液汤

3. 外治：紫金锭或青吹口散

二、蛇串疮（带状疱疹）

1. 水泡，带状，沿神经排列，刺痛

2. 辨证：肝经郁热证——龙胆泻肝汤

 脾虚湿蕴证——除湿胃苓汤

 气滞血瘀证——柴胡疏肝散合桃红四物汤

三、疣

1. 皮肤浅表良性赘生物

2. 寻常疣（疣目）手背、前臂——风热血燥证——治瘕方

 湿热血瘀证——马齿苋合剂

 扁平疣（扁瘕）：风热蕴结证——马齿苋合剂

 热瘀互结证——桃红四物汤

3. 鼠乳（有脐窝）——消毒针头挑治，有传染性。

四、癣

头癣：白秃疮（白癣）①灰白鳞屑②脆易断，参差不齐③无后遗症

 肥疮（黄癣）①黄癣痂②鼠尿臭③有疤痕，永久性脱发

手足癣——鹅掌风：手癣；脚湿气：足癣

体癣（**圆癣、阴癣、股癣**）——钱币状，圆形或多环形、边界清楚、**中心消退、外围扩张**

花斑癣（汗斑、紫白癜风）——**夏发冬愈**、多汗体质青壮年，褐色

治疗：白秃疮、肥疮——拔发

五、脂溢性皮炎（面游风）

特点：面部多油，头部脱屑

辨证：干性：多屑——风热血燥证——消风散合当归饮子

湿性：多油——肠胃湿热证——参苓白术散合茵陈蒿

六、油风（斑秃，鬼剃头）

血热风燥证（热象）——**四物汤**合六味地黄汤

气滞血瘀证——通窍活血汤（**头部有血瘀：通窍活血汤**）

气血两虚证——八珍汤

肝肾不足证——七宝美髯丹

七、黄水疮（脓疱）：长疱，疱里是脓，水流哪长哪

暑湿热蕴证——清暑汤

脾虚湿滞证——参苓白术散

八、虫咬皮炎：风团上面有个点

清热解毒——热毒蕴结证——五味消毒饮合黄连解毒汤

九、疥疮——**隧道**——特效药：**硫黄**

十、湿疹

1. 皮损特点：**对称分布，多形损害**，剧烈瘙痒

2. 湿热蕴肤证（急性：湿热）——龙胆泻肝汤合萆薢渗湿汤

脾虚湿蕴证（慢性：湿、脾虚）——除湿胃苓汤或参苓白术散

血虚风燥证（血虚）——**当归饮子**或四物消风饮（干燥：当归饮子）

十一、婴儿湿疹

辨证：胎火湿热证——消风导赤汤

脾虚湿蕴证——小儿化湿汤

十二、接触性皮炎

1. ①**接触史**②哪儿接触哪儿长疹

2. 风热蕴肤证——消风散

湿热毒蕴证——龙胆泻肝汤合化斑解毒汤

血虚风燥证——当归饮子合消风散

十三、药毒

1. 用药史，潜伏期 5-20 天

2. 湿毒蕴肤证——萆薢渗湿汤加减。

热毒入营证——清营汤加减。

气阴两虚证——增液汤合益胃汤加减

十四、瘾疹（荨麻疹）

1. 风团，全身，无点（虫咬：有点，局部）

2. 风寒束表证（苔薄白，脉浮紧）——麻黄桂枝各半汤

风热犯表证（舌苔薄黄，脉浮数）——消风散

胃肠湿热证（苔黄腻，脉滑数）——防风通圣散

血虚风燥证（干）——当归饮子

十五、牛皮癣（神经性皮炎）

1. 皮损特点：肥厚，皮沟加深，皮嵴隆起，易苔藓样变

2. 肝郁化火证——龙胆泻肝汤

风湿蕴肤证——消风散

血虚风燥证——当归饮子

十六、白疮（银屑病）

1. 皮损特点：银白色鳞，薄膜现象，点状出血

2. 血热内蕴证（鲜红）——犀角地黄汤

血虚风燥证（干）——当归饮子

气血瘀滞证（瘀斑）——桃红四物汤

湿毒蕴阻证（脓疱+湿）——萆薢渗湿汤

火毒炽盛证（脓疱+热）——清瘟败毒饮

十七、淋病

1. 潜伏期一般 2-10 天，平均 3-5 天

2. 湿热毒蕴证（急性）——龙胆泻肝汤

阴虚毒恋证（慢性）——知柏地黄丸

十八、梅毒

1. 临床表现:

一期: **疳疮**, 硬下疳(生殖器, 疮边缘硬, 不痛), 发生于不洁性交后 **2-4 周**

二期: 杨梅**疮**(全身, 梅花样, 热入血分), 感染后 **7-10 周**

三期: 杨梅**结毒**(多个脏腑)

2. 治疗首选: 青霉素

3. 肝经湿热证(一期)——龙胆泻肝汤

血热蕴毒证(二期)——清营汤合桃红四物汤

毒结筋骨证(三期)——五虎汤

肝肾亏损证(三期)——地黄饮子

心肾亏虚证(三期)——苓桂术甘汤

十九、尖锐湿疣

1. 长在生殖器附近, 潜伏期 **1-12 个月**, 平均 **3 个月**

2. 湿毒下注证——表面潮湿——萆薢化毒汤(湿对湿)

湿热毒蕴证——大量秽浊分泌物——黄连解毒汤

肛门直肠疾病

一、痔

1. 内痔: 坠胀、**便血**、肿块脱出, 截石位 3、7、11 点

外痔: 坠胀、**疼痛**、异物感

2. 内痔分期

一期: 不脱出, 看不见

二期: 可自行回去

三期: 不能自己回去

四期: 不能回去

3. 静脉曲张性外痔: 与**体位**有关

血栓性外痔: **剧痛**

结缔组织性外痔: 异物感

4. 辨证:

(一期) 风伤肠络证——凉血地黄汤或槐花散

(二期) 湿热下注证——脏连丸

(三期) 脾虚气陷证——补中益气汤

(四期) 气滞血瘀证——止痛如神汤

5. 治疗：血栓性外痔、静脉曲张性外痔——手术

混合痔——外痔剥离内痔结扎

内痔——塞药法 (I、II 期)；枯痔法 (II、III 期)

二、息肉痔

1. 辨病：①鲜红色②便后出血③肿物蒂小质嫩。

2. 和内痔区别：直肠息肉——鲜红。内痔——紫暗

三、肛隐窝炎：排便前常带少许黏液，可成为肛周脓肿的根源

四、肛痈（肛门直肠周围脓肿）

1. 红肿热痛，坐盆后下

2. 热毒蕴结证（初期）——仙方活命饮、黄连解毒汤

火毒炽盛证（成脓）——透脓散

阴虚毒恋证（溃脓）——青蒿鳖甲汤合三妙丸

3. 手术治疗：

浅部脓肿——放射状

深层脓肿——弧形

五、肛漏

1. 局部反复流脓，疼痛，瘙痒。单纯性：一个外口，一个内口，一个瘻管

2. 治疗：挂线法——距肛门 4cm 以内，低位——切开。

六、肛裂

1. 肛门周期性疼痛，出血，便秘

2. 血热肠燥证——凉血地黄汤合脾约麻仁丸

阴虚津亏证——润肠汤

气滞血瘀证——六磨汤

3. 治疗：扩肛法——早期肛裂；纵切横缝法——陈旧性肛裂伴有肛管狭窄者

七、脱肛（肛门直肠脱垂）

1. 分度：

一度脱垂：长 3~5cm，直肠粘膜脱出（环形）

二度脱垂：长 5~10cm，直肠全层脱出（圆锥）

三度脱垂：长 10cm 以上，直肠、乙状结肠一段脱出（圆柱）

2. 脾虚气陷证——补中益气汤

湿热下注证——萆薢渗湿汤

八、锁肛痔（肛管直肠癌）

1. 最早期表现：**便血**，**排便习惯**改变也是常见的早期症状。

2. 诊断直肠癌首要的重要检查：**直肠指检**

3. 治疗：手术切除

泌尿男性疾病

一、子痈（附睾炎、睾丸炎）

（早期）湿热下注证——**枸橘汤**或龙胆泻肝汤

（晚期）气滞痰凝证——**橘核丸**

二、子痰（附睾结核）（不疼）

1. 早期：附睾硬结

后期：化脓（脓性稀薄、败絮状物，易成窦道）

2. （硬结期）浊痰凝结证——阳和汤

（成脓期）阴虚内热证——滋阴除湿汤合透脓散

（溃脓期）气血两亏证——十全大补汤

子痰败絮阳和汤，滋阴除湿大补丸

三、**阴茎痰核**：阴茎海绵体白膜（**阴茎背侧**），出现硬结——阳和汤

四、尿石症

1. 中药排石：①结石的直径<1cm②表面**光滑**③**无肾功能损害**

2. 湿热蕴结证——**三金排石汤**

气血瘀滞证——金铃子散合石苇散（石淋）

肾气不足证——济生肾气丸

五、慢性前列腺炎

1. **尿频、尿急、尿痛**

2. 直肠指检：①多为正常大小②轻度压痛

3. 湿热蕴结——滴白——**八正散**或龙胆泻肝汤

气滞血瘀——**前列腺汤**

阴虚火旺——五心烦热——知柏地黄汤

肾阳虚损——腰膝酸软——济生肾气丸

六、前列腺增生症

1. 老年男性进行性尿频（夜间明显），排尿困难，尿线变细
2. 直肠指检：增大（中央沟变浅或消失）
3. 湿热下注证——八正散
脾肾气虚证——补中益气汤（小腹下坠）
气滞血瘀证——沉香散
肾阴亏虚证——知柏地黄丸
肾阳不足证——济生肾气丸
4. 记忆：慢性前列腺炎——气滞血瘀证——前列腺汤
前列腺增生症——气滞血瘀证——沉香散

其他外科疾病

一、冻疮（助理不考）

分度：一度红斑，二度水疱，三度坏死
恒温 38-42℃ 热水浸泡全身，输液温度不超过 37℃

二、烧伤

1. 分度：一度红斑，烧灼感，二度水疱，三度焦痂
浅Ⅱ度创面红润，疼痛明显；深Ⅱ度红白相间，痛觉迟钝，不疼
2. 面积计算：
 - ① 双手——5%
 - ② 头、面、颈——9%
 - ③ 双上肢—— $2 \times 9\%$
 - ④ 躯干（前后包括外阴）—— $3 \times 9\%$
 - ②+③+④= $6 \times 9\% = 54\%$
 - ⑤ 双下肢（包括臀）—— $5 \times 9\% + 1\% = 46\%$
 - ②+③+④+⑤= $54\% + 46\% = 100\%$

三、毒蛇咬伤

1. 牙印 2~4 个毒牙痕
2. 风毒——神经毒（麻木）：金银海（银环蛇、金环蛇、海蛇）
火毒——血循毒（血疱）：其他（蝰蛇、尖吻蝮蛇、竹叶青蛇、烙铁头）
风火毒——混合毒（麻+红肿热痛）：眼镜蝮（眼镜蛇、眼镜王蛇、蝮蛇）

3. 治疗：早期结扎；扩创排毒；烧灼、针灸、拔罐

四、破伤风

1. 病因病机：创伤后、感受风毒
2. 潜伏期：4~14 天
3. 前驱期：咀嚼肌（咀嚼无力，张口略感不变）

五、肠痈

1. 初期：转移性右下腹痛
 酿脓期：右下腹包块
 溃脓期：腹痛扩散全腹（压痛、反跳痛）
2. 辨证：瘀滞证——大黄牡丹汤合红藤煎剂
 湿热证——复方大柴胡汤
 热毒证——大黄牡丹汤合透脓散

周围血管疾病

一、股肿（血栓性深静脉炎）

1. 临床表现：肿胀、疼痛、皮温升高、浅静脉怒张
2. 病因：创伤，产后长期卧床
3. 并发症：肺栓塞（危急生命）
4. 辨证：湿热下注证——四妙勇安汤
 血脉瘀阻证——活血通脉汤
 气虚湿阻证——参苓白术散

股肿湿热勇安汤，血瘀活血气人参

二、血栓性浅静脉炎

1. 表现：一条静脉类似条索物（静脉迂曲），红肿热痛
2. 辨证：湿热瘀阻证——二妙散合茵陈赤豆汤
 血瘀湿阻证——活血通脉汤
 肝郁蕴结证——柴胡清肝汤或复元活血汤

二妙湿热瘀活血，柴胡清肝浅静脉

三、筋瘤（下肢静脉曲张）

1. 蚯蚓团
2. 辨证：劳倦伤气证——补中益气汤

寒湿凝筋证——暖肝煎合当归四逆汤

外伤瘀滞证——活血散瘀汤

3. 治疗：手术是根本方法

四、臁疮（下肢慢性溃疡）

好发于筋瘤病人，小腿下 1/3 处，为下肢静脉曲张溃破

五、脱疽

1. 分期：一期：间歇性跛行，足背动脉、胫后动脉搏动减弱

二期：静息痛，足背动脉、胫后动脉搏动消失

三期：坏死、坏疽

2. （一期）寒湿阻络证——趺阳脉搏动减弱——阳和汤

（二期）血脉瘀阻证——趺阳脉搏动消失——桃红四物汤

（湿性坏疽）湿热毒盛证——苔黄腻——四妙勇安汤

（干性坏疽）热毒伤阴证——舌红苔黄——顾步汤

（坏死组织脱落）气阴两虚证——舌淡尖红——黄芪鳖甲汤

3. 西医名称：动脉硬化性闭塞症、糖尿病足、血栓闭塞性脉管炎

总结

颈痛 牛蒡解肌汤

乳痈 瓜蒌牛蒡汤

锁喉痈 普济消毒饮

抱头火丹 普济消毒饮

乳岩——肝郁气滞——神效瓜蒌散

痔疮——气滞血瘀——止痛如神汤

子痛——湿热下注——枸橘丸

尿石症——湿热下注——三全排石汤

前列腺炎——湿热下注——八正散

前列腺增生——温热下注——八正散